



KLINISKE RETNINGSLINJER | KRÆFT

Gliomer hos voksne

Version 4.0

GODKENDT

Faglig godkendelse

15. december 2024 (DNOG)

Administrativ godkendelse

16. december 2024 (Sekretariatet for
Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. december 2026

INDEKSERING

Hjernetumor, hjernekræft, gliom, DNOG

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----|
| Nyt siden sidst (ændringslog)..... | 3 |
| 1. Anbefalinger (Quick guide)..... | 4 |
| Primære visitation..... | 4 |
| Radiologi | 4 |
| Kirurgi | 5 |
| Patologi | 7 |
| Onkologi | 8 |
| Steroid behandling..... | 10 |
| Epilepsi..... | 10 |
| Neurorehabilitering | 11 |
| Neuropalliation..... | 11 |
| Kørekort..... | 12 |
| Opfølgningsforløb..... | 12 |
| 2. Introduktion | 14 |
| 3. Grundlag | 15 |
| Primære visitation..... | 15 |
| Radiologi | 18 |
| Kirurgi | 22 |
| Patologi | 28 |
| Onkologi | 37 |
| Steroid behandling..... | 49 |
| Epilepsi..... | 54 |
| Neurorehabilitering | 57 |
| Neuropalliation..... | 60 |
| Kørekort..... | 63 |
| Opfølgningsforløb..... | 67 |
| 4. Referencer | 71 |
| 5. Metode | 88 |
| 6. Monitorering | 91 |
| 7. Bilag | 92 |
| 8. Om denne kliniske retningslinje..... | 130 |

Nyt siden sidst (ændringslog)

Nyt siden version 2.0 (ændringslog)

| Ændring | Beskrivelse |
|----------------------------------|--|
| Anbefalinger | <p>-</p> <p>Anbefaling 6-15 vedrørende billeddiagnostik: Radiologi afsnit revideret så det følger den nye RANO 2.0 klassifikation</p> <p>Anbefaling 16-27 vedrørende kirurgi: Afsnittet omhandlende kirurgi er omskrevet og opdateret med introduktion af nye betragtninger omkring biopsitagning og resektionsgrad.</p> <p>Ny anbefaling 20: Operation for glioblastom progression bør fortrinsvis foretages, hvis der forventeligt kan opnås makrototal eller supramaksimal resektion (B).</p> <p>Anbefaling 28-38 vedrørende patologi: Patologi afsnit er opdateret med betragtninger omkring DNA methyleringsprofilering og vurdering af væv ved reresektioner.</p> <p>Anbefaling 39-59 vedrørende onkologi: Onkologi afsnit er omskrevet og opdateret med betragtninger omkring behandling med TTF og vorasidenib.</p> <p>Anbefaling 90-95 vedrørende opfølgning: Afsnit er opdateret så det følger den nye RANO 2.0 klassifikation</p> <p>Ingen ændring i anbefalinger vedrørende primær visitation, steroid behandling, epilepsi, neurorehabilitering og neuropalliation.</p> |
| Litteratur- og evidensgennemgang | Opdateret |
| Referencer | Opdateret |
| Litteratursøgning | Suppleret med en systematisk litteratursøgning |
| Forfattere | Opdateret |
| Bilag | <p>Bilag 1 søgestrenge er opdateret.</p> <p>Bilag 4 om radiologisk beskrivelse baseret på RANO-kriterierne er opdateret efter RANO 2.0.</p> |

1. Anbefalinger (Quick guide)

Primære visitation

1. Patienter med begrundet mistanke om primær hjernekræft bør henvises akut via hjernekræftpakke til neurologisk afdeling (D)
2. Efter initial diagnostisk udredning inkl. klinisk neurologisk undersøgelse og MR-skanning med kontrast af hjernen, bør patienten viderehenvises til regional neurokirurgisk afdeling til videre vurdering, primær kirurgisk behandling og endelig diagnostik (D)
3. Efter endelig patologisk diagnostik bør henvises til onkologisk vurdering og efterbehandling (D)
4. Behov for neurorehabilitering bør vurderes løbende (D)
5. MDT-konferencer kan afholdes efter behov (D)

Radiologi

Billeddiagnostisk udredning

6. MR-skanning med intravenøs kontrast anbefales ved billeddiagnostisk udredning af alle patienter med mistanke om hjernetumor (C)
7. MR-skanning bør udføres efter standardiseret MR-protokol og bør indeholde en 3D-navigationssekvens (C)
8. MR-skanning bør omfatte hele kraniospinalaksen, såfremt der kan være mistanke om dropmetastaser (f.eks. ependymom) (D)

Avancerede MR-skanningsteknikker som supplement til udredning

9. Avancerede MR-skanningsteknikker kan anvendes, når der ønskes supplerende oplysninger omkring tumorkarakteristika (molekulære, fysiologiske og metaboliske) (D)

[18F]FET-PET som supplement til udredning

10. Præoperativ [18F]FET-PET kan anvendes, når der ønskes supplerende oplysninger vedrørende tumorgradering, afgrænsning af tumor og valg af biopsisted (B)

Billeddiagnostisk opfølgning

11. Tidlig postoperativ MR-skanning (<48 timer efter operationen) bør foretages hos alle patienter, der har fået foretaget resektion af kontrastopladende hjernetumorer (dvs. formodede højgradsgliomer) (D)

12. Beskrivelse af tidlig postoperativ MR-skanning (indenfor 48 timer) bør følge definitionen af resttumor, jævnfør kriterier udarbejdet af DNOG (D)

13. De internationale RANO-kriterier bør anvendes i beskrivelsen af MR-skanninger postoperativt og ved responsevaluering / langtidsopfølgning (D)

14. Supplerende MR-perfusion og DWI kan i tvivlstilfælde anvendes til differentiering, hvor tumorprogression ønskes adskilt fra behandlingsfølger (B)

15. Supplerende [18F]FET-PET kan overvejes i udvalgte tilfælde som et supplement til klinisk MR-skanning ved pseudorespons eller hvor tumorprogression ønskes adskilt fra behandlingsfølger (B)

Kirurgi

Indikation for operation

16. Primære hjernetumorer bør kirurgisk behandles for:

- at opnå histopatologisk diagnose (A)
- at begrænse symptomer opstået på baggrund af global, fokal eller irritativ hjernepåvirkning (C)
- at forlænge overlevelsen (A)

17. Ved tumorprogression bør en udvalgt gruppe af patienter opereres for:

- at differentiere mellem reel tumorprogression og pseudoprogression (A)
- at opnå histopatologisk diagnose ved mistanke om malignisering (A)

- at begrænse symptomer opstået på baggrund af global, fokal eller irritativ hjernepåvirkning (B)
- at forlænge overlevelsen (B)

Det kirurgiske indgreb

18. Operation bør planlægges på basis af præoperative skanninger evt. suppleret med præ- eller peroperative undersøgelser for at kortlægge specifikke funktioner i forhold til tumors placering (C)
19. Primære hjernetumorer bør opereres med makrototal eller supramaksimal tumorresektion under hensyntagen til risici (B)
20. Operation for glioblastom progression bør fortrinsvis foretages, hvis der forventeligt kan opnås makrototal eller supramaksimal resektion (B)
21. Primære hjernetumorer med kontrastopladning (formodet højgradsgliom) bør overvejes opereret med anvendelse af fluorescensteknik, hvis makrototal eller supramaksimal resektion skønnes mulig (A)

Perioperativ behandling – medicinsk

22. Højdosis steroid bør gives til alle patienter præoperativt hvis de har kliniske symptomer eller hvor billeddiagnostik har vist masseeffekt (C)
23. Blodfortyndende medicin bør seponeres før operation i henhold til gældende retningslinjer fra Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (C)
24. Alle patienter bør påbegynde tromboseprofylakse med støttestrømper på operationsdagen. Desuden gives lavmolekylært heparin eller tilsvarende, som påbegyndes 24 timer efter operation. Begge dele anvendes indtil patienten er mobiliseret (B)
25. Alle patienter bør have profylaktisk antibiotika givet 30-60 min før indledningen af operationen. Der anbefales anvendelse af enten cefuroxim 1,5 gram eller dicloxacillin 1,0 gram indgivet intravenøst. Antibiotika dosis gentages hvis operationen varer mere end tre timer (A)

Postoperativt forløb

26. Overvågning af vitale funktioner herunder bevidsthedsniveau og neurologisk funktion bør finde sted i passende tidsrum umiddelbart postoperativt på et dertil indrettet afsnit (B)

27. Tidlig postoperativ MR-skanning bør foretages hos alle patienter, der har kontrastopladende tumorer og har fået udført resektion (D)

Patologi

28. Der bør sikres både frosset og paraffinindstøbt væv til immunhistokemi, in situ hybridisering og molekulær genetiske undersøgelser (C)
29. Gliomklassifikationen skal følge nyeste WHO 2021 klassifikation for tumorer i centralnervesystemet (C)
30. Alle gliomer bør undersøges for IDH mutation-(C)
31. IDH mutation status kan undersøges med IHC eller forskellige molekulær genetiske analyser. Hvis IHC er negativ bør der udføres sekventering af IDH1 og IDH2 i alle astrocytære og oligodendrogliale tumorer samt i glioblastomer hos patienter, som er 55 år eller yngre (C) Evt. kan der udføres methyleringsprofilering.
32. 1p/19q co-deletions status bør undersøges i alle IDH muterede gliomer med bevaret ATRX expression (B)
33. Undersøgelse mhp. homozygot deletion af CDKN2A/B skal foretages i alle IDH muterede astrocytomer (C)
34. Histon 3-K27M bør undersøges i alle diffuse gliomer, som involverer midtlinjen (C)
35. IDH vildtype gliomer, som ikke opfylder de histologiske kriterier for glioblastom, skal undersøges for TERTp mutation, EGFR amplifikation og +7/-10. Evt. kan der udføres methyleringsprofilering (C)
36. BRAF V600 mutation, KIAA1549-BRAF fusion, samt histon 3 G34-mutation, bør udelukkes ved IDH vildtype gliomer, som ikke fylder de fylder de diagnostiske kriterier for glioblastom. Eventuelt kan der udføres methyleringsprofilering (B)
37. MGMT promoter methyleringsstatus bør bestemmes hos patienter med glioblastom IDH- vildtype CNS WHO grad 4 og diffust hemisfærisk gliom H3.3 G34-muteret CNS WHO grad 4 (A)
38. Alle ependymomer, undtaget subependymomer og myxopapillære ependymomer, bør subclassificeres på baggrund af molekulære analyser, fortrinsvis methyleringsprofilering. Ved spinale ependymomer med klassisk histologi bør der undersøges for MYCN amplifikation (C)

Onkologi

Glioblastom IDH vildtype WHO grad 4, Astrocytom IDH muteret WHO grad 4, Diffust midtlinje gliom H3 K27M muteret WHO grad 4, samt diffust hemisfærisk gliom H3.3 G34-muteret CNS WHO grad 4

Performance status 0-2:

39. Bør tilbydes postoperativ strålebehandling 60 Gy over 30 fraktioner konkomitant temozolomid og efterfølgende seks serier temozolomid (A)

Performance status 0-2 og betydelig komorbiditet eller alder >70 år:

40. Hos ældre patienter eller patienter med betydelig komorbiditet kan det overvejes at tilbyde postoperativ hypofraktioneret strålebehandling (34Gy/10F eller 40Gy/15F), konkomitant temozolomid og efterfølgende vurderes med henblik på seks serier temozolomid (A)

41. Metyleret MGMT kan behandles med temozolomid alene (A)

42. Umetyleret MGMT kan behandles med hypofraktioneret strålebehandling (A)

Performance status 3-4:

43. Tilbydes palliativ behandling (D)

Astrocytom IDH muteret WHO grad 3

44. Bør tilbydes postoperativ strålebehandling 59,4 Gy over 33 fraktioner efterfulgt af 12 serier adjuverende temozolomid (A)

Oligodendrogiom IDH muteret og 1p19q co-deleteret WHO grad 3

45. Bør tilbydes postoperativ strålebehandling 59,4 Gy over 33 fraktioner efterfulgt af 6 serier PCV (lomustin, procarbazin, vincristin) (A)

Astrocytom IDH muteret WHO grad 2, og Oligodendrogiom IDH muteret og 1p/19q co-deleteret WHO grad 2, som er makroradikalt opereret eller ikke makroradikalt opereret uden symptomer

46. Anbefales observation (B)

Astrocytom IDH muteret WHO grad 2, og Oligodendrogiom IDH muteret og 1p/19q co-deleteret WHO grad 2, som har resttumor med symptomer eller progredierende inoperabel tumor eller vurderet højrisiko for progression

47. Tilbydes postoperativ strålebehandling 50,4 Gy over 28 fraktioner efterfulgt af 6 serier PCV (lomustin, procarbazin, vinkristin) (A)

Progression af højgrads gliomer

48. Patienten bør vurderes mht. re-operation (B)

49. Patienten bør vurderes til behandling med temozolomid, lomustin eller bevacizumab evt. i kombination med irinotecan (B)

Progression af lavgrads gliomer

50. Patienten bør vurderes mhp operation (B)

51. Patienten bør vurderes mhp onkologisk behandling (B)

Ependymom WHO grad 1 og 2, makroradikalt opereret:

52. Anbefales observation (D)

Ependymom WHO grad 1 og 2, ikke makroradikalt opereret:

53. MR-skanning af kraniospinalaksen skal foreligge og hvis denne skanning er negativ for tumor-seeding, bør der udføres cerebrospinalvæskeundersøgelse for tumorceller (C)

54. Re-operation af resttumor bør overvejes hvis første operation ikke har været tilfredsstillende (C)

55. Anbefales postoperativ strålebehandling 54-59,4 Gy over 30-33 behandlinger (C)

Ependymom WHO grad 3 uden spinal metastasering:

56. Anbefales postoperativ strålebehandling 54-59,4 Gy over 33 behandlinger (B)

Ependymom WHO grad 3 med spinal metastasering:

57. Anbefales postoperativ strålebehandling med 36 Gy over 20 behandlinger mod hele kraniospinalaksen, der suppleres op til 50,4 Gy over 28 behandlinger mod spinale metastaser og 59,4 Gy over 33 behandlinger mod det cerebrale tumorområde (B)

Ependymom WHO grad 3 med progression efter strålebehandling:

58. Kan tilbydes kemoterapi behandling (D)
59. Kan i sjældne tilfælde tilbydes rebestråling ved langt sygdomsfrat interval (D)

Steroid behandling

60. Patienter bør behandles med højdosis steroid ved kliniske symptomer eller hvor billeddiagnostik har vist masseeffekt (A)
61. Steroidbehandling bør ikke gives profylaktisk under strålebehandling, men kan gives ved symptomer på forhøjet intrakranielt tryk og ved steroidresponsiv neurologisk deficit (C)
62. Ved hypofraktioneret strålebehandling kan der gives kortvarig profylaktisk steroidbehandling (C)
63. Steroid kan i sjældne tilfælde have en funktion som symptomatisk behandling i det palliative forløb. Epilepsi eller let hovedpine, som kan behandles sufficient med hhv. antiepileptika eller håndkøbsanalgetika, bør ikke i sig selv behandles med steroid (D)
64. Der bør screenes for risikofaktorer (osteoporose, diabetes mellitus, gastrit/ulcus) og der bør handles i forhold til disse efter de gældende nationale retningslinjer (C)
65. Steroidbehandling aftrappes så hurtigt som muligt til lavest mulig vedligeholdelsesdosis evt. seponering for at undgå bivirkninger (A)

Epilepsi

66. Hel eller delvis antiepileptisk effekt kan opnås ved neurokirurgisk behandling med reduktion af tumorbyrde (A)
67. Der bør ikke gives profylaktisk antiepileptisk behandling (A)
68. Der bør startes behandling med antiepileptika efter første anfall (A)
69. Ved stigende anfaldfrekvens eller ændring af anfaldssemiologi skal tumorprogression mistænkes og der bør yderligere udredes (A)

70. Valg af præparat bør baseres på præparatets forventede effekt og bivirkningsprofil hos den enkelte patient. Mulig interaktion med samtidig kemoterapi og anden behandling bør indgå i overvejelserne om præparatvalg (A)
71. Den antiepileptiske behandling bør varetages af neurologisk speciallæge i samarbejde med neurokirurg og onkolog (D)

Neurorehabilitering

72. Vurdering af rehabiliteringsbehov bør påbegyndes præoperativt hos patienter med gliom (C)
73. Alle patienter, som udskrives til hjemmet fra specialafdeling med fysiske eller kognitive deficits bør vurderes tværfagligt inden udskrivelse med henblik på behov for videre genoptræning (C)
74. Der bør løbende sikres behovsvurdering og justering af genoptræningsplaner ved ændringer i tilstanden (C)
75. Alle patienter med gliom bør tilknyttes specialambulatorium på lokal neurologisk afdeling med henblik på forankring af forløb og rehabiliteringsindsats (C)
76. Både patienter og pårørende bør inddrages i den videre plan for rehabiliteringsindsatsen (C)
77. Der bør tidligt i forløbet etableres et tværfagligt samarbejde med specialambulatorium, egen læge, hjerneskadekoordinator, den kommunale hjemmepleje, fysioterapi og ergoterapi for at sikre et sammenhængende hjerneskaderehabiliteringsforløb (B)

Neuropalliation

78. Den pallierende indsats bør forløbe integreret med rehabiliteringsindsatsen (D)
79. Patient og pårørende bør informeres om forventelige progredierende symptomer i terminalfasen, også ud fra tumors beliggenhed i hjernen (D)
80. Somatiske følgesymptomer og psykosociale problemstillinger bør adresseres og håndteres (B)

81. Der bør være et kontinuerligt højt informationsniveau til patient og pårørende og denne information bør rettidigt involvere samtale om end-of-life-overvejelser og ønsker (D)

Kørekort

For gruppe 2-kategorierne gælder:

82. Ved højgradsgliomer gives varigt kørselsforbud (D)
83. Ved lavgradsgliomer med samtidig nydiagnosticeret epilepsi gives kørselsforbud indtil mindst 10 års anfallsfrihed uden medicinsk behandling med antiepileptika er opnået (D)

For gruppe 1-kategorierne gælder:

84. Ved gliomsygdom gives 12 måneders kørselsforbud ved tumorrelateret nydiagnosticeret epilepsi, hvoraf minimum de seneste seks måneder skal være med anfallsforebyggende behandling. Før kørselsforbuddet kan ophæves, skal der foreligge fornyet vurdering af patientens føreregnethed for at vurdere, om der er tilkommet betydende fysiske og kognitive symptomer (D)
85. Der gives seks måneders kørselsforbud ved recidiv af anfall. Før kørselsforbuddet kan ophæves, skal der foreligge fornyet vurdering af patientens føreregnethed for at vurdere, om der er tilkommet betydende fysiske og kognitive symptomer (D)
86. Påbud om kørselsforbud skal journalføres (D)
87. Initial og kontinuerlig vurdering af føreregnethed i forhold til motoriske og kognitive symptomer og eventuel epileptisk anfalssygdom (D)
88. Ved behov og mindste tvivl anbefales supplerende neuropsykologisk vurdering og evt. vejledende helbredsmæssig køretest (D)
89. Hvis det vurderes, at patienten ikke er indstillet på at overholde det lægelige kørselsforbud, informeres patienten om, og der søges indhentet samtykke forud for, at der foretages anmeldelse til Styrelsen for patientsikkerhed (D)

Opfølgningsforløb

90. Alle patienter med gliom bør tilbydes livslang neuro-onkologisk kontrol (A)

91. Hyppigheden af den efterfølgende opfølgning bør afhænge af gliomgrad, symptomatologi, behandling, comorbiditet, funktionsniveau og behov (D)
92. Opfølgningsforløbet bør varetages af et multidisciplinært neuroonkologisk team (neurolog, neurokirurg, neuroradiolog og onkolog) (C)
93. Der bør ikke udføres rutinemæssig MR-skanning ved påvirket funktionsniveau (PS>2), og hvor neurokirurgiske og onkologiske behandlingstilbud er opbrugte (D)
94. Der bør tilbydes åbent forløb på lokal neurologisk afdeling for alle patienter med højgradsgliomer (D)
95. Forløbskoordinationen bør fastlægges i regionale samarbejdsaftaler (D)

2. Introduktion

Der nydiagnosticeres pr. år godt 1600 patienter med tumorer i hjerne, hjernehinder og nerver.

Aldersstandardiseret incidens per 100.000 er 26 for mænd og 28 for kvinder, når man inkluderer alle tumortyper. De øvrige tumorer omfatter meningeomer (30 %), schwannomer (6-8 %), hypofyseadenomer (6-8 %) og andre (20 %). Prævalensen er godt 18.000 patienter for alle tumortyper. Af de nydiagnosticerede skønnes omkring 600 at være gliomer.

Formål

Det overordnede formål med retningslinjen er at understøtte en evidensbaseret kræftindsats af høj og ensartet kvalitet på tværs af Danmark.

Patientgruppe

Retningslinjen omhandler diagnostik og behandling af voksne patienter med intrakranielle gliomer, som er omfattet af diagnosekoderne: 1) DD33.0 – 33.2 (neoplasma benignum cerebri). 2) DD43.0 – 43.2 og 43.9 (neoplasma non specificatum cerebri). 3) DC71.0 – 71.9 (neoplasma malignum cerebri).

I aktuelle retningslinje vil tumorerne blive benævnt lavgrads (WHO grad 1 og 2) - og højgrads (WHO grad 3 og 4) - gliom. Udtrykket 'benign' er misvisende, da lavgradsgliomer sjældent kan helbredes og ofte ses malign transformation til højgradstumorer.

Tumorer i hjernen adskiller sig fra andre tumorer ved især følgende forhold: 1) De er beliggende inde i en ueftergivelig kraniekasse, hvorfor selv mindre, langsomtvoksende tumorer kan medføre alvorlige, endda fatale symptomer, når det intrakranielle tryk stiger. 2) De vokser infiltrativt i hjernen og de fleste typer kan aldrig fjernes helt. 3) De er ofte lokaliseret svarende til hjernens vigtige og til tider vitale funktioner, hvilket har betydning for muligheden for kirurgisk fjernelse. Fjernelse af en tumor medfører risiko for kompromittering af hjernefunktionen i det pågældende område. 4) De langsomtvoksende tumorer kan med tiden transformeres til aggressive tumorer.

Jævnfør ovenstående bliver alle grader af tumorer anmeldt til Cancerregistret.

Målgruppe for brug af retningslinjen

Denne retningslinje skal primært understøtte det kliniske arbejde og udviklingen af den kliniske kvalitet, hvorfor den primære målgruppe er klinisk arbejdende sundhedsprofessionelle i det danske sundhedsvæsen.

3. Grundlag

Primære visitation

1. **Patienter med begrundet mistanke om primær hjernekræft bør henvises akut via hjernekræftpakke til neurologisk afdeling (D)**
2. Efter initial diagnostisk udredning inkl. klinisk neurologisk undersøgelse og MR-skanning med kontrast af hjernen, bør patienten viderehenvises til regional neurokirurgisk afdeling til videre vurdering, primær kirurgisk behandling og endelig diagnostik (D)
3. Efter endelig patologisk diagnostik bør henvises til onkologisk vurdering og efterbehandling (D).
4. Behov for neurorehabilitering bør vurderes løbende (D)
5. MDT-konferencer kan afholdes efter behov (D)

Litteratur og evidensgennemgang

Figuren nedenfor viser det typiske forløb. Evidensgrundlaget for den primære visitation er baseret på ekspertfaring og EANO 2021 retningslinjen for gliom (1)[1a].

Patientens første kontakt til sundhedsvæsenet er typisk enten til egen læge eller skadestue/akutmodtagelse på grund af en eller flere typer af symptomer:

- Specifikke symptomer, der topografisk er knyttet til den hjernefunktion, hvor tumoren er placeret.
- Generelle symptomer, som skyldes øget tryk i kraniekassen (hovedpine, kvalme og opkastninger).
- Epileptisk anfall.

Der er således stor bredde i debutsymptomerne, som omfatter adfærds- og personlighedsændringer, kognitive forstyrrelser, epileptiske anfall, synsforstyrrelser, hovedpine, kvalme, opkastninger, afasi, bevidsthedssvækkelse og lammelser (2) [4]. Visse clusters af disse symptomer er vist at have større prædiktiv værdi for hjernetumordiagnosen (3) [4]. Udredning ved mistanke om kræft i hjernen er forankret i de neurologiske afdelinger.

Ved begrundet mistanke om primær hjernekræft, jvf. ovenstående, bør der akut (inden for få dage) udføres MR-skanning af cerebrum med gadolinium-kontrast. Såfremt dette ikke er umiddelbart gennemførligt (ved planteret neurostimulator, pacemaker el.lign.), må der i stedet foretages initial CT-skanning af cerebrum med kontrast.

Primær vurdering (oftest ved egen læge, praktiserende speciallæge og andre hospitalsafdelinger):

- Klinisk vurdering
- Resultat af evt. CT- eller MR-skanning udført på anden indikation
- Information af patient og pårørende samt akut henvisning til områdets neurologiske afdeling

Områdets neurologiske afdeling (visitation og initial udredning):

- Klinisk vurdering og performance status
- Sikre, at der foreligger relevant billeddiagnostik (MR-skanning med kontrast)
- Information af patient og pårørende
- Viderehenvisning i kræftpakkeforløb til neurokirurgisk afdeling
- Præoperativ behovsvurdering og symptomatisk behandling

Når der billeddiagnostisk er påvist en rumopfyldende proces, informeres patienten herom og om, at man ikke med sikkerhed kan udtales sig om processens natur uden en histopatologisk undersøgelse. Patienten tilbydes derfor henvisning til neurokirurgisk afdeling (evt. MDT-konference) med henblik på præcis diagnostik samt efterfølgende besked om behandlingsmuligheder og prognose. Henvisning i kræftpakkeforløb sendes til områdets neurokirurgiske visitation.

I nogle tilfælde vil der være indikation for akut overflytning til indlæggelse på neurokirurgisk afdeling med henblik på umiddelbar behandling og videre udredning. Dette gør sig gældende ved:

- Dalende bevidsthedsniveau
- Hastigt progredierende almene eller fokalneurologiske symptomer
- Symptomer på forhøjet intrakranielt tryk.

Patientværdier og – præferencer

Bedømt ud fra klinisk erfaring vurderes hver patient individuelt, og de fleste vil i udgangspunktet falde ind under det angivne.


Rationale

Der henvises til EANO-retningslinjen, som er suppleret med praktiske betragtninger, der har tilpasset anbefalingerne til danske forhold.

Begrundet mistanke om kræft i hjernen fordrer hurtig udredning med henblik på hurtig og korrekt viderehenvisning til kirurgisk vurdering og indhentning af histologisk diagnose, således at korrekt onkologisk behandling kan blive iværksat.

Bemærkninger og overvejelser

Ingen særlige bemærkninger.



Figur 1

Radiologi

Billeddiagnostisk udredning

6. **MR-skanning med intravenøs kontrast anbefales ved billeddiagnostisk udredning af alle patienter med mistanke om hjernetumor (C)**
7. **MR-skanning bør udføres efter standardiseret MR-protokol og bør indeholde en 3D-navigationssekvens (C)**
8. **MR-skanning bør omfatte hele kraniospinalaksen, såfremt der kan være mistanke om dropmetastaser (f.eks. ependymom) (D)**

Litteratur og evidensgennemgang

MR-skanning er mere sensitiv end CT-skanning med hensyn til diagnosticering af små og kontrastopladende processer i hjernen. MR-skanning anbefales, som 1. valg ved billeddiagnostisk udredning af gliomer, og bør som minimum indeholde følgende sekvenser i mindst ét plan: T2, T2 FLAIR (*fluid-attenuated inversion recovery*), DWI (*diffusion weighted imaging*) samt T1 uden og med kontrast. Det anbefales, at MR-skanningsprotokollerne standardiseres, både ved udredning og ved efterfølgende kontroller (4) [4]. Dette for at fremme en ensartet og optimal MR-skanningskvalitet i udredning og evaluering af behandlingsrespons. Yderligere anbefales det at inkludere stereotaksi-/navigationssekvens, som oftest er en 3D T1-sekvens med kontrast(4) [4]. Se yderligere information under ”forslag til standardiseret MR skanningsprotokoller” (bilag 2).

I sjældne tilfælde kan primære CNS-tumorer metastasere til spinalkanalen; det vil ofte være tumorer lokaliseret i fossa posterior (f.eks. ependymom). MR-skanning bør altid inkludere fremstilling af spinalkanalen efter kontrast ved mistanke om dropmetastaser (5) [5].

Avancerede MR-skanningsteknikker som supplement til udredning

9. **Avancerede MR-skanningsteknikker kan anvendes, når der ønskes supplerende oplysninger omkring tumorkarakteristika (molekulære, fysiologiske og metaboliske) (D)**

Litteratur og evidensgennemgang

De hyppigst klinisk anvendte avancerede MR-teknikker er beskrevet kort nedenfor. Det skal understreges, at disse avancerede teknikker bør tolkes i sammenhæng med de konventionelle teknikker samt tilgængelige histopatologiske fund (6) [4].

1. MR-perfusion, oftest DSC-perfusion (*dynamic susceptibility contrast-perfusion*), bruges til måling af det relative blodvolumen, rCBV. Såvel mikrovaskularisering som hypervaskularisering fører til øget rCBV. I

glioblastomer ses mikrovaskulær proliferation grundet neoangiogene. Måling af rCBV kan være en hjælp i differentiering mellem glioblastomer og andre typer CNS-tumorer samt tumorgrad (7) I den primære udredning kan MR-perfusion give supplerende oplysninger, som kan være vejledende ved valg af biopsisted (hot-spot).

2. MR-protonpektroskopi kan give supplerende oplysninger om tumors molekylære karakteristika (8). Spektra i gliomer adskiller sig markant fra spektra i normalt hjernevæv. De vigtigste markører er N-acetyl-aspartat (NAA), kolin, kreatin og laktat. NAA er en neuronmarkør, og NAA-peak er reduceret i gliomer, da der ikke er normale neuroner i gliomer. Kolin-peak vil være større pga. øget membran-turnover og også laktatniveauet er øget i gliomer, da der kan være betydelig hypoksi pga. ændringer i den normale glukosemetabolisme. Der er dog overlap af spektra mellem forskellige cerebrale patologier, og spektroskopifund skal altid tolkes i konteksten med konventionel billeddiagnostik.

3. MR-diffusion tensor imaging (DTI) viser vandmolekylers foretrukne diffusionsretning. Undersøgelsen kan anvendes til kortlægning af nervebanerne, hvilket kan være en hjælp til operationsplanlægning.

Blandt andre avancerede billeddannelsesteknikker kan nævnes *chemical exchange saturation transfer* (CEST), som gør det muligt at få information om proteiner, peptider og andre små molekyler i vævet, som ikke kan detekteres med konventionel MR; teknikken mangler dog fortsat multicenter-validering til klinisk brug. (8)

[18F]FET-PET som supplement til udredning

10. Præoperativ [18F]FET-PET kan anvendes, når der ønskes supplerende oplysninger vedrørende tumorgradering, afgrænsning af tumor og valg af biopsisted (B)

Litteratur og evidensgennemgang

Den foretrukne tracer gruppe til hjerne PET af gliomer er aminosyrer og aminosyreanalogerne, hhv. [¹¹C]Methionin ([¹¹C]MET) og O-(2-[¹⁸F]-fluoroethyl)-L-tyrosine ([¹⁸F]FET), der giver sammenlignelige resultater. Optagelsen i rask hjernevæv er beskeden, og denne tracer gruppe er derfor velegnet til at afgrænse og identificere tumor samt vejlede i valg af optimalt biopsisted (9) [3b]. Se yderligere information om præoperative indikationer for hjerne PET under bilag 3.

I lighed med fMRI, kan man også anvende PET som til funktionel undersøgelse (¹⁵O]H₂O-PET). Patienterne foretager veldefinerede sproglige og motoriske opgaver eller stimuleres sensorisk for at kortlægge den ønskede funktion. Kombineret med patientens præoperative MR-skanning kan undersøgelsen vise vigtige områder i relation til tumoren [2b].

Billeddiagnostisk opfølgning

11. **Tidlig postoperativ MR-skanning (<48 timer efter operationen) bør foretages hos alle patienter, der har fået foretaget resektion af kontrastopladende hjernetumorer (dvs. formodede højgradsgliomer) (D)**
12. **Beskrivelse af tidlig postoperativ MR-skanning (indenfor 48 timer) bør følge definitionen af resttumor, jævnfør kriterier udarbejdet af DNOG (D)**
13. **De internationale RANO-kriterier bør anvendes i beskrivelsen af MR-skanninger postoperativt og ved responsevaluering / langtidsopfølgning (D)**
14. **Supplerende MR-perfusion og DWI kan i tvivlstilfælde anvendes til differentiering, hvor tumorprogression ønskes adskilt fra behandlingsfølger (B)**
15. **Supplerende [18F]FET-PET kan overvejes i udvalgte tilfælde som et supplement til klinisk MR-skanning ved pseudorespons eller hvor tumorprogression ønskes adskilt fra behandlingsfølger (B)**

Litteratur og evidensgennemgang

For at undgå fejrtolkning af eventuel kontrastopladende resttumor kontra operativt betinget uspecifik kontrastopladning eller hyperintens blødning, anbefales tidlig postoperativ MR-skanning (<48 timer efter operationen) foretaget hos alle patienter, der har kontrastopladende tumorer (dvs. formodede højgradsgliomer) og som har fået udført resektion [5].

Kirurgen skal indberette operationsresultatet til Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) til brug for statistik. Forslaget om ensrettet definition af resttumor på den tidlige postoperative MR skanning (<48 timer) er et pragmatisk kompromis udarbejdet af DNOG, for at få en ensartet og reproducibel registrering af resttumor mellem de forskellige afdelinger i Danmark til DNOR. Der er kun fire radiologiske afdelinger i Danmark, hvor disse tidlige (<48 timer) postoperative skanninger udføres, så vurdering af resultaterne skulle blive meget ensartet. Det er derfor vigtigt, at der laves ensartede beskrivelser og konklusionen altid indeholder én af følgende tre mulige konklusioner: "Ingen kontrastopladende resttumor", "ikke målbar resttumor" eller "målbar resttumor"; dette for at få valide data (se mere information og forklaring i bilag 7) [5].

Til responsevaluering / langtidsopfølgning af gliomer foreslår EANO-guidelines *Response Assessment in Neuro-Oncology (RANO)*, som forudsætter struktureret rapportering af de billeddiagnostiske fund. Dette gør sig især gældende for kliniske studier. Af andre strukturerede rapporteringsredskaber kan nævnes det nyere Brain Tumor Reporting and Data System (BT-RADS) (10, 11), som er udviklet af en amerikansk gruppe af radiologer fra Atlanta.

I 2023 udkom en opdatering, RANO 2.0, af de oprindelige og senere modifikationer / variationer af RANO-kriterierne (12). Blandt de væsentligste ændringer i den nye RANO-version er, at RANO 2.0 samler evalueringen af høj- og lavgradsgliomer og lægger sig op ad WHO's tumorklassifikation fra 2021. Samtidig rykkes baseline for nydiagnosticerede gliomer fra den tidlige postoperative MR-skanning til MR-skanning 4 uger

(21-35 dage) efter afsluttet stråleterapi; dette for at imødekomme udfordringer med at skelne reel tumorprogression fra pseudoprogression. Ved tvetydige MR-fund, mistanke om pseudoprogression eller diskrepans mellem MR-fund og klinisk status kan MR-skanning gentages efter min. 4 uger (f.eks. efter 4-8 uger) for at be- eller afbekræfte eventuel progression. Dette gælder især for kontrastopladende tumorer ≤ 12 uger efter stråleterapi, hvor risikoen for pseudoprogression er størst.

Pseudoprogression kan ses hos 20-30 % af patienter, som behandles med temozolomid i kombination med strålebehandling. Pseudoprogression defineres som en øget kontrastopladning og/eller ødem uden reel tumorprogression. Ændringen skyldes en lokal vævsreaktion med inflammation, ødem og øget karpermeabilitet. Pseudorespons kan ses ved behandling med VEGF-hæmmere (bevacizumab), der ses som reduktion i kontrastopladning, men uden reduktion i tumoraktivitet. Desuden kan man hos patienter, der har fået bevacizumab-behandling, se progression af ikke-kontrastopladende tumorvæv på T2 og T2-FLAIR, både med og uden forværring af de kliniske symptomer. RANO-kriterierne tager højde for disse behandlingsrelaterede forandringer, og DNOG anbefaler, at man i radiologiske beskrivelser anvender strukturet rapportering, som lægger sig op ad de senest opdaterede RANO-kriterier, RANO 2.0 fra 2023 (12) [5]. I den kliniske hverdag vil der dog være tilfælde, hvor RANO-kriterierne er vanskelige at anvende, og hvor en modifieret anvendelse af RANO 2.0 vil være at foretrække i et multidisciplinært regi. Se også bilag 4 vedr. RANO-kriterierne.

I udvalgte tvivlstilfælde ved mistanke om pseudoprogression kan MR-perfusion være et supplement til standard MR-skanningssekvenser for at identificere reel tumorprogression (gennemsnitlig sensitivitet på 90% og specificitet på 88%) (13) [3a].

Supplerende $[^{18}\text{F}]$ FET-PET kan overvejes i udvalgte tilfælde som et supplement til klinisk MR-skanning, hvor der er tvivl om diagnosen, f.eks. ved pseudorespons eller hvor tumorprogression ønskes adskilt fra behandlingsfølger (14) [3a]. Oversigt over postoperative indikationer for $[^{18}\text{F}]$ FET-PET, forslag til skanningsprotokol og standardiseret beskrivelse kan ses under bilag 3.

Der er i de senere år kommet øget fokus på brug af automatisk responsevaluering ved hjælp af kunstig intelligens og anvendelse af computerassisteret volumetri. Værdien heraf afventer dog yderligere valideringsstudier før klinisk implementering.

Patientværdier og – præferencer

Bedømt ud fra klinisk erfaring vurderes hver patient individuelt, og de fleste vil i udgangspunktet følge det angivne.

Rationale

Der henvises til EANO-retningslinjerne for ependymon 2017 og for gliomer hos voksne 2021, SNO/EANO konsensus review for gliomer hos voksne 2020, PET-EANO retningslinje for gliomer 2019, som er suppleret med praktiske betragninger fra DNOG, der har tilpasset anbefalingerne til danske forhold.

Bemærkninger og overvejelser

Ingen særlige bemærkninger.

Kirurgi

Indikation for operation

16. Primære hjernetumorer bør kirurgisk behandles for:

- **at opnå histopatologisk diagnose (A)**
- **at begrænse symptomer opstået på baggrund af global, fokal eller irritativ hjernepåvirkning (C)**
- **at forlænge overlevelsen (A)**

17. Ved tumorprogression bør en udvalgt gruppe af patienter opereres for:

- **at differentiere mellem reel tumorprogression og pseudoprogression (A)**
- **at opnå histopatologisk diagnose ved mistanke om malignisering (A)**
- **at begrænse symptomer opstået på baggrund af global, fokal eller irritativ hernepåvirkning (B)**
- **at forlænge overlevelsen (B)**

Litteratur og evidensgennemgang

Primær operation

Klinisk vurdering og billeddiagnostik er ikke tilstrækkelig specifik til at stille en korrekt diagnose ved hjernetumorer (15, 16) [2b], hvorfor operation i form af tumorresektion eller biopsi er nødvendig for at opnå histopatologisk diagnose og karakteristik af biomarkør status. Begge er nødvendige for at iværksætte den rigtige onkologiske efterbehandling. En undtagelse vedrører patienter med formodet diffust infiltrerende hjernestammegliom (17-20)[2b], hvor man pga. stor risiko forbundet med operation kan vælge at behandle ud fra tilgængelig billeddiagnostik.

Den symptomlindrende effekt af en operation ses eksempelvis hos den bevidsthedssvækkede eller kognitivt påvirkede patient som bedres efter fjernelse af en stor tumormasse (21) [2b]. Tumorreduktion er ligeledes vist at reducere epileptiforme symptomer (22) [2b].

Der er evidens for en positiv effekt af kirurgisk resektion på patientens samlede overlevelse (se afsnittet "Det Kirurgiske Indgreb").

Operation ved tumorprogression

Hos patienter med tumorprogression kan behandling indebære fornyet operation suppleret med onkologisk behandling, ligesom nyere kirurgiske tiltag, som f.eks. Laser Intersitial Thermal Therapy (LITT), kan overvejes i udvalgte tilfælde(23). Reoperation kan forlænge overlevelsen hos patienter med med malignt gliom, som har god performance status, og hvor makrototal eller supramaksimal tumorfjernelse kan opnås T(24-27) [2b]. Lav performance status, høj alder, lav resektionsgrad og kort interval mellem operation og tumorprogression har associeret med kortere overlevelse hos patienter, der opereres ved progression. I et observationelt studie af 681 patienter med første progression af glioblastom (WHO 2021) fra otte lande i USA og Europa (RANO Resect Group), fandt man, at resektion overordnet var forbundet med forlænget overlevelse (median overlevelse $11 \pm 0,7$ måneder) sammenlignet med ingen resektion (median overlevelse $7 \pm 0,5$ måneder). Effekten var dog begrænset til de tilfælde, hvor volumenet af kontrastopladelende resttumor var mindre end 1 cm^3 (27) [2b]. Supramaksimal (RANO Class 1) og makrototal (RANO Class 2) resektion var ligeværdigt forbundet med forlænget overlevelse hos patienter med første progression af glioblastom (median overlevelse hhv 12 ± 1.0 måneder og 12 ± 1.2 måneder), mens dette ikke var gældende for subtotal resektion (RANO Class 3, median overlevelse 9 ± 0.9 måneder) sammenlignet med ingen operation (median overlevelse 7 ± 0.5 måneder) (27)[2b]. Overlevelsgevinsten ved recidivoperation for maligne er opgjort i Dansk sammenhæng i DNOR årsrapport 2023. Her fandtes overlevelse efter reoperation svarende til ovennævnte studie. Gentaget resektion bør således primært foretages, hvis der kan forventes makrototal eller supramaksimal resektion. Ved høj alder, lav performance score, og kort interval mellem resektion og tumorprogression bør formålet med og værdien af fornyet resektion overvejes nøje.

For patienter med lavgradsgliomer (fx IDH-muterede gliomer, WHO grad 2) kan progression være forbundet med malign transformation af tumor. Forud for reoperation kan det overvejes derfor at foretage supplerende billeddiagnostik, såsom aminosyre PET skanning, for at øge muligheden for at det opererede område inkluderer netop de områder, hvor transformationen skønnes at være lokaliseret.

Det kirurgiske indgreb

- 18. Operation bør planlægges på basis af præoperative skanninger evt. suppleret med præ- eller peroperative undersøgelser for at kortlægge specifikke funktioner i forhold til tumors placering (C)**
- 19. Primære hjernetumorer bør opereres med makrototal eller supramaksimal tumorresektion under hensyntagen til risici (B)**
- 20. Operation for glioblastom progression bør fortrinsvis foretages, hvis der forventeligt kan opnås makrototal eller supramaksimal resektion (B)**
- 21. Primære hjernetumorer med kontrastopladning (formodet højgradsgliom) bør overvejes opereret med anvendelse af fluorescensteknik, hvis makrototal eller supramaksimal resektion skønnes mulig (A)**

Litteratur og evidensgennemgang

Elokvente områder

Tumorer i eller tæt ved elokvente hjerneområder vil, for at reducere risiko for funktionstab, ofte kræve brug af yderligere preoperative/intraoperative undersøgelser for at kortlægge hjernefunktioners præcise beliggenhed i forhold til tumoren (brain mapping) og evt. monitorere hjernefunktioner under operationen. Præoperative undersøgelser kan omfatte navigeret TMS, MEG, fMRI eller funktionel PET skanning. Intraoperative teknikker kan omfatte elektriske stimulationsteknikker og neurofysiologiske monitoringsteknikker samt operationen kan foretages mens patienten er vågen. Der er evidens for at intraoperativ brain mapping og vågen kraniotomi kan øge sikkerhed og resektionsgrad ved operation(28-30).

Makrototal og supramaksimal resektion

For patienter med gliomer er det vist, at overlevelsen forlænges i de tilfælde, hvor man kan foretage makrototal eller nær makrototal tumor resektion (31-39) [2a-2b] [(27, 40)2b]). Hvor tumorresektion er mulig, er dette derfor at foretrække frem for biopsi og submaximal resektion (40) [2b]. I et observationelt studie med 744 patienter med nydiagnosticeret glioblastom (WHO 2021) behandlet med Stupp's regime i EORTC 26981/22981 studierne fra 7 lande i USA og Europa (RANO Resect Group), fandt man, at supramaksimal resektion (RANO Class 1) var forbundet med en forlænget overlevelse sammenlignet med maximal resektion (RANO Class 2), submaximal resektion (RANO Class 3) og biopsi (RANO Class 4) (median overlevelse 24 [CI: 20-41] vs 19 [CI: 17-20] vs 15 [CI: 12-17] vs 10 [CI 8-12] måneder, P=0.001) (40) [2b] Se nedenstående figur. CE- Contrast Enhancing tumor, nCE – non-Contrast Enhancing tumor (T2-FLAIR).

| RANO categories for extent of resection in glioblastoma | | | | | |
|---|---|--|--|---|---------------------------------------|
| Class 1: supramaximal CE resection | Class 2: maximal CE resection | | Class 3: submaximal CE resection | | Class 4: biopsy |
| | <i>Class 2A: complete CE resection</i> | <i>Class 2B: near total CE resection</i> | <i>Class 3A: subtotal CE resection</i> | <i>Class 3B: partial CE resection</i> | |
| 0 cm ³ CE + ≤5 cm ³ nCE | 0 cm ³ CE + >5 cm ³ nCE | ≤1 cm ³ CE | ≤5 cm ³ CE | >5 cm ³ CE | No reduction of tumor volume |

Forhold hos patienten (alder, performance status, komorbiditet) og selve tumoren (beliggenhed, størrelse, udbredning, vaskularisering) har betydning for det endelige behandlingsvalg. Biopsi eller submaximal resektion vælges ofte i de tilfælde hvor der er forhold, som taler imod maximal eller supramaximal resektion, som fx fx komorbiditet, længerevarende operation, dyb eller elokvent beliggenhed af tumor, og lign., men hvor patienten forventes at kunne profitere af onkologisk efterbehandling. Teknikker (neuronavigation, fluorescens guidet kirurgi, vågen kirurgi, intraoperativ MR skanning) og undersøgelsesmodaliteter (præ- og peroperativ mapping og monitorering vha. neurofysiologi eller vågen kirurgi), der kan hjælpe med at øge resektionsgraden og samtidig sikre bevarelse af neurologiske funktioner, er essentielle for at opnå maksimalt udbytte af den kirurgiske behandling (36, 41) [2b].

For patienter med højgradsgliomer er det vist, at resektionsgraden øges og overlevelsen forlænges ved anvendelse af fluorescensvejledt kirurgi (32) [2b] (42)[1b] eller intraoperativ MR-skanning (43) [2b]. Supramaksimal resektion sv.t. fjernelse af alt kontrastopladende væv samt fjernelse af en del af område med øget T2-FLAIR signal er forbundet øget overlevelse (33) [2a], (34) [2a], (35) [1b],)(40) [2b], (43) [2b], (44) og bør tilstræbes, hvis muligt. Mens det er veldokumenteret at tilstedeværelse af kontrastopladende resttumor (> 0 cm³) efter operation er forbundet med kortere overlevelse hos patienter uden MGMT-gen metylering, er det mindre klart om tilsvarende betydning er gældende hos patienter med MGMT-gen metylering (40) [2b], (45) [2b], (43) [2b], (46) [2b].

Hos en mindre undergruppe af patienter med glioblastom, kan tumor fremstå uden kontrastopladning på MR-skanning. Hos disse patienter er der evidens for, at resektion af hovedparten af området med T2-FLAIR signal (rest volumen <1 cm³) er forbundet med længere overlevelse (47) [2b].

For patienter med lavgradsgliomer og IDH-muterede gliomer synes supramaksimal resektion også at kunne forlænge overlevelsen (36) [2b] (48) [2b], (44) [2b].

Fluorescensteknik

Anvendelse af fluorescensvejledt kirurgisk teknik (f.eks. 5-ala og fluorescein) kan være en hjælp i kirurgens skelen mellem tumorvæv og tilstødende hjernevæv. Dette bedrer muligheden for at foretage maksimal kirurgisk resektion under hensyntagen til neurologisk funktion. Der er beskrevet at bedring i resektionsgraden efter anvendelse af 5-ala eller fluorescein kan medføre forlænget progressionsfri overlevelse (37) [1b], (38) [2a], (39) [2b], (49) (50) (42) [1b] og overlevelse (42) [1b]

Biopsi og prøvetagning under resektion

Tekniske overvejelser omkring prøvetagning under resektion af diffust gliom er beskrevet i konsensusanbefalinger fra de fire RANO grupper (51)[2a]. Specifikt kan overvejes 1) at anvende intraoperativ neuronavigation baseret på præoperativ MR skanning til dokumentation af prøvestedet; 2) at anvende metaboliske eller fysiologiske skanninger som f.eks. aminosyre PET eller perfusionsserier på MR til at afdække hotspots i tumor og vejlede prøvetagningen; 3) at tage prøver fra forskellige områder i tumor, f.eks. kontrastopladende og ikke-kontrastopladende, for at afdække intratumoral heterogenitet. Det er god praksis, 1) at skanninger som anvendes til intraoperativ navigation inkluderer T2 vægtede serier og T1 vægtede serier med kontrast og ikke er ældre end 14 dage; 2) at prøver tages tidligt i operationen for at reducere anatomisk forskydning og bevare præcisionen af neuronavigation; 3) at biopsitagning ved progressiv sygdom inkluderer aktive sygdomsområder i formodet vækst; 4) at receseret materiale gemmes til diagnostiske formål eller forskningsformål.

Perioperativ behandling – medicinsk

22. Højdosis steroid bør gives til alle patienter præoperativt hvis de har kliniske symptomer eller hvor billeddiagnostik har vist masseeffekt (C)
23. Blodfortyndende medicin bør seponeres før operation i henhold til gældende retningslinjer fra Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (C)

- 24. Alle patienter bør påbegynde tromboseprofylakse med støttestrømper på operationsdagen. Desuden gives lavmolekylært heparin eller tilsvarende, som påbegyndes 24 timer efter operation. Begge dele anvendes indtil patienten er mobiliseret (B)**
- 25. Alle patienter bør have profylaktisk antibiotika givet 30-60 min før indledningen af operationen. Der anbefales anvendelse af enten cefuroxim 1,5 gram eller dicloxacillin 1,0 gram indgivet intravenøst. Antibiotika dosis gentages hvis operationen varer mere end tre timer (A)**

Litteratur og evidensgennemgang

Evidensgrundlag for steroid er beskrevet i steroidafsnittet

AK behandling

En vanskelig patientgruppe består af dem, der i forvejen er i antikoagulationsbehandling pga. anden sygdom (paroxystisk atrieflimren, hjerteklapsygdom, tidligere DVT osv.). Her er den generelle anbefaling, at man neutraliserer international-normalized-ratio (INR) op til operationen, og at dette fortsætter, indtil operationen er overstået, den kirurgiske blødningsrisiko er lav, og INR igen er i terapeutisk niveau(52). Det samme gør sig gældende med de nyere perorale antikoagulerende midler (NOAK), hvor der ikke monitoreres måling for koagulationsevnen. Her pauseres præparatet i henhold til producentens anbefalinger og anbefalingerne fra Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (53) [3a]

Tromboseprofylakse

Risikoen for tromboemboliske komplikationer inkl. dyb venetrombose er generelt for patienter med hjernetumorer og specielt i den postoperative periode høj (54) [2a] og der er positiv korrelation mellem tumorstørrelse, patientens alder og hyppigheden af trombotisk sygdom. Tidligere har man inden for neurokirurgien undgået medikamentel tromboseprofylakse pga. formodet risiko for blødning, men der er ikke evidens herfor og generelle anbefalinger foreskriver nu at man behandler alle kirurgiske tumorpatienter med både støttestrømper og lavmolekylære hepariner, indtil de er mobiliseret. Behandlingen med lavmolekylære hepariner kan påbegyndes dagen efter operationen (34) [2a].

Antibiotika

Flere internationale studier, baseret på både neurokirurgiske og ortopædkirurgiske indgreb, viser en signifikant lavere infektionsrate af både overfladiske og dybere infektioner, når der bliver givet antibiotika intravenøst 30-60 min før operationens indledning (35) [1b], (36) [2b], (37) [1b], (38) [2a].

Postoperativt forløb

- 26. Overvågning af vitale funktioner herunder bevidsthedsniveau og neurologisk funktion bør finde sted i passende tidsrum umiddelbart postoperativt på et dertil indrettet afsnit (B)**

27. Tidlig postoperativ MR-skanning bør foretages hos alle patienter, der har kontrastopladende tumorer og har fået udført resektion (D)

Litteratur og evidensgennemgang

Opvågning

Det umiddelbare postoperative forløb foregår for langt de fleste patienters vedkommende på en intensivafdeling eller et opvågningsafsnit. Her følges patienten tæt med observation af blodtryk, puls, iltssaturation, bevidsthedsniveau og neurologisk status. Formålet med opholdet på intensiv/opvågnings afsnit er at have mulighed for hurtigt at observere og reagere på evt. forværring i patientens tilstand. En sådan forværring vil ofte skyldes hæmatom eller ødemdannelse og vil i nogle tilfælde være behandlingskrævende. Studier har vist at disse komplikationer ofte indtræder i løbet af de første 4-6 timer postoperativt og det synes derfor sikkerhedsmæssigt forsvarligt at flytte patienter med supratentorielt beliggende tumorer til stationært sengeafsnit efter 2-6 timer (20, 55-57) [2b]. I udvalgte tilfælde kan symptomfri patienter opereret med biopsi af supratentoriel tumor udskrives til hjemmet efter 6-8 timers observation (58) [2b]. Patienter med tumorer beliggende infratentorielt eller som er i øget risiko for udvikling af komplikationer anbefales observation på intensiv/opvågningsafsnit i et døgn.

Tidlig postoperativ MR-skanning

Tidlig postoperativ MR-skanning anbefales, da det er velkendt, at der ikke er overensstemmelse mellem kirurgens vurdering af tumorresektion og den faktiske resektionsgrad (14) (2b). Den tjener som kvalitetskontrol med hensyn til graden af fjernelse af kontrastopladende tumorvæv og herunder mulighed for reoperation, den kan påvise eventuelle postoperative komplikationer og den kan fungere som udgangspunkt for senere kontrol af tumorvækst.

Ikke-kontrastopladende tumorer er vanskeligere at vurdere og tidlig postoperativ kontrolskanning anbefales ikke til vurdering af resterende ikke-kontrastopladende tumorvæv (59) [2b]. Endelig vurdering af rektionens komplethed kan ofte først vurderes efter 12 uger.

Evidensgrundlaget for tidlig postoperativ MR-skanning er yderligere beskrevet i radiologiasnittet.

Patientværdier og – præferencer

Bedømt ud fra klinisk erfaring vurderes hver patient individuelt, og de fleste vil i udgangspunktet følge det angivne.

Rationale

Der henvises til konsensus reviews af RANO Resect Group i 2023 (51) og 2024 (44). Kirurgi har en væsentlig plads i udredningen og behandlingen af patienter med intracerebrale gliomer. Det gælder både patienter med nydiagnosticeret gliom og patienter med progression af kendt gliom. Kan man opnå nær total, makrototal eller supramaksimal resektion af tumor har det en positiv effekt på overlevelsen. Kirurgi kan også virke symptom lindrende både på symptomer opstået på baggrund global, fokal og irritativ påvirkning. Retningslinjen beskriver forhold af betydning for kirurgisk behandling.

Bemærkninger og overvejelser

Ingen særlige bemærkninger.

Patologi

28. Der bør sikres både frosset og paraffinindstøbt væv til immunhistokemi, in situ hybridisering og molekulærgenetiske undersøgelser (C)
29. Gliomklassifikationen skal følge nyeste WHO 2021 klassifikation for tumorer i centralnervesystemet (C)
30. Alle gliomer bør undersøges for IDH mutation-(C)
31. IDH mutation status kan undersøges med IHC eller forskellige molekulærgenetiske analyser. Hvis IHC er negativ bør der udføres sekventering af IDH1 og IDH2 i alle astrocytære og oligodendrogliale tumorer samt i glioblastomer hos patienter, som er 55 år eller yngre (C) Evt. kan der udføres methyleringsprofilering.
32. 1p/19q co-deletions status bør undersøges i alle IDH muterede gliomer med bevaret ATRX expression (B)
33. Undersøgelse mhp. homozygot deletion af CDKN2A/B skal foretages i alle IDH muterede astrocytomer (C)
34. Histon 3-K27M bør undersøges i alle diffuse gliomer, som involverer midtlinjen (C)
35. IDH vildtype gliomer, som ikke opfylder de histologiske kriterier for glioblastom, skal undersøges for TERTp mutation, EGFR amplifikation og +7/-10. Evt. kan der udføres methyleringsprofilering (C)

36. **BRAF V600 mutation, KIAA1549-BRAF fusion, samt histon 3 G34-mutation, bør udelukkes ved IDH vildtype gliomer, som ikke fylder de fylder de diagnostiske kriterier for glioblastom. Eventuelt kan der udføres methyleringsprofilering (B)**
37. **MGMT promoter methyleringsstatus bør bestemmes hos patienter med glioblastom IDH- vildtype CNS WHO grad 4 og diffust hemisfærisk gliom H3.3 G34-muteret CNS WHO grad 4 (A)**
38. **Alle ependymomer, undtaget subependymomer og myxopapillære ependymomer, bør subklassificeres på baggrund af molekylære analyser, fortrinsvis methyleringsprofilering. Ved spinale ependymomer med klassisk histologi bør der undersøges for MYCN amplifikation (C)**

Litteratur og evidensgennemgang

Evidensgrundlaget for anbefalingerne bygges på WHO 2021, EANO 2021 guidelines, reviews og metaanalyse af MGMT.


Den femte udgave af WHO klassifikationen for CNS tumorer fra 2021(60), er baseret på den reviderede fjerde udgave fra 2016 og publicerede anbefalinger fra "the Consortium to Inform Molecular and Practical Approaches to CNS Tumor Taxonomy (cIMPACT)". Molekylærpatologi har en meget fremtrædende rolle, men det drejer sig stadig om en integreret diagnose baseret på en kombination af histologi og molekylærpatologi. Graderingen af CNS tumorer er ændret idet de nu graderes indenfor den enkelte tumortype, i stedet for på tværs af entiteter, og ved at man benytter arabertal i stedet for romertal. Nu benyttes således benævnelsen CNS WHO grad 1-4 ved gradering. En anden ændring er at betegnelsen "anaplastisk" udgår ved CNS WHO grad 3 gliomer.

Vigtige ændringer i diagnostik af gliomer fra WHO 2016 til 2021 udgaven er følgende:

- Glioblastom er nu defineret som et diffust astrocytært gliom uden mutationer i IDH- eller histon H3 gener og en eller flere af følgende forandringer:
 - Mikrovaskulær proliferation
 - Nekroser
 - TERT promoter mutation
 - EGFR gen amplifikation
 - Kombineret gain af hele kromosom 7 og tab af hele kromosom 10 (+7/-10).
- Betegnelsen glioblastom IDH-muteret udgår, og kaldes nu astrocytom IDH muteret CNS WHO grad 4.
- Homozygot deletion af CDKN2A/B er en molekylær markør for CNS WHO grad 4 i IDH muterede astrocytomer.

- Histon H3.3 G34-muteret diffust hemisfærisk gliom er en ny entitet som per definition er CNS WHO grad 4.

De vigtigste biomarkører for klassifikation og gradering af diffuse gliomer hos voksne er IDH1, IDH2, ATRX, histon H3 (K27M og G34R/V), 1p/19q, CDKN2A/B, TERTp, EGFR og +7/-10, konferer figur nedenfor. Andre molekylære markører, som ofte forefindes i gliomer af pædiatrisk type, er BRAF V600 mutationer, BRAF-KIAA1549 fusioner og MYB/MYBL1 alterationer. Det er vigtigt at være klar over at IDH vildtype gliomer som ikke opfylder de histologiske eller molekylære kriterier for glioblastom, også omfatter gliomer af pædiatrisk type. Disse gliomer forekommer også hos unge voksne, og inkluderer både høj- og lavgradsgliomer. Det er derfor vigtigt at der anvendes udvidede molekylære analyser indenfor denne gruppe, inkluderet methyleringsprofilering. Dette vil bidrage til mere præcis histomolekylær diagnostik og bedre prognosticering i forhold til det forventede kliniske forløb. Nedenstående diagnostiske algoritme er beskrevet i ref. (4)[1a].



I WHO 2021 klassifikationen findes der nu følgende gliomer og glioneuronale tumorer:

Adult type diffuse gliomer

- Astrocytom IDH-muteret, CNS WHO grad 2, 3 og 4
- Oligodendrogliom, IDH muteret og 1p/19q-codeleteret, CNS WHO grad 2 og 3
- Glioblastom, IDH-vildtype, CNS WHO grad 4

Pædiatrisk-type diffuse højgrads gliomer

- Diffust midtlinegliom, H3 K27-aændret, CNS WHO grad 4
- Diffust hemisfærisk gliom, H3 G34-muteret, CNS WHO grad 4
- Diffust pædiatrisk type højgrads gliom, H3 vildtype og IDH vildtype, CNS WHO grad 4
- Infantilt hemisfærisk gliom

Velafgrænsede astrocytære gliomer

- Pilocytisk astrocytom, CNS WHO grad 1
- Højgrads astrocytom med piloide træk
- Pleomorf xanthoastrocytom, CNS WHO grad 2 og 3
- Subependymalt kæmpecelle astrocytom, CNS WHO grad 1
- Kordoidt gliom, CNS WHO grad 2
- Astroblastom MN1-aændret

Pædiatrisk-type diffuse lavgrads gliomer

- Diffust astrocytom, MYB- eller MYBL1- ændret, CNS WHO grad 1
- Angiocentrisk gliom CNS WHO grad 1
- Polymorf lavgrads neuroepitelial tumor hos unge (PNTY), CNS WHO grad 1
- Diffust lavgrads-gliom, MAPK-vej ændret

Glioneuronale og neuronale tumorer:

- Gangliogliom, CNS WHO grad 1
- Gangliocytom, CNS WHO grad 1
- Desmoplastisk infantilt gangliogliom, CNS WHO grad 1
- Dysembryoplastisk neuroepitelial tumor, CNS WHO grad 1
- Diffus glioneuronal tumor med oligodendroglomlignende træk og kerneansamlinger (DGONC)

- Papillær glioneuronal tumor, CNS WHO grad 1
- Rosetdannede glioneuronal tumor, CNS WHO grad 1
- Myxoid glioneuronal tumor, CNS WHO grad 1
- Diffus leptomeningeal glioneuronal tumor
- Multinodulær og vakuoliserende neuronal tumor CNS, WHO grad 1
- Dysplastisk cerebellart gangliocytom, CNS WHO grad 1
- Centralt neurocytom, CNS WHO grad 2
- Ekstraventrikulært neurocytom, CNS WHO grad 2
- Cerebellart liponeurocytom, CNS WHO grad 2

Ependymomer:

- Supratentorielt ependymom NOS
- Supratentorielt ependymom, ZFTA fusions positiv, CNS WHO grad 2 og 3
- Supratentorielt ependymom, YAP1 fusions positiv, CNS WHO grad 2 og 3
- Fossa posterior ependymom NOS
- Fossa posterior ependymom, gruppe A, CNS WHO grad 2 og 3
- Fossa posterior ependymom gruppe B, CNS WHO grad 2 og 3
- Spinalt ependymom NOS, CNS WHO grad 2 og 3
- Spinalt ependymom, MYCN amplificeret
- Myxopapillært ependymom, CNS WHO grad 2
- Subependymom, CNS WHO grad 1

Brugen af NOS (Not Otherwise Specified) er beregnet på de tilfælde, hvor der ikke er mulighed for molekylær klassifikation, enten pga. for sparsomt eller for dårligt materiale, inkonklusive og/ eller manglende tilgang til molekylære analyser.

Astrocytom, IDH-muteret er et diffust infiltrerende IDH1- eller IDH2- muteret gliom, ofte med ATRX og/eller TP53 mutation, og fravær af 1p/19q co-deletion. Tumor graderes 2, 3 eller 4. Grad 2 tumorer er nærmest uden mitotisk aktivitet samt uden mikrovaskulær proliferation, nekrose og homozgot CDKN2A/B deletion. Grad 3 tumorer viser fokal eller udbredt anaplasi med signifikant mitotisk aktivitet samt fravær af nekrose, mikrovaskulær proliferation og homozgot CDKN2A/B deletion. Grad 4 tumorer fremviser mikrovaskulær proliferation eller nekrose eller homozgot deletion af CDKN2A/B.

Oligodendroglioner er defineret ved mutationer i IDH1 eller IDH2 generne, samt co-deletion af 1p/19q. De fleste er også TERTp muterede og 70% CIC muterede. De graderes CNS WHO 2 og 3 på baggrund af først og fremmest mitoser og mikrovaskulær proliferation, selv om et bestemt cut-off for mitosetal ikke er angivet. Homozygot deletion af CDKN2A kan være en indikator for WHO grad 3, selv om det ikke er et formelt graderingskriterium.

Glioblastom IDH-vildtype CNS WHO grad 4 er defineret som ovenfor beskrevet. Morfologiske subtyper er kæmpecelleglioblastom, gliosarkom og epiteloid glioblastom. Kæmpecelleglioblastomer er ofte TP53 muterede og har muligvis en noget bedre prognose end ordinære glioblastomer. Gliosarkomer adskiller sig ikke prognostisk fra andre glioblastomer, men der er multiple rapporter med spinale og systemiske metastaser samt indvækst i kraniun/knogle. Nogle epiteloide glioblastomer hos unge er karakteriseret ved BRAF V600 mutationer og homozygot CDKN2A/B deletion, bedre prognose og epigenetisk overlap med pleomorf xanthoastrocytom.

Diffust midtlinegliom, H3 K27-aændret CNS WHO grad 4, er en infiltrerende tumor i hjernestamme, medulla spinalis eller thalamus, med tab af H3 p.K28me3 (K27me3) immunhistokemisk og enten en H3 c.83A>T p.K28M (K27M) substitution i en af histon H3 isoformene, overudtryk af EZHIP, eller EGFR mutation. Tumor forekommer som regel hos børn og unge voksne, men ses også hos ældre.

Diffust hemisfærisk gliom, H3 G34-muteret CNS WHO grad 4, er et gliom, som afficerer de cerebrale hemisfærer med missens mutation i H3-3A genet og påfølgende substitution i histon H3 proteinet; c.103G>A p.G35R (G34R), c.103G>C (G34R), eller c.104G>T p.G35V (G34V). Tumor forekommer først og fremmest hos teenager og unge voksne (median alder 15-19 år).

Pilocytisk astrocytom CNS WHO grad 1 og pleomorf xanthoastrocytom CNS WHO grad 2 og 3 forekommer hyppigst hos børn og unge voksne. Pilocytiske astrocytomer er oftest velaflgrænsede, langsomt voksende tumorer og genetisk karakteriseret ved mutation i gener kodende for proteiner involveret i MAPK pathway, hvor den hyppigste er en tandem duplikation af kromosom 7q34, involveret i BRAF genet, førende til det onkogene fusionsgen mellem KIAA1549 og BRAF. Forandringen findes i >70 % af tumorerne.

Pleomorf xanthoastrocytom er som regel et lavgrads astrocytom, CNS WHO grad 2, der i sjældne tilfælde ved øget mitotisk aktivitet (> 5 mitoser /10HPF) klassificeres som CNS WHO grad 3. Genetisk er tumor karakteriseret ved BRAF V600E mutation i 60-80%. Endvidere findes ofte homozygot deletion af CDKN2A/B. Højgrads astrocytom med piloide træk er en diagnose, som udelukkende kan stilles ved DNA methyleringsprofilering, og som er karakteriseret ved anaplastisk histologi, alterationer i MAPK pathway, homozygot deletion af CDKN2A/B og ATRX mutation. Den endelige CNS WHO grad er ikke besluttet, men tilgængelige data tyder på et klinisk forløb svarende til CNS WHO grad 3.

Ependymomer skal nu klassificeres på baggrund af anatomisk lokalisation (supratentorielt, fossa posterior eller spinalt), histologi og molekulære fund. Den molekulære subgruppe identificeres nemmest ved methyleringsprofilering. Subependymomer forekommer i alle tre anatomiske lokalisationer. Supratentorielt forekommer der i tillæg to øvrige subtyper; ependymom med ZFTA (tidligere kaldt C11orf95) fusion og ependymom med YAP1 fusion. I fossa posterior findes der i tillæg til subependymom to grupper; fossa posterior gruppe A (PFA) og fossa posterior gruppe B (PFB). I spinalkanalen forekommer der i tillæg til

subependymom, ependymomer med klassisk morfologi, myxopapillære ependymomer og ependymomer med MYCN amplifikation.

PFA, suparentorielle ependymomer med ZFTA fusion og spinale ependymomer med MYCN amplifikation er associeret med dårlig prognose. Subependymomer er CNS WHO grad 1. De øvrige ependymomer i fossa posterior og suparentorielt graderes CNS WHO grad 2 eller 3 på baggrund af histologiske fund, men betegnelsen "anaplastisk ependymom" udgår. Myxopapillære ependymomer, som tidligere var WHO grad 1, er nu ændret til CNS WHO grad 2. Klassisk udseende spinale ependymomer graderes CNS WHO grad 2 eller 3 på baggrund af morfologi. Der angives ingen WHO grad for spinale ependymomer med MYCN amplifikation, men dette er aggressive tumorer med dårlig prognose og udtalt tendens til disseminering i CNS.

Subependymomer og myxopapillære ependymomer er de eneste ependymom subtyper, som udelukkende kan klassificeres ved histologisk undersøgelse. Ved alle de øvrige subtyper kræves der molekulære analyser, fortrinsvis methyleringsprofilering.

De øvrige gliomer og glioneuronale tumorer er sjældne og forekommer oftest hos børn og unge.

Diagnosegrundlag

Tumrvævet kan være i form af:

- A: Stereotaktiske biopsier
- B: Åbne biopsier
- C: Tumorresektater
- D: Ultralydsaspirat

Under operationen foretages der frysensnit - og evt. cytologisk undersøgelse af vævet farvet med hæmatoxylin-eosin og evt. van Gieson-Hansen-farvning.

Frysensnitundersøgelsen har tre formål:

- 1) at sikre at vævsprøven er repræsentativ
- 2) at give mulighed for en foreløbig diagnose, som vil være vejledende for det videre kirurgiske indgreb
- 3) at sikre at materialet er tilstrækkeligt, til at der kan stilles en endelig diagnose, så patienten kan få en relevant/optimal efterbehandling.

Vævet fra frysensnitundersøgelsen bevares så vidt muligt nedfrosset. Alt fjernet væv fremsendes umiddelbart uden formalinfiksering til det neuropatologiske laboratorium, hvor dets mængde og udseende bedømmes. Hvis mængden tillader det, tages et vævsstykke fra til molekulærbiologisk undersøgelse, og til den danske cancerbiobank. Vævet nedfryses og opbevares ved – 80°C (Biobank).

Ultralydsaspirat kan anvendes både til mikroskopisk diagnostik og molekulærbiologisk undersøgelse, men egentligt biopsimateriale må foretrækkes, hvis der findes tilstrækkeligt af dette materiale.

Det resterende væv fikseres i formalin i ½-1 døgn og indstøbes herefter i paraffin. Stereotaktiske biopsier kan fikseres i kortere tid, dog minimum 1-2 timer. For diagnostik udføres histologiske farvninger,

immunhistokemiske undersøgelser (IHC), in situ hybridisering (ISH) og DNA eller RNA baserede molekylærgenetiske analyser.

Den diagnostiske proces følger WHO 2021 klassifikationen og integrerer histologisk type, grad og molekylære analyser.

Følgende immunhistokemiske farvninger kan benyttes: ;GFAP, p53, Mib-1 / Ki-67, MAP-2, IDH1, Olig2 og ATRX. Hertil kommer i særlige tilfælde ved diffust midtlinje gliom undersøgelser for histon3 K27M mutation. I mange tilfælde udføres NGS analyse som blandt andet omfatter IDH1, IDH2, ATRX, TP53, BRAF V600, EGFR, TERTp, CDKN2A/B, histon 3 og 1p/19q. I alle WHO grad 4 gliomer undersøges MGMT promotor methyleringsstatus. Den optimale undersøgelsesmetode for MGMT, samt cut-off værdier kan fortsat diskuteres. De mest benyttede metoder er pyrosekventering og kvantitativ methyleringsspecifik PCR (qMS-PCR).

DNA methyleringsprofilering

DNA methyleringsprofilering er et nyttigt værktøj til klassifikation af gliomer og andre CNS tumorer, og benyttes i tiltagende omfang indenfor neuropatologisk diagnostik. Udover methyleringsklassen, giver undersøgelsen information omkring strukturelle kromosomale abnormiteter/kopi nummer variationer (CNV), som f.eks. +7/-10 i glioblastomer og 1p/19q-deletion i oligodendroglioner. Den mest benyttede metode er EPIC/Illumina microarrays, som også fungerer på formalinfikseret væv. Metoden er dog ressource- og tidskrævende, og benyttes derfor kun i særlige tilfælde. En ny og hurtigere metode er nanopore-sekventering. Denne teknik er baseret på flowceller, som indeholder små nanoporer der er permeable for elektriske ioner, indlejret i en membran. Ved at til sætte et protein der trækker DNA fragmenter gennem nanoporen frembringes en forstyrrelse i membranpotentialet, som kan afkodes og således generere en methyleringsprofil. Nanoporetteknikken kræver dog friskt DNA, men kan igangsættes i frysensnitssituationen, og allerede indenfor nogle få timers sekventering give en methyleringsbaseret diagnose, samt fremvise CNVs.

Recidiv versus strålenekrose

I næsten alle tilfælde af diffuse gliomer hos voksne vil tumor recidivere, og i de fleste tilfælde har patienten gennemgået stråle- og kemoterapi. Materialet fra reresektioner vil følgelig ofte fremstå som en varierende blanding af vitalt tumorvæv, nekrotisk debris, og non-neoplastisk hjernevæv med reaktive forandringer. De to sidst nævnte komponenter er en følge af cytotoxisk behandling. Pseudoprogression er en klinisk diagnose hvor det biologiske substrat er robust cytotoxisk respons på radiokemoterapi eller immunterapi. Radiologisk er tilstanden karakteriseret af tilsyneladende progression (oftest indenfor de første 12 uger efter afsluttet radioterapi), som så spontant forsvinder uden yderligere behandling. Der findes ingen histologisk definition af pseudoprogression, men påvisning af udelukkende behandlingsinducedede forandringer, uden vitalt tumorvæv, er et fund som understøtter den kliniske diagnose pseudoprogression. Fortolkningen vanskeliggøres dog af at ikke alt materiale som bliver fjernet ved operationen altid sendes til histologisk undersøgelse.

Det er varierende praksis hvorledes materialet ved reresektioner af gliom bliver beskrevet ved neuropatologisk undersøgelse. I et forsøg på at standardisere vurderingen, anbefaler Haider et al. (Indsæt ref.: Neuro Oncol. 2020 Apr 15;22(4):450-456. doi: 10.1093/neuonc/noz233. Toward a standard pathological and molecular characterization of recurrent glioma in adults: a Response Assessment in Neuro-Oncology effort. Ali S Haider 1, Martin van den Bent 2, Patrick Y Wen 3, Michael A Vogelbaum 4, Susan Chang 5, Peter D Canoll 6, Craig M Horbinski 7 8, Jason T Huse 9 10) at patologen tager stilling til om hvorvidt der udelukkende foreligger behandlingsinducerede forandringer, eller ved påvisning af tumorvæv; hvorvidt dette skal opfattes som recidiv ("recurrent glioma") eller resttumor ("residual glioma"). Ved resttumor ("residual glioma") forstås gliomvæv som er præget af lav til moderat cellularitet og store områder med nekrose (som kan være mineraliseret). Tumorcellerne er præget af degeneration, og fremviser ofte betydelig kerneatypi. Karrene er ofte hyalinicerede og præget af degeneration. Typisk er der ingen mitoser og lav Ki67. Ved recidiv ("recurrent glioma") ses celletæt tumorvæv, ofte med mitoser, høj Ki67 og mikrovaskulær proliferation. Dersom man påviser både residual tumor og recidiv, anbefaler Haider et al at man i diagnosen fokuserer på recidivkomponenten, da dette har størst klinisk relevans.

Følgende eksisterende koder kan benyttes ved reresektioner af gliom:

M11650: stråle- og kemoterapiforandring

M94407: glioblastom, IDH vildtype, recidiv

M94403: glioblastoma, IDH vildtype

MÆ0024: se tekst (hvis man ønsker at uddybe)

Patientværdier og – præferencer

Bedømt ud fra klinisk erfaring vurderes hver patient individuelt, og de fleste vil i udgangspunktet følge det angivne.

Rationale

Der henvises til EANO retningslinjen, som er suppleret med praktiske betragtninger, der har tilpasset anbefalingerne til danske forhold.

Bemærkninger og overvejelser

Ingen særlige bemærkninger

Onkologi

Glioblastom IDH vildtype WHO grad 4, Astrocytom IDH muteret WHO grad 4, Diffust midtlinje gliom H3 K27M muteret WHO grad 4, samt diffust hemisfærisk gliom H3.3 G34-muteret CNS WHO grad 4

Performance status 0-2:

39. Bør tilbydes postoperativ strålebehandling 60 Gy over 30 fraktioner konkomitant temozolomid og efterfølgende seks serier temozolomid (A)

Performance status 0-2 og betydelig komorbiditet eller alder >70 år:

40. Hos ældre patienter eller patienter med betydelig komorbiditet kan det overvejes at tilbyde postoperativ hypofraktioneret strålebehandling (34Gy/10F eller 40Gy/15F), konkomitant temozolomid og efterfølgende vurderes med henblik på seks serier temozolomid (A)
41. Metyleret MGMT kan behandles med temozolomid alene (A)
42. Umetyleret MGMT kan behandles med hypofraktioneret strålebehandling (A).

Performance status 3-4:

43. Tilbydes palliativ behandling (D)

Litteratur og evidensgennemgang

Adjuverende strålebehandling

Adjuverende strålebehandling har spillet en vigtig rolle i behandlingen af højgradsgliomer, som glioblastom. Gennem flere prospektive randomiserede studier fra 1970'erne har man fundet, at strålebehandling forbedrer både lokalkontrolen og overlevelsen. Retrospektive studier fra 1980'erne viser desuden, at 80-90 % af glioblastom progressioner kommer indenfor 2 cm afstand fra kavitten, hvilket har ført til brugen af fokal strålebehandling. Dette minimerer bivirkningerne samtidig med, at det sikrer effektiv behandling. Patientens performance status er et væsentligt kriterie for udvælgelse til onkologisk behandling (se bilag 5).

Selvom adjuverende strålebehandling mod tumorkaviteten samt mikroskopiske tumorceller ikke er kurativ, forbedrer den alligevel lokalkontrolen og overlevelsen efter kirurgi i forhold til kirurgi eller kemoterapi alene. Et Cochrane review konkluderer, at adjuverende strålebehandling signifikant bedrer overlevelsen med en hazard ratio på 2 (95% confidence interval (CI) 1.58 to 2.55; P < 0.00001) (61) [1a].

Strålebehandling af hele hjernen har vist sig at være forbundet med betydelig toksicitet og to studier (62, 63) [1b] har sammenlignet effekten af helhjernebestråling med fokal strålebehandling mod tumorområdet. Resultaterne viste ingen forskel i overlevelsen mellem de to behandlingsmodaliteter, hvilket har ledt til præference for fokal behandling mod tumorområdet for at reducere bivirkninger.

Ekstern konform fraktioneret strålebehandling har også vist en dosis-respons, hvor overlevelsen øges op til en dosis på 60 Gy. Der er ikke vist yderligere forbedring af overlevelse ved at øge dosis over 60 Gy. Det er ikke vist, at hyperfraktionering, brakyterapi eller radiosensitizere kan øge overlevelse og disse metoder har derfor ikke nogen plads i standard strålebehandling af højgradsgliomer (61) [1a].

Flere kliniske forsøg er i gang eller planlagt for at evaluere protonbehandlingens effektivitet og bivirkninger i behandlingen af glioblastomer. Der er på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelig evidens til at konkludere, at protonbehandling forbedrer overlevelsen eller reducerer bivirkning sammenlignet med fotonbehandling.

Konkomitant og adjuverende kemostråleterapi

Behandling af patienter med glioblastom i performance status 0-2 er blevet undersøgt i to randomiseret studier, et fase II og fase III samt anbefaldet i guideline ASCO-SNO (64) [1a]. Studierne har vist forbedret overlevelse ved at give postoperativ konkomitant kemo-strålebehandling efterfulgt af 6 serie temozolomid (67, 68) [1b].

EORTC 26981-22981 er et prospektivt randomiseret studie (65, 66) [1b] omfattende 573 glioblastom patienter i performancestatus 0-2 (alder < 65 år). Patienterne blev behandlet med strålebehandling 60 Gy over 30 behandlinger og konkomitant temozolomid 75 mg/m², efterfølgende fire ugers pause, som blev fulgt op af seks måneders adjuverende behandling med temozolomid (150-200 mg/m² dag 1-5, gentaget hver fjerde uge). Studiet viste en 2-års overlevelse på 26 % i gruppen med kombinationsbehandling sammenlignet med 10 % i kontrolgruppen, der kun fik strålebehandling. Desuden viste den opdaterede analyse, at den konkomitant behandlingen resulterede i en 5-års overlevelse på 10 % vs. 2 % i kontrolgruppen. Studiet dokumenterede også en signifikant forlængelse af tid til progression i gruppen med kombinationsbehandling, hvilket er afgørende, da tumorprogression i hjernen ofte medfører alvorlige symptomer herunder personlighedsændringer, der ned sætter patientens livskvalitet.

Et mindre randomiseret fase II studie med 110 patienter (67) [1b], viste en 2-årsoverlevelse på 14,2 % hos patienter, der var behandlet med konkomitant og adjuverende temozolomid, hvorimod ingen overlevede efter to år i den gruppe, der fik kun postoperativ strålebehandling.

TTFields virker ved at bruge elektriske felter til at forstyrre delingen af kræftceller, hvilket kan hæmme tumorvækst. Et fase III randomiseret studie (EF-14) undersøgte effekten af TTF i kombination med adjuverende temozolomid hos 695 nydiagnoserede patienter med glioblastom. Randomiseringen var 2:1 til enten af få TTFields+TZM eller TZM alene. Resultaterne viste, at patienter, der fik TTF sammen med temozolomid havde en median overlevelse på 20,9 mdr sammenlignet med 16 mdr hos patienter, der fik TZM monoterapi. Progressionsfrie overlevelse var 6,7 mdr verus 4,0 mdr ($p < 0.001$), ligesom der blev rapporterer højere 2 års ovelevelse i TTF gruppen (43%) sammenlignet med gruppen, der blev behandlet med temozolomid (31%). TTF-behandlingen er generelt veltolereret, men kan medføre hudirritation, der hvor elektroderne placeres. (68) [1b]. Da patienterne først blev randomiseret efter endt strålebehandlingen, udgør

de en meget selekteret gruppe, hvilket vanskeligør fortolkningen og implementeringen af resultaterne (69, 70) [1a].

Et systematisk review har evalueret brugen af TTFIELDS ved patienter med nydiagnosieret glioblastom (6400 patienter) og til patienter med progression (5100 patienter). Resultanterne viste, at en selekteret gruppe både nydiagnosieret og patienter med progression havde PFS på 7 mdr og OS på 21 mdr med TTFIELDS behandling, men begrænsningerne i studierne er at designet af studierne ikke har været blindet/placebo. Ligeledes skal det bemærkes at det ikke er meget bedre end standard behandling bårde for nydiagnosert glioblastom patinter og til patienter med progression. (71) [1b]

(68)

Effekt at lomustine sammen med strålebehandling og temozolomid hos patienter med nydiagnosticeret MGMT methyleret glioblastom er undersøgt i et randomiseret fase II studie med 140 patienter. Median OS var 31 måneder i standardarmen og 48 måneder i lomustine-temozolomid armen. I gruppen med kombinationsbehandling var der flere patienter, der fik alvorlige bivirkninger (59%) i forhold til gruppen, der fik standardbehandling (51%), hvilket resulterede i, at flere patienter ikke kunne gennemføre de 6 adjuverende behandlinger (72) [1b].

En analyse af en undergruppe på 200 patienter (73) [2a] relaterede man aktiviteten af enzymet, O-6-methylguanine-DNA-metyltransferase (MGMT) med det kliniske forløb. MGMT fjerner alkylgrupper fra O-6-alkylguanine, og dermed nedsættes aktiviteten af alkylerende stoffer. Resultaterne viste, at 2-års overlevelsen hos patienter med metyleret MGMT var 46 % sammenlignet med kun 13,8 % hos patienter med umetyleret MGMT.

Fire andre studier har vist, at øget dosis, hvor der gives dose dense (temodal dag 1-21)og/eller flere behandlings serier end 6 med temozolomid ikke forbedre overlevelsen eller tid til progression (74-76) [1b].

Immunterapi i kombination med strålebehandling til behandling af patienter med nydiagnosticeret glioblastom er undersøgt i to prospektive randomiserede fase III studier, Checkmate 498 og Checkmate 548.

I Checkmate 498 studiet blev 560 patienter med umetyleret MGMT randomiseret til at modtage enten nivolumab (NIVO) sammen med strålebehandling (RT) eller temozolomid (TZM) kombineret med RT. Resultaterne viste, at den mediane OS var 13,4 mdr. i gruppen med NIVO+RT sammenlignet med 14,9 mdr i gruppem, der fik TZM+RT. Den median PFS var henholdsvis 6 mdr. for NIVO+RT og 6,2 mdr. for TZM+RT (77) [1b].

Checkmate 548 studiet, der omfattede 716 patienter med methyleret MGMT, sammenlignede effekten af Nivo+RT+TZM versus placebo+RT+TZM. Primære endepunkter var PFS og OS uden steroidbehandling ved baseline. Resultaterne viste, at en median OS var 28,9 mdr versus 32,1 mdr. Nivolumab var veltolereret og den median PFS var 10,6 mdr med NIVO+RT+TZM versus 10,3 mdr med placebo+RT+TZM (78) [1b].

Baseret på disse fase III-studier kan immunterapi med nivolumab derfor ikke anbefales som standardbehandling i kombination med strålebehandling og temozolomid til patienter med nydiagnosticeret glioblastom, hverken i gruppen med umetyleret eller methyleret MGMT.

Rationale

Med baggrund i ovenstående litteraturgennemgang bør der tilbydes postoperativ strålebehandling 60 Gy

konkomitant temozolomid efterfulgt af 6 serie adjuverende temozolomid til patienter med nydiagnosticeret glioblastom i performance status 0-2, da det forbedrer PFS og OS sammenlignet med strålebehandling alene. Vurderingen af den enkelte patient, komorbiditet, performance status og prognose er vigtig før opstart af ovennævnte behandling.

Behandlingen med TTFiels er ikke anbefalet af Behandlingsrådet på nuværende tidspunkt, da det vurderes, at der ikke er et rimeligt forhold mellem den estimeret kliniske merværdi og omkostningerne til Optune behandling af nydiagnosticeret gliom WHO grad 4 sammenlignet med standardbehandlingen.

Litteratur og evidensgennemgang

Patienter over 70 år og strålebehandling

I cochrane metaanalysen (79) [1a], som inkluderede 12 RCT med i alt 1818 patienter, var formålet at finde den optimale (mest effektive og mindst toksiske) behandling for ældre patienter (over 65-70 år) med nydiagnosticeret GBM. Studierne undersøgte effekten af 60 Gy over 30 behandlinger sammenlignet med hypofraktioneret strålebehandling henholdsvis 34 Gy over 10 behandlinger, 40 Gy over 15 behandlinger og 35 Gy over 10 behandlinger og temozolomid både givet konkomitant og som singel behandling. Resultaterne viste, at konkomittant kemoradioterapi forbedrede både OS (HR 0.67, 95% CI 0.56-0.80) og PFS (HR 0.5 95% CI 0.41-0.61) sammenlignet med hypofraktioneret strålebehandling (73-76) (1a) Hypofraktionering kan således være en alternativ mulighed hos patienter med kort forventet restlevetid, hvor prognostiske faktorer såsom høj alder og dårlig performancestatus er afgørende for valg af behandling (80) [1b].

For patienter over 70 år kan MGMT-status være en hjælp til vurdering af behandlingsvalg. I NOA-08 studiet, blev det vist, at patienter med MGMT metyleret glioblastom behandlet med temozolomid alene havde en gennemsnits overlevelse på 8.5 mdr. versus 4.8 mdr. ved strålebehandling (81, 82) [1b]. Omvendt havde ældre patienter med umetyleret MGMT en bedre effekt af strålebehandling end af temozolomid alene (82, 83) [1b].

Patienter med performance 3-4

Patienter med performance status 3-4 og hvor der kun er taget en biopsi, er palliativ behandling ofte den bedste løsning. Steroid behandling til at nedsætte det tumorale ødem samt anti-epileptisk behandling kan være gode palliative tiltag, for at bedre patientens livskvalitets.

Rationale

På baggrund af den gennemgåede litteratur bør patienter over 70 år med glioblastom IDH vildtype WHO grad 4, samt astrocytom IDH-mut grad 4, som er i god performance status (0-2) og uden betydelig komorbiditet, tilbydes strålebehandling (60 Gy på 30 fraktioner) samt konkomitant og 6 serier adjuverende temozolomid, som er mere effektiv end enten temozolomid eller strålebehandling alene.

MGMT status bør dog overvejes nøje, da patienter over 70 år med methyleret MGMT kan tilbydes temozolomid alene, hvilket kan forbedre deres overlevelse.

Astrocytom IDH muteret WHO grad 3

44. Bør tilbydes postoperativ strålebehandling 59,4 Gy over 33 fraktioner efterfulgt af 12 serier adjuverende temozolomid (A)

Litteratur og evidensgennemgang

EORTC fase III (CATNON) undersøgelsen inkluderede 745 patienter med anaplastisk gliom uden 1p19q co-deletion. Patienterne blev randomiseret i fire grupper: strålebehandling alene, strålebehandling med konkomitant temozolomid, strålebehandling sammen med 12 serier adjuverende temozolomid, og strålebehandling med både konkomitant og 12 serier adjuverende temozolomid (84) [1b].

Første interimsanalyse (2018) viste, at 5-års overlevelse var 56% i grupperne, der fik adjuverende temozolomid i forhold til 44% i grupperne, der ikke fik adjuverende temozolomid. Anden interimanalyse (2021) viste, at konkomitant temozolomid ikke øgede OS signifikant. Supplerende analyser med patienter med IDH1/2 muterede tumorer (444 patienter) viste markant overlevelse gevinst ved behandling med adjuverende temozolomid med 5-års OS på 82,8% i forhold til 64,8% i grupperne, der ikke fik adjuverende temozolomid (85) [1b].

NOA-04 studiet, randomiserede 318 patienter både med oligodendrogiom eller astrocytom WHO grad 3 til enten adjuverende strålebehandling eller adjuverende kemoterapi med enten PCV (procarbazin, lomustin (CCNU), vincristin) eller temozolomid. Studiet tillod cross-over ved progression eller toksicitet. Resultaterne viste, at behandlingsstrategier var lige effektive både med hensyn til progressions fri overlevelse samt total overlevelse. Patienter, der modtog PCV fik mere alvorlig hæmatologisk toksicitet (grad 3 og 4), flere neuropatier og stigninger i transaminase sammenlignet med dem, der modtog temozolomid (86) [1b]

Rationale

På baggrund af disse data er konklusionen, at patienter med astrocytomer IDH muteret WHO grad 3, bør behandles med strålebehandling og 12 serie adjuverende temozolomid, da denne kombinationsbehandling forbedrer både PFS og OS signifikant i forhold til strålebehandling alene.

Oligodendrogiom IDH muteret og 1p19q co-deleteret WHO grad 3

45. Bør tilbydes postoperativ strålebehandling 59,4 Gy over 33 fraktioner efterfulgt af 6 serier PCV (lomustin, procarbazin, vincristin) (A).

Litteratur og evidensgennemgang

Guideline ASCO-SNO (87) [1a] og et cochrane review fra 2014 (88) [1a] konkluderer, baseret på to randomiserede fase III studier, udført af EORTC og RTOG, at der er en forlænget overlevelse for patienter, der modtog kemoterapi med procarbazin, lomustin og vincristin (PCV-regime) ved deres primære strålebehandling (89, 90) [1b]. Effekten af kemoterapi var ens uafhængig af, om det blev givet før eller efter strålebehandling.

EORTC26951 studiet, som omfattede 368 patienter, undersøgte effekten af seks serier adjuverende PCV givet umiddelbart efter den primære strålebehandling (91) [1b].

RTOG9402 studiet, der omfattede 289 patienter, undersøgte effekten af fire serier neoadjuverende PCV givet umiddelbart før den primære strålebehandling (92) [1b]. Begge studier viste en signifikant øget progressionsfri overlevelse, men ikke en forlænget samlet overlevelse sammenlignet med strålebehandling alene i den første opgørelse (93, 94) [1b]. Ved anden opgørelse med en betydelig længere opfølgning periode viste begge studier (89, 90) [1b] en betydelig forlænget overlevelse ved at supplere strålebehandlingen med kemoterapi med PCV-regimet. Det blev desuden påvist, at OS var størst i den undergruppe, der havde co-deletion af 1p19q. I EORTC26951 er median OS endnu ikke nået i gruppen med 1p19q-codeletion versus 9,3 år i den anden gruppe. RTOG9402 viste en median OS på 14,7 år versus 2,6 år. Yderligere analyser (95) [2b] viste, at effekten er størst i den undergruppe, der ligeledes har muteret IDH (fortrinsvis IDH1-positive patienter).

NOA-04, (86) et randomiseret og sekventielt studie, som undersøgte effekten af strålebehandling versus temozolomid eller PCV. Resultaterne viste, at kemoterapi alene ikke øger PFS eller OS i forhold til strålebehandling.

CODEL (96) [1b] er et prospektivt randomiseret fase III studie for patienter diagnosticeret med 1p/19q-codeleteret anaplastiske oligodendroglioner, som undersøgte effekten af strålebehandling versus strålebehandling samt konkomitant og adjuverende temozolomid versus temozolomid alene. I alt blev 36 patienter randomiseret med 12 patienter i hver arm. Resultaterne viste, at PFS var kortere ved behandling med Temozolomid alene sammenlignet med strålebehandling (HR =3.12; 95% CI 1.26, 7.69; P=0.014). Da resultater fra EORTC og RTOG studierne viste betydeligere længere PFS og OS ved behandling med strålebehandling og PCV, blev designet af CODEL-studiet ændret til at sammenligne strålebehandling og PCV versus strålebehandling og temozolomid. Disse resultater foreligger ikke endnu.

Det er også vigtigt at vurdere de langsigtede konsekvenser af strålebehandling og kemoterapi for patienter, der bliver langtidsoverleverer; hvordan klarer de sig kognitivt og hvordan er deres livskvalitet. Et systemisk review (97) [1a] har undersøgt kognitiv funktion og livskvalitet efter strålebehandling versus ingen strålebehandling, eller forskellige typer af strålebehandling for gliom patienter (undtaget GBM) minimum 2 år efter diagnosen. Resultaterne tyder på, at strålebehandling kan forværre den kognitive funktion hos langtidsoverleverer, men graden af denne forværring er uklar. Det er også uklart, om kemoterapien giver kognitive langtidsbivirkninger.

SNO (Society for Neuro-Oncology) har udarbejdet et review ang behandlig af IDH-muterede gliomer, hvor de konkluderer, at alle tidlige studier er udført uden kendskab til IDH-mutationen og 1p19q codeletion status. Dette har betydning for tolkning af resultater fra disse studier, da subgruppeanalyser på de forskellige grupper først blev udført efterfølgende..

Samlet set viser analyserne, at gliomer med IDH-muteret status har en bedre PFS og OS sammenlignet med gliomer med IDH-viltype. Der er dog stadig usikkerhed om, hvorvidt patienter med IDH muterede gliomer bør behandles med RT kombineret med enten PCV eller TZM fra starten eller om man eventuelt kan vente med at give strålebehandling indtil tumorprogression, så den kognitive funktion ikke forværres. For nuværende venter

man på resultater fra igangværende POLCA- og NOA-18 studiet, som forventes at kunne give svar på, hvordan disse patienter bedst behandles fremover (98, 99) [1b].

Rationale

Med baggrund i ovenstående litteraturgennemgang anbefales det, at patienter med oligodendrogiom IDH-mut og 1p/19q-codeleteret WHO grad 3 tilbydes strålebehandling og PCV, da dette resulterer i betydeligt længere PFS og OS. Om PCV gives før eller efter strålebehandling er underordnet. Patienternes kognitive funktion og livskvalitet kan forværres efter strålebehandling, men graden af denne forværring er uklar.

Astrocytom IDH muteret WHO grad 2, og Oligodendrogiom IDH muteret og 1p/19q co-deleteret WHO grad 2, som er makroradikalt opereret eller ikke makroradikalt opereret uden symptomer

46. Anbefales observation (B)

Astrocytom IDH muteret WHO grad 2, og Oligodendrogiom IDH muteret og 1p/19q co-deleteret WHO grad 2, som har resttumor med symptomer eller progredierende inoperabel tumor eller vurderet højrisiko for progression

47. Tilbydes postoperativ strålebehandling 50,4 Gy over 28 fraktioner efterfulgt af 6 serier PCV (lomustin, procarbazin, vinkristin) (A)

Litteratur og evidensgennemgang

Strålebehandling

Strålebehandling til lav-grads gliomer er gennemgået i et cochrane review (100) [1a], hvor konklusionen er, at postoperativ strålebehandling øger den progression frie overlevelse for de patienter, der ikke er makroradikal opereret. Derimod kan patienter, som er makroradikal opereret, observeres uden efterbehandling.

Rationalet for strålebehandling er blevet undersøgt i flere studier (101, 102) [1b], som viser, at den progressionsfrie periode (5,3 år versus 3,4 år: HR, 0,59; 95% CI 0,45 til 0,77) er længere hos patienter, der gennemgik både operation og strålebehandling, sammenlignet med dem som udelukkende fik kirurgisk behandling. Overlevelsen var dog ens i begge grupper (7,4 år versus 7,2 år: HR 0,97; 95% CI 0,71 til 1,34). Mange patienter, der ikke fik strålebehandling initialt, modtog det senere ved progression. Frekvensen af malign transformation er ens mellem de to behandlingsstrategier, og det er fortsat uafklaret, om livskvaliteten påvirkes af behandlingerne. Patienter, som har stabil sygdom, og hvor der kan gennemføres en sikker opfølgning, anbefales det derfor at vente med strålebehandling indtil progression.

På basis af disse data har EORTC forsøgt at konstruere en prognostisk profil, der kan identificere lavrisiko- og højrisikopatienter. Alder over 40 år, primære neurologiske deficit, astrocytær histologi, tumordiameter over 6 cm og tumor, der krydser midtlinjen, var uafhængige prognostiske faktorer associeret med dårlig overlevelse

(103, 104) [2b]. Højrisikopatienter bør i særlig grad kontrolleres med henblik på mulig strålebehandling ved progression.

Stråledosis er undersøgt i to randomiserede studier, der sammenlignede standarddosis (45-50.4 Gy) og høj stråledosis (60-64.8 Gy) (105, 106)[1b]. Disse studier viste, at forskellen i stråledosis ikke havde nogen effekt på den samlede overlevelse eller progressionsfrie overlevelse. Højere stråledosis var derimod associeret med mere udtalt strålenekrose og neurotoksicitet end standarddosis.(107)

De randomiserede studier viste, at sygdomskontrol kan opnås med brug af stråledoser imellem 45 og 54 Gy.(108) (1b) Det anbefales derfor, at strålebehandling gennemføres som konform behandling med 50,4 Gy over 28 gange med fem ugentlige behandlinger. For ældre patienter og dem med dårlig performancestatus, kan hypofraktioneret konform strålebehandling overvejes; f.eks med 34 Gy over 10 fraktioner.

Et review fra cochrane library (97) [1a] har vurderet langtids bivirkning i form af neurokognitive skader (nedsat hukommelse, koncentration, kommunikation og tænkehastigheden) ved strålebehandling med eller uden kemoterapi. Konklusion er, at evidensen for neurokognitive skade på langt sigt er usikker, også når kemoterapi gives adjuverende. Det påpeges dog, at der muligvis er en øget risiko for neurokognitiv skade ved strålebehandling, men det kan også skyldes tumorprogresion.

Adjuverende kemoterapi

En metaanalyse fra EANO/SNO (107) (1a) og en guideline fra ASCO-SNO (64) [1a] konkluderer, at strålebehandling og efterfølgende kemoterapi med PCV øger både den progressionsfrie overlevelse og samlet overlevelse (13.3 år versus 7.8 år).

Opdateret resultater fra RTOG9802 (109) [1b] (108) viser, at strålebehandling med tillæg af adjuverende kemoterapi med PCV-regime væsentligt forlænger 5-års overlevelse fra 64 % til 73 %, mens 10-års overlevelse steg fra 41 % til 62 %.

Foreløbige opgørelse af et randomiseret fase III studie i EORTC-regi (110) [1b], tyder ikke på at kemoterapi alene med temozolomid kan give bedre sygdomskontrol end strålebehandling hos patienter med højrisiko lavgradsgliom.

Et review fra 2020 (111) [1a] vurderede effekten af strålebehandling kombineret enten med adjuverende TZM eller PCV. Konklusionen var, at patienter med IDH muteret gliom og god PS, har en bedre OS, når de behandles med strålebehandling og PCV versus strålebehandling og TZM. Dog kan TZM anvendes som alternativ, hvis der vurderes, at PCV er for toksisk.

Indigo-studiet (112) (1b) er et dobbeltblindet, fase 3 studie, der undersøgte effekten af vorasidenib hos 331 patienter med IDH-muteret gliom WHO grad 2. Alle inkluderede patienter havde enten resttumor eller progression, de havde ikke tidligere modtaget strålebehandling eller kemoterapi, var og alle patienter var blevet vurderet kandidater til en watch-and-wait tilgang. Patienterne blev randomisret til enten placebo eller vorasidenib (40 mg dagligt). Median follow-up var 14.2 måneder.

Resultaterne viste, at PFS var betydeligt bedre i vorasidenib-gruppen sammenlignet med placebo-gruppen (28 mdr. versus 11 mdr.). Desuden blev tiden til næste intervention (operation, strålebehandling eller kemoterapi) t forlænget i vorasidenib gruppen. En af de rapporterede bivirkninger ved behandlingen var forhøjet transaminaser. Et vigtigt aspekt ved studiet er, at det tillod crossover mellem grupperne. Dette betyder, at patienter i placebogrupperne kunne skifte til vorasidenib ved progression, hvilket kan komplikere vurderingen af den samlede overlevelse. (113) [2a].

Rationale

På baggrund af den samlede evidens anbefales det, at patienter diagnosticeret med astrocytom IDH-muteret grad 2 og oligodendrogliom IDH-muteret og 1p/10q co-deleteret grad 2, henvises til postoperativ strålebehandling, såfremt de har resttumor, som medfører symptomer, der ikke kan håndteres medicinsk, eller hvis de har progredierende ikke-operabel tumor. Valget mellem typen af strålebehandling, proton vs foton vurderes i den onkologiske afdeling.

Selvom kemoterapi alene med PCV eller TZM kan overvejes for at undgå stråle-induceret kognitive skader, viser foreløbige data, at dette kompromitterer OS. Derfor bør der gives strålebehandling og adjuverende PCV for patienter med astrocytom IDH-muteret grad 2 og oligodendrogliom IDH-muteret og 1p/10q co-deleteret grad 2.

Vorasidenib er endnu ikke blevet godkendt af Medicinerrådet, hvilket betyder, at behandling ikke anbefales på nuværende tidspunkt i Danmark (EMA). Indtil en officiel vurdering og godkendelse er foretaget, bør brugen af vorasidenib i klinisk praksis derfor afventes, og patienter bør informeres om de nuværende begrænsninger i anbefalingerne.

Progression af højgrads gliomer

48. Patienten bør vurderes mht. re-operation (B)

49. Patienten bør vurderes til behandling med temozolomid, lomustin eller bevacizumab evt. i kombination med irinotecan (B)

Litteratur og evidensgennemgang

Alkylerende kemoterapi med lomustin eller reinduktion af temozolomid er undersøgt i 2 studier, der viser, at behandlingerne er lige effektive med 6 måneders progressions fri overlevelse på 15-25 % (70, 91) [1b].

EORTC 26101, et fase III studie, viste, at kombinationen af lomustin og bevacizumab giver en forlænget progressionsfri overlevelse (4.2 mdr versus 1.5 mdr), HR 0.49; 95% CI 0.39 til 0.61; P >0.001), men øger ikke den samlede overlevelse sammenlignet med enkeltstof lomustin. Mange patienter i gruppen, der primært fik enkeltstof lomustin, fik bevacizumab ved progression og bevacizumab alene viste responsrater på omkring 30 % (114) [1b]. Tilsvarende er set i to randomiseret fase 2 studier med bevacizumab og irinotecan versus

bevacizumab (92, 115) [1b]. Studierne viste, at overlevelsen var det samme, men der var en signifikant forlænget progressionsfri overlevelse. Bevacizumab bidrog desuden til symptom kontrol og havde en steroid besparende effekt (116, 117) [1b].

Tumorprogression kan være korreleret til alvorlige neurologiske skader, hvorfor tumorkontrol og behandling af ødem omkring tumor er vigtige for patientens livskvalitet. Det initiale respons på behandling med bevacizumab er desuden korreleret til samlet overlevelse (118) [2a].

I Cochrane metaanalyse (119) [1a], var formålet at vurdere yderligere behandlings tiltag ved progression/tilbagefald efter Stupp-regimet. De inkluderede i alt 42 studier, hvoraf 34 studier var randomiseret og 8 ikke randomiseret med i alt 5236 patienter. Median OS var fra 5.5 mdr. til 12.6 mdr. og median PFS var fra 1.5 mdr til 4.2 mdr. Konklusionen var, at kombinations behandlinger sammenlignet med lomustine som monoterapi ikke forbedrede OS væsentligt, men øgede risikoen for bivirkninger.

Både høj-og lavgrads gliomer, som progredierer og har BRAF(v600E) mutationer, er blevet undersøgt i et basket studie, der blev gennemført i perioden 2014-2018. Dette fase 2, open-label, singel-arm studie inkluderede i alt 58 patienter og vurderede effekten af kombinationsbehandling med i Dabrafenib og Trametinib. Resultaterne viste, at behandlingen generelt blev godt tolereret, selvom 53% rapporterede træthed som en bivirkning. I gruppen af patienter med højgrads gliomer, hvor den var median follow-up var 12.7 måneder, opnåede 15 af 45 patienter objektive responser herunder 3 med komplet respons og 12 med partiell respons. 9 ud af de 13 patienter med lavgrads gliom havde 1 patient t komplet respons og 6 partiell respons. (120) [2a]. Dog er evidensen stadogvæk meget begrænset.

NGS(Next-Generation Sequencing) til patienter med progression af gliomer kan bruges til at identificere molekylære forandringer, der i begrænset tilfælde kan guide behandlingsvalg, især i tilfælde hvor standardbehandling ikke er tilstrækkelig eller udtømt. NGS kan identificere kliniske relevante mutationer, såsom IDH1/2 og BRAF-V600E-mutationer samt genfusioner FGFR1-3 og NTRK, der potentielt kan målrettes med eksisterende lægemidler. Selvom NGS sjældnet ændre behandlingsforløbet for de fleste patienter med progression af glioblastom, kan det identificere de patienter, som er kandidat til kliniske forsøg eller off-label brug af målrettede lægemidler. For patienter med BRAF V600E-mutation kan targeted behandling være en mulighed. Tumor-agnostiske mål som NTRK-fusioner og høj tumor mutationsbyrde (TMB) kan være relevante, men dokumentationen for effektiviteten i CNS-tumorer er begrænset, og behandling bør fortrinsvis ske i kliniske forsøg. Den samlede kliniske nytteværdi af NGS er stadig under udvikling, derfor bør NGS primært anvendes til patienter med god almentilstand. For patienterne med dårlig almentilstand er der begrænset nytte af NGS, da de sjældnet kan drage fordel af de opdagende genetiske forandringer. (121) (122) [2a+2a]

Rationale

Patienter med progression af højgrads gliomer bør vurderes med henblik på behandling med temozolomid, lomustine eller bevacizumab, da effektiv tumorkontrol er afgørende for at opretholde en god livskvalitet.

Da der ikke findes overbevisende evidens for den optimale behandling ved progression af højgrads gliomer, bør disse patienter tilbydes behandling i protokolleret studier og evt. vurderes med henblik på genomisk profilering, hvis performance status tillader det.

Progression af lavgrads gliomer

50. Patienten bør vurderes mhp operation (B)

51. Patienten bør vurderes mhp onkologisk behandling (B)

Litteratur og evidensgennemgang

Der er evidens for, at behandling med temozolomid kan være effektiv hos patienter med oligodendroglioner, der progredierer efter PCV-regime (123) [1c]. Studier har vist, at temozolomid kan opnå god sygdomskontrol og kontrol af epilepsi hos omkring 50 % af patienterne med lav-grads gliomer. (124-127)[1c].

Et randomiseret fase II studie (128) [1c] med bevacizumab versus bevacizumab og temodal til patienter med progresjon af gliom WHO grad 2 og 3 uden 1p/19q co-deletion viste ikke signifikant forskel på OS eller PFS.

Rationale

Konklusionen er, at der bør overvejes behandling med PCV eller temozolomid ved progression hos patienter med lav-grads gliom. Behandlingsvalget kan tilpasses den individuelle patients sygdomsprofil og respons på tidligere behandlinger.

Ependymom WHO grad 1 og 2, makroradikalt opereret:

52. Anbefales observation (D)

Ependymom WHO grad 1 og 2, ikke makroradikalt opereret:

53. MR-skanning af kraniospinalaksen skal foreligge og hvis denne skanning er negativ for tumor-seeding, bør der udføres cerebrospinalvæskeundersøgelse for tumorceller (C)

54. Re-operation af resttumor bør overvejes hvis første operation ikke har været tilfredsstillende (C)

55. Anbefales postoperativ strålebehandling 54-59,4 Gy over 30-33 behandlinger (C)

Ependymom WHO grad 3 uden spinal metastasering:

56. Anbefales postoperativ strålebehandling 54-59,4 Gy over 33 behandlinger (B)

Ependymom WHO grad 3 med spinal metastasering:

57. Anbefales postoperativ strålebehandling med 36 Gy over 20 behandlinger mod hele kraniospinalaksen, der suppleres op til 50,4 Gy over 28 behandlinger mod spinale metastaser og 59,4 Gy over 33 behandlinger mod det cerebrale tumorområde (B)

Ependymom WHO grad 3 med progression efter strålebehandling:

58. Kan tilbydes kemoterapi behandling (D)
59. Kan i sjældne tilfælde tilbydes rebestråling ved langt sygdomsfrat interval (D)

Litteratur og evidensgennemgang

Ependymomer er sjældne, og der findes ingen klinisk kontrollerede, randomiserede undersøgelser, hvorfor det er vanskeligt at opstille retningslinjer for optimal ikke-kirurgisk behandling. Et retrospektivt studie af WHO grad 2 ependymom i voksne har vist at 5- og 10- års overlevelsen er 86 % og 81 % uden strålebehandling. De vigtigste prognostiske faktorer for overlevelsen var performance status, makroradikal fjernelse af tumor samt tumorlokalisationen (129) [2b].

Ependymomer inddeltes i to grupper, lavgrads-ependymomer (WHO grad 1+2) og anaplastiske ependymomer (WHO grad 3). Ependymomer kan spredes via cerebrospinalvæsken, hvor især de anaplastiske tumorer har potentielle for at sprede sig langs neuroaksen. Derfor er supplerende diagnostik essentiel, inden beslutning om efterbehandling træffes (130, 131) [2a]. Den supplerende diagnostik bør som minimum være i form af MR-skanning af neuroaksen, og hvis denne skanning ikke påvise tumor-seeding, bør cerebrospinalvæske undersøges for tumorceller (130) [2a].

Strålebehandling

Postoperativ strålebehandling for ependymom WHO grad 3 er undersøgt i et prospektivt og to retrospektive studier, som konkluderer at postoperativ strålebehandling øger overlevelsen (138-140) [2b].

Et prospektivt studie med 48 patienter, hvor alle blev opereret med efterfølgende strålebehandling, var 10 års overlevelsen 47 % og relaps-free overlevelse 42 %. Studiet viste en god lokal kontrol og lav risiko for spinal seeding (132) [2b]. Yderligere to små retrospektive studier (133, 134) [2b] viser, at postoperativ strålebehandling bør gives til ependymom grad 3 samt ependymom grad 2, hvor makroradikal operation ikke er opnået, hvilket medfører en øget 5- og 10-års overlevelse henholdsvis til 71 % og 55 %.

En metaanalyse fra 2024 konkluderer også, at postoperative strålebehandling ikke signifikant forbedrer overlevelse efter total resektion af ependymom WHO (129, 135) grad 2, men anbefales ved subtotal resektion for at forbedre overlevelsen. (136) (2a)

Dog viste en subgruppeanalyse i et af studierne, at postoperativ strålebehandling forbedrede både progression fri overlevelse og samlet overlevelse for ependymomer WHO grad 2, hvor makroradikal fjernelse ikke var opnået (135) [3c].

Rebestråling ved recidiv

De fleste recidiver er lokale, men ca. 10 % er spinale. Ved lokalrecidiver er reoperation førstevalget. Rebestråling, enten i form af normofraktioneret, hypofraktioneret, stereotaktisk eller proton behandling har vist effekt. To retrospektive studier (137, 138) (2b) med henholdsvis 38 og 18 pædiatriske patienter med recidiv af ependymom, blev genbestrålet med 54 Gy. Tre-års overlevelsen var 81 %, men med øget neurokognitiv toksicitet. Rebestråling med protoner er forsøgt i et lille studie på 20 patienter, hvor en median dosis på 50,4 GyRBE blev givet. 3-års overlevelsen var 78 % og progression fri overlevelse var 28 % (139) [2b].

Kemoterapi

I de tilfælde, hvor patienten tidligere har fået strålebehandling, kan kemoterapi overvejes. Flere kemoterapeutika er aktive enten som monoterapi eller i kombination, men responsraten er dog beskeden (10-20 %), og der findes ikke prospektive, randomiserede studier. Kombination af carboplatin, etoposid og vincristin kan overvejes, da denne giver klinisk relevante responsrater.

Temozolomid kan være en anden mulighed, men de fleste studier er case-reports. Et enkelt retrospektivt studie med 18 patienter med recidiv af ependymom WHO grad 2 og 3, som tidligere var behandlet med operation og strålebehandling, viste en progressionsfri overlevelse på 9 mdr. og samlet overlevelse på 30 mdr med temozolomid(140) [3b].

Et prospektivt fase II studie (141) [2b] med 50 patienter med recidiv af ependymom (WHO grad 1, 2, 3 og spinal) viste, at behandling med lav-dosis temozolomid og lapatinib var veltolereret, samtidig med at patienterne oplevede en reduktion i sygdom-relateret symptomer. Median PFS var 7,9 mdr (95% CI: 5,5-12,2) 6- og 12 mdrs PFS var 55% og 38%.

Patientværdier og – præferencer

Ud fra klinisk erfaring vurderes hver patient individuelt, og de fleste vil i udgangspunktet følge det angivne.

Rationale

På baggrund af den gennemgåede litteratur bør patienter med ikke makroradikal opererede ependymom WHO grad 2, samt anaplastisk ependymom WHO grad 3 tilbydes postoperativ strålebehandling, da der ses en betydelig signifikans på 5-og 10-års overlevelse. Anbefalingerne baseres på EANO-retningslinjen fra 2021 (4) [1a], tilpasset danske forhold gennem praktiske betragtninger.

Bemærkninger og overvejelser

Ingen særlige bemærkninger

Steroid behandling

60. Patienter bør behandles med højdosis steroid ved kliniske symptomer eller hvor billeddiagnostik har vist masseeffekt (A)

61. Steroidbehandling bør ikke gives profylaktisk under strålebehandling, men kan gives ved symptomer på forhøjet intrakranielt tryk og ved steroidresponsiv neurologisk deficit (C)
62. Ved hypofaktioneret strålebehandling kan der gives kortvarig profylaktisk steroidbehandling (C)
63. Steroid kan i sjældne tilfælde have en funktion som symptomatisk behandling i det palliative forløb. Epilepsi eller let hovedpine, som kan behandles sufficient med hhv. antiepileptika eller håndkøbsanalgetika, bør ikke i sig selv behandles med steroid (D)
64. Der bør screenes for risikofaktorer (osteoporose, diabetes mellitus, gastrit/ulcus) og der bør handles i forhold til disse efter de gældende nationale retningslinjer (C)
65. Steroidbehandling aftrappes så hurtigt som muligt til lavest mulig vedligeholdelsesdosis evt. seponering for at undgå bivirkninger (A)

Litteratur og evidensgennemgang

Steroidbehandling med glukokortikoider (GK) reducerer hjerneødem, der er forårsaget af tumorer, hvilket har været veldokumenteret siden slutningen 1950'erne (142-144) [4, 2b].

Princippet for al behandling med GK er at opnå og vedligeholde en tilfredsstillende klinisk effekt ved brug af den lavest mulige dosis i den kortest mulige tid. Der skal stiles mod at anvende et steroid med minimal mineralokortikoid effekt af hensyn til bivirkningsprofilen.

Steroidbehandling bør anvendes fra diagnosetidspunktet og nedtrapning vil ofte kunne påbegyndes umiddelbart postoperativt. En del patienter vil have behov for fortsat steroidbehandling, evt. med forbigående øgning af dosis, under et strålebehandlingsforløb.

Ved progression af tumor, hvorved ødemdannelse på ny kan forårsage fokale neurologiske udfald og/eller symptomer på forhøjet intrakranielt tryk, er genoptag af steroidbehandling eller øgning af eksisterende dosis ofte nødvendig.

Den kliniske effekt af steroidbehandling er mest udtalt over for symptomer på forhøjet intrakranielt tryk i form af hovedpine, kvalme, opkastninger eller bevidsthedssvækkelse, men der observeres også effekt på fokale udfald såfremt disse er forårsaget af peritumoralt ødem. Effekten er størst overfor nylig opståede symptomer i forhold til symptomer, som har været til stede i længere tid (145, 146) [2b].

Patienter, som ikke oplever fokal neurologisk bedring efter GK-behandling, har oftest tumorer, som vokser ind i elokvente områder med funktionel destruktion til følge, og ikke reversible symptomer forårsaget af hjerneødem.

Epilepsi og hovedpine skal først og fremmest behandles med relevant medicin mod de respektive symptomer og ikke per automatik med steroid eller øgning af sterioddosis hos en patient, som allerede er i steroidbehandling. Forværring af hovedpine eller øget frekvens af epileptiske anfall skal føre til overvejelser om baggrunden herfor, inklusiv overvejelser om re-skanning mhp afklaring af eventuel forværring af peritumoralt ødem der ville kunne foranledige berettiget og midlertidig øgning af steroidbehandling eller genoptag af en allerede seponeret behandling.

Valg af præparat og dosis

Der foreligger ingen dokumentation for, at man bør foretrække et GK-præparat frem for et andet, hvad angår klinisk neurologisk effekt. Den mineralokortikoide effekt bør undgås, hvorfor netop dexamethason eller prednisolon almindeligvis foretrækkes (146-150) [2a].

Der anvendes initialt doser på 75 (-125) mg methylprednisolon (100-150 mg prednisolon) eller ækvipotente doser af andre præparater. I et omfattende review fra 2019 fandt Jessurun et al ikke evidens for anbefaling af specifik dosis, behandlingsvarighed og aftrapningsregime ud over hvad der må anses for expert opinion (151) [5].

I anbefalinger fra Congress of Neurological Surgeons finder ikke evidens for mere detaljerede anbefalinger end lavest mulig dosis i kortest mulig tid, dog under hensyn til individuelle patientforhold (152) [3]. I en meta-analyse fra 2021 fandt Petrelli et al at steroidbehandling har negativ indflydelse på både OS og PS hos gliompatienter (153)

Der er pågående studier om steroidbesparende farmaka til anvendelse ved peritumeralt hjerneødem (154-156)[4] Der foreligger endnu ingen konklusioner eller evidensbaserede anbefalinger vedrørende non-steroide farmaka med dette behandlingsmål.

Atrapning af steroidbehandling

Steroidbehandling bør atrappes så snart og så hurtigt som muligt, og man bør stile mod enten seponering eller den lavest mulige vedligeholdelsesdosis. GK's virkning på hjerneødem aftager efter få måneders behandling, formentlig pga. nedregulering af GK-receptoren. Langtidsbivirkningerne er betydende og der er høj evidens for, at vedvarende behandling kan have negativ indflydelse på overlevelsen hos gliompatienter (153, 157, 158) [2b].

Ved større tumorrest og/eller ødem tilstræber man, for at undgå en hurtig klinisk forværring, langsommere atrapning, eventuelt med dosisreduktion på 25 % pr. uge eller 5-10 mg prednisolon hver fjerde dag eller ugentligt.

Hvis en patient i aftrapningsforløbet får tiltagende hovedpine, synsforstyrrelser, meget forlængede søvnperioder etc., bør prednisolon-dosis øges til det niveau, hvor patienten sidst var uden de pågældende symptomer.

Atrapning kan medføre tre hovedtyper af symptomer:

1. Forværring af i forvejen bestående neurologiske udfald.
2. Pseudoreumatisme med artralgier og myalgi. Kræver meget langsom nedtrapning.
3. Binyrebarkinsufficiens. Viser sig ved træthed, hudpigmentering, vægttab, hovedpine og evt. feber. Akut binyrebarkinsufficiens er en potentiel livstruende tilstand, som kan udvikles i løbet af timer til dage og er præget af kvalme, opkastninger, hypotension, hypoglykæmi og evt. kollaps. Akut binyrebarkinsufficiens behandles intravenøst med kortisoldrop og dette er en endokrinologisk specialistopgave.

Atrapningen bør altid foretages individuelt tilpasset under tæt klinisk observation for forværring i tilstanden. Efter ekstensiv tumorresektion og hos patienter med begrænset hjerneødem bør steroidbehandlingen atrappes mest muligt inden for 2-3 uger med dosisreduktion på 50 % hver fjerde dag til ophør eller lavest mulige vedligeholdelsesdosis. Der er sparsom evidens for entydige retningslinjer for, hvorledes atrapningen bør finde sted og hvor hurtigt, men der er generel konsensus om, at kortest mulig behandlingsvarighed og lavest mulig dosis skal tilstræbes (147, 149, 153, 154, 159) [3].

Planen for atrapning og eventuel vedligeholdelsesdosis skal anføres i journalen og i epikrisen.

Patienter, som udskrives til hjemmet, skal instrueres mundtligt og skriftligt i atrapningsplanen.

Såfremt patienten overflyttes til anden afdeling eller udskrives til postoperativ strålebehandling, bør det forinden overvejes, om behandlingen skal seponeres eller blot justeres inden påbegyndelse af strålebehandlingen.

Bivirkninger ved steroidbehandling og håndtering af disse

Bivirkninger er afhængige af dosis og varighed af behandlingen og er efter kort tids GK-behandling (1-3 uger) beskedne, men kan dog efter længere tids behandling være alvorlige.

Der foreligger ikke evidens for, at dosisstørrelse og varighed af behandlingen er korreleret til risiko for udvikling af binyrebarkinsufficiens (160) [3a].

Endokrine bivirkninger

Ved højdosis GK-behandling induceres ofte hyperglykæmi evt. diabetes mellitus (DM), eller en bestående DM kan destabiliseres og blive vanskelig at behandle. Sådanne tilfælde bør overvejes konfereret med endokrinolog, og nødvendigheden af glukokortikoidbehandlingen genovervejes. Der anbefales rutinemåling af blod-glukose i den første tid efter behandlingsstart. Cushing syndrom kan ses ved længere tids behandling.

Gastrointestinale bivirkninger

GK-behandling kan forårsage gastritis eller ulcus duodeni/ventriculi.

I Danmark er der tradition for rutinemæssigt at påbegynde konkomitant behandling med et PPI -præparat hos patienter i højdosis GK behandling, uagtet den forventede behandlings varighed.

Der er få studier på området men en vis konsensus om det rimelige i at overveje at supplere med PPI/H2 blokkere (161-163) [4].

Dette gælder specielt ved samtidig behandling med NSAID eller hos særlige risikopatienter. Et større review fra 2017 er der ikke fundet absolut indikation for syrepumpehæmmende behandling (164) [3a].

Muskuloskeletale bivirkninger

Muskelatrofi er en ikke sjælden bivirkning, der er afhængig af dosis og behandlingsvarighed (154, 165) [2b]. Signifikant reduceret QoL og reduceret fysioterapeutisk trænbarhed er beskrevet hos cancerpatienter med myopatiske bivirkninger til længere tids steroidbehandling. Også advers effekt på respirationsmuskulaturen er beskrevet (165-168) [4].

Osteoporose

En alvorlig langtidsbivirkning ved steroidbehandling er osteoporose med deraf følgende risiko for frakture (169) [2a]. Ved længerevarende steroidbehandling bør man overveje forebyggende behandling. Af samme grund er der også for at imødekomme denne bivirkning tradition i Danmark for at påbegynde tilskud af kalk og D-vitamin hos patienter der sættes i højdosis GK behandling. Behandling med kalk og D-vitamin bør fortsætte selvom GK behandlingen er ophørt.

De anbefalede stoffer er D3-vitamin + calcium, jf. Lægemiddelkataloget. Hvis patienten udsættes for fysiologisk stress (infektion, operation), kan det være nødvendigt forbigående at øge dosis, specielt hos patienter, der er i lavdosisbehandling. Bisfosfonater anvendes ikke rutinemæssigt ved kortvarig højdosisbehandling (170) [2a].

Psykiske bivirkninger

Steroid-induceret opstemthed og søvnbesvær ses ofte, og i enkelte tilfælde kan det udvikle sig til egentlige psykoser. Evidensen på området er sparsom. Behandling med stemningsstabiliserende lægemidler eller antipsykotika har vist at kunne have effekt når seponering eller aftrapning enten ikke er mulig eller ikke ændrer den psykiske tilstand (171, 172) [3b].

Infektionstendens

Som hos andre immundepleterede patienter kan opportunistiske infektioner ses. Der er ikke evidens for at anbefale rutinemæssig screening eller at give profylaktisk behandling for at imødegå denne bivirkning; men dette kan overvejes hos udvalgte risikopatienter hvor langtidsbehandling med GK anses for nødvendig (173) [1b].

Patientværdier og – præferencer

Bedømt ud fra klinisk erfaring vurderes hver patient individuelt, og de fleste vil i udgangspunktet følge det angivne.

Rationale

Patienter bør behandles med højdosis steroid ved kliniske symptomer eller hvor billeddiagnostik har vist udbredt masseeffekt. Steroidbehandlingen bør gives i lavest mulig dosis i kortest mulig tid under henvisning til det anvendte præparats bivirkningsprofil, dosis og behandlingsvarighed samt individuelle patientforhold.

Bemærkninger og overvejelser

Ingen særlige bemærkninger.

Epilepsi

- 66. Hel eller delvis antiepileptisk effekt kan opnås ved neurokirurgisk behandling med reduktion af tumorbyrde (A)**
- 67. Der bør ikke gives profylaktisk antiepileptisk behandling (A)**
- 68. Der bør startes behandling med antiepileptika efter første anfall (A)**
- 69. Ved stigende anfaldfrekvens eller ændring af anfaldssemiologi skal tumorprogression mistænkes og der bør yderligere udredes (A)**
- 70. Valg af præparat bør baseres på præparatets forventede effekt og bivirkningsprofil hos den enkelte patient. Mulig interaktion med samtidig kemoterapi og anden behandling bør indgå i overvejelserne om præparatvalg (A)**
- 71. Den antiepileptiske behandling bør varetages af neurologisk speciallæge i samarbejde med neurokirurg og onkolog (D)**

Litteratur og evidensgennemgang

Omkring 4 % af alle tilfælde af epilepsi skyldes hjernetumorer mens epilepsi optræder hos 30 - 85 % af patienterne med gliomer. Incidensen og sværhedsgraden af epilepsien samt anfaldssemiologien afhænger både af gliomets lokalisation og af tumors histologiske karakteristika. Generelt er lavgradsgliomer mere epileptogene end højgradsgliomer. Incidensen ved lavgradsgliomer er 60-75 % og ved højgradsgliomer noget lavere(174, 175). Tumorer med IDH-mutation er fundet associeret med højere anfaldsincidens (175) [2a].

Epileptogene gliomer har direkte eller indirekte kortikal involvering og er lokaliseret supratentorielt (176-182) [2b]. Omkring 30-50 % af gliopatienterne debuterer med et epileptisk anfall og hyppigst ved lavgradsgliomerne (176, 181, 183-186) [2a]. Forklaringen på hvorfor lavgradsgliomer er mere epileptogene end højgradsgliomer antages at være, at lavgradsgliomerne vokser langsommere og derfor over længere tid udvikler epileptogene forandringer i synapser og receptorer i og omkring tumor, mens højgradsgliomer udvikler sig for hurtigt til at kunne nå at udvikle disse forandringer. Epilepsi ved højgradsgliomerne antages i stedet at være forårsaget af tryk, ødem, inflammation eller nekrose i det kortikale peritumorale væv, hvilket understøttes af at epilepsi ved lavgradsgliomerne ofte og i hvert fald i længere tid er det eneste symptom, mens

højgradsgliomerne i reglen er ledsaget af andre og mere dominerende neurologiske symptomer (178, 180, 181, 187-191) [2b].

Den gliomrelaterede epilepsi klassificeres som strukturel (lokalisationsrelateret) epilepsi, der klinisk manifesterer sig som fokale anfald med eller uden bevidsthedspåvirkning og med eller uden sekundær generalisering. Status epilepticus optræder relativt sjældent, men kan dog, som ved andre epilepsier betinget af stærkt irritative fokale cerebrale processer, ses både som debutsymptom og senere i forløbet.

Prognosen for anfaldfrihed postoperativt beror på massen af efterladt tumorvæv, tumors histologiske karakteristika, tumors lokalisation, patientalder på operationstidspunktet, varigheden af den gliomrelaterede epilepsi og anfaldstype (191, 192) [2b].

Der er manglende fyldestgørende viden om, hvorfor nogle patienter responderer på antiepileptisk behandling, mens andre har anfaldsgennembrud til trods for relevant behandling (176, 188, 193-195) [2b].

Hos mellem en tredjedel og en fjerdel af alle patienter med gliomrelateret epilepsi er epilepsien medicinsk behandlingsrefraktær. Epilepsien hos patienter med lavgradsgliomer præoperativt er fundet at være medicinsk behandlingsrefraktær hos 50 % og postoperativt hos 30-35 %, mens epilepsien ved højgradsgliomer fandtes at være medicinsk behandlingsrefraktær præoperativt hos 4 % og postoperativt hos 2-15 % (176) [4].

Ændringer i anfalsssemiologi eller forringet anfaldskontrol kan være udtryk for tumorprogression, hvorfor fremskyndet kontrolskanning vil være påkrævet(176, 196) [2b].

Behandling

Tidlig makroradikal fjernelse af tumor efterfulgt af onkologisk behandling bedrer prognosen for anfaldfrihed. Strukturel (lokalisationsrelateret) epilepsi på baggrund af cerebralt gliom er ofte medicinsk intraktabel. Behandling med antiepileptika er indiceret hos alle patienter med hjernetumorer, som har haft et epileptisk anfald og startes efter det 1. anfald, da risikoen for fornyede anfald er stor. Behandling med antiepileptika hos patienter, som ikke har haft anfald er derimod ikke anbefalet(185).

Efter makroradikal fjernelse af tumor og ved fortsat behandlingsresistent epilepsi overvejes mulighed for epilepsikirurgi (56, 197, 198) [2a].

Valg af antiepileptika afhænger af effekt og præparatets bivirkningsprofil, patientens komorbiditet og medicininteraktioner (199-201) [2a].

Enzyminducerende antiepileptika, der påvirker cytochrome p450 komplekset (Phenytoin, Carbamazepin, Oxcarbazepin, Fenobarbital og Primidon) bør undgås da virkningen af en række kemoterapeutika og glukokortikosteroide kan nedsættes og en eventuel knoglemarvpåvirkning kan potensieres (183, 202, 203) [2a].

Forsigtighed i præparatvalg skal udvises ved langvarig og højdosis behandling af patienter med nyreinsufficiens og leverinsufficiens.

Levetiracetam er et hyppigt anvendt 1. valgs antiepileptikum, også ved hjernetumorrelateret epilepsi men kan være mindre velegnet til patienter med psykiatriske symptomer eller disposition herfor, enten i form af kendt comorbiditet eller ud fra gliomets topografiske beliggenhed. Ved psykiske bivirkninger til Levetiracetam kan Briveracetam formentlig anvendes som alternativ men Briveracetams anvendelse til monoterapi af gliom relateret epilepsi er ikke undersøgt.

I en metaanalyse er der fundet indikation på, at behandling med valproat ved højgradsgliomer er forbundet med forlænget overlevelse (204) [2a]. Ved brug af valproat skal der udvises opmærksomhed, da præparatet potentelt kan have knoglemarvstoksisk effekt og medføre encephalopatiske bivirkninger.

Enkelte studier har vist effekt på anfaldfrekvensen og overall survival ved antiepileptisk behandling med Lacosamid, men evidensen på området er sparsom (205) [4].

Et norsk registerstudie med 1263 GBM patienter kunne ikke påvise forskel i overall survival ved sammenligning af patienter i behandling med Carbamazepin, Valproat, Lamotrigin, Levetiracetam, Phenytoin, Oxcarbazepin (206) [2b]

Status epilepticus (SE) behandles som SE ved andre epilepsiformer under hensyn til ovenstående anbefalinger om i muligt omfang at undgå enzyminducerende præparater.

Ved epilepsi forårsaget af lavgradsgliom og hvor konventionel antiepileptisk behandling ikke er tilstrækkelig er der evidens for, at anvendelse af Temozolomid kan medføre nær eller komplet anfaldfrihed (207, 208). Behandling med Temozolomid hos denne patientgruppe er dog ikke vist at forhindre tumorprogression hos patienter med dårlig histopatologisk prognose (209) [3b].

Perampanel, Briviracetam og Lacosamid er i mindre in-vitro studier vist at have anti-neoplastisk effekt men en eventuel lignende effekt in vivo er ikke belyst (210, 211) [4].

Seponering af antiepileptika

Seponering af antiepileptika kan overvejes ved lavgradsgliomer efter 3-5 års anfaldfrihed, men risikoen for anfaldsrecidiv er betydelig (190) [2b]. Der er ikke evidens for entydig anbefaling af anfaldfri behandlingsvarighed ved lavgradsgliom.

Seponering af antiepileptika hos patienter med epilepsi ved højgradsgliomer er sjældent relevant. Vedvarende behandling ved højgradsgliomer i terminalfasen er i reglen indiceret og antiepileptika som kan administreres i sonde, intravenøst eller rektalt kan derfor være at foretrække. Både Levetiracetam, Valproat og Lacosamid har disse egenskaber. Lacosamid og Levetiracetam er endvidere kasuistisk beskrevet at kunne administreres subkutan og kan derfor have plads i det palliative forløb tillige (212, 213) [4].

Kørekort

Ved epilepsi bør der løbende tages faglig stilling til evnen til at føre motorkøretøj; jvf. Styrelsen for Patientsikkerheds gældende retningslinje for kørekort.

Patientværdier og – præferencer

Bedømt ud fra klinisk erfaring vurderes hver patient individuelt, og de fleste vil i udgangspunktet følge det angivne.

Rationale

Der henvises til EANO retningslinjen, som er suppleret med praktiske betragtninger, der har tilpasset anbefalingerne til danske forhold.

Bemærkninger og overvejelser

Ingen særlige bemærkninger.

Neurorehabilitering

72. **Vurdering af rehabiliteringsbehov bør påbegyndes præoperativt hos patienter med gliom (C)**
73. **Alle patienter, som udskrives til hjemmet fra specialafdeling med fysiske eller kognitive deficits bør vurderes tværfagligt inden udskrivelse med henblik på behov for videre genoptræning (C)**
74. **Der bør løbende sikres behovsvurdering og justering af genoptræningsplaner ved ændringer i tilstanden (C)**
75. **Alle patienter med gliom bør tilknyttes specialambulatorium på lokal neurologisk afdeling med henblik på forankring af forløb og rehabiliteringsindsats (C)**
76. **Både patienter og pårørende bør inddrages i den videre plan for rehabiliteringsindsatsen (C)**
77. **Der bør tidligt i forløbet etableres et tværfagligt samarbejde med specialambulatorium, egen læge, hjerneskadekoordinator, den kommunale hjemmehelse, fysioterapi og ergoterapi for at sikre et sammenhængende hjerneskaderehabiliteringsforløb (B)**

Litteratur og evidensgennemgang

Rehabilitering af patienter med gliom

Patienter med kræft i hjernen og følger efter operation for dette har ofte funktionsevnenedsættelser, som omfatter såvel motorisk, sensorisk, sproglig og kognitiv funktionsevne som problemområder af psykisk, social og eksistentiel karakter.

Rehabiliteringsindsatsen bør derfor inkludere alle rehabiliteringsaspekter og specifikt rettes mod motorisk funktion (gang, arm- og håndfunktion), mentale funktioner (sprog, hukommelse, opmærksomhed, overordnede kognitive funktioner, følelsesfunktioner, adfærd og perception), kropsfunktioner (dysfagi, blære-tarm-funktioner, udholdenhed og cirkulation), sansefunktioner (syn, hørelse, lugt, smag, berørings- og stillingssans,

smarter samt vestibulære funktioner) og daglige aktiviteter og deltagelse (egenomsorg, daglig livsførelse, mobilitet, evne til at føre motorkøretøj, kommunikation, læring og anvendelse af viden, uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse, sociale relationer samt fritidsliv).

Formålet med rehabilitering af patienter med intrakranielt gliom er, at opnå og vedligeholde bedst mulig funktionsevne med henblik på at øge patientens livskvalitet, uafhængighed og selvbestemmelse. Det er vigtigt at påbegynde indsatsen så tidligt i forløbet som muligt. Der skal derfor foreligger en initial individuel og tværfaglig vurdering, som gentages i behandlingsforløbet efter behov ved ændring i funktionsniveau eller oplevelse af symptomer. Vurderingerne danner grundlag for, hvilke indsatser der bør iværksættes og efterfølgende fastlægges i en tværfaglig plan for den enkelte patient.

Tværfaglig teamindsats

Patienter med gliom profiterer af en specialiseret, tværfaglig neurorehabiliteringsindsats i samme grad som patienter med traumatisk hjerneskade eller apopleksi (214-218) [3b]. Den aktuelle evidens for rehabiliteringsindsatsen er lav til moderat. Rehabiliteringsindsatsen baseres derfor foreløbig på et samlet skøn over patientens præmorbide funktionsniveau, funktionsniveauet postoperativt, langtidsprognosen og familiens ressourcer, behov, præferencer og forståelse for sygdommen (217-220) [5]. Den specialiserede neurorehabilitering varetages af et tværfagligt team, der som regel involverer læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagog, neuropsykolog, socialrådgiver og psykolog (217, 218, 221, 222)[NA]. Indsatsen bør organiseres i et tæt koordineret interdisciplinært samarbejde med inkludering af relevante faggrupper på relevante tidspunkter(222). Rehabiliteringsbehovet hos patienter med gliom vil, i kraft af sygdommens maligne og kroniske natur, erfartsmæssigt ændre sig over tid.

Rehabiliteringsindsatsen bør starte tidligt i forløbet (223, 224) [3b]. Den initiale vurdering og planlægning af den specialiserede genoptræning bør foregå i umiddelbar forlængelse af den primære diagnostik og operation. Allerede præoperativt kan det forventede behov for rehabilitering vurderes hos en del patienter og en foreløbig plan for den postoperative indsats drøftes med patienten og de pårørende.

Patienter bør umiddelbart efter operationen have vurderet eller revurderet deres rehabiliteringsbehov, både under indlæggelse og efter udskrivelse.

Ved udskrivelsen udarbejdes der en genoptræningsplan, der indeholder beskrivelse af patientens habituelle og aktuelle funktionsevne, inklusive mentale og sproglige funktionsområder, til at danne grundlag for kommunens videre planlægning af rehabiliteringsindsatsen.

Under den videre ambulante behandling og opfølgning skal kontinuerlig revurdering foregå i takt med at sygdommen progredierer.

Det er en tværfaglig neurologisk specialopgave at varetage vurdering og justering af genoptræningsplaner.

Overordnet set bør alt lægefagligt personale, der er i kontakt med gliompatienter udvise opmærksomhed på ændringer i patientens helbredsmæssige tilstand og samlede situation, der måtte nødvendiggøre justering af rehabiliteringsindsatsen.

For at sikre det tværsektorielle samarbejde inddrages patientens egen læge, hjerneskadekoordinator i patientens hjemkommune, den kommunale fysioterapi og ergoterapi samt den kommunale hjemmehelse i udskrivningsforløbet. Rehabiliteringsindsatsen bør planlægges og prioriteres i samarbejde og forståelse med patienten og de pårørende(225).

Fysisk træning

Kun få studier har undersøgt den funktionelle genoptræning indenfor neuro-onkologien. Alle patienter med behov for fysisk genoptræning bør have udarbejdet genoptræningsplan (til kommunalt eller specialiseret tilbud, afhængig af sværhedsgraden af funktionsevnenedsættelsen). Desuden informeres patienter om vigtigheden af at opretholde bedst mulige funktionsniveau ved selvtræning og egenomsorg (226, 227) [5].

Kognitiv træning

Kognitiv dysfunktion har stor negativ betydning for patientens livskvalitet, og der er påvist positiv effekt af målrettet kognitiv rehabilitering over for kognitive gener og mental træthed (228-233) [1b].

Vurdering af kognitiv dysfunktion er derfor vigtig. Kognitiv dysfunktion kan skyldes selve tumoren, men også være relateret til symptomatisk epilepsi, smerter og behandlingen herfor, psykologiske krisereaktioner såvel som følger af den onkologiske behandling. Vurdering af det fortløbende kognitive rehabiliteringsbehov er hos alle gliompatienter aktuelt post-operativt men hos patienter hvor tumor involverer elokvente områder eller frontotemporalregioner og hvor der planlægges vågen kirurgi med mapping er præoperativt vurdering af stor vigtighed (234) [5]. I to mindre studier med hhv 38 og 58 patienter fandtes der effekt af målrettet kognitiv rehabilitering af gliompatienter (235, 236) [3b]. Et større review studie (237) [2a] fandt det vanskeligt at vurdere entydig og komparativ effekt af kognitiv rehabilitering mellem studier men konkluderede at patienter både med gliom men også andre typer af hjernetumorer havde gavn af kognitiv rehabilitering og at både patienter og pårørende oplevede stor gavn af et formelt kognitivt rehabiliteringstilbud.

Psykosocial støtte

Betydende depression forekommer hos ca. hver tredje gliompatient (10%-50%), især hos patienter med invaliderende fysiske handikap (237-241) [4]. Der er hyppigt tale om et symptomkompleks bestående af egentlige depressive symptomer, kognitive og affektive forstyrrelser som direkte følge af tumoren, hjernekirurgi og strålebehandling, bivirkninger af steroidbehandlingen og eventuelle antiepileptika samt krisereaktion udløst af erkendelsen af den meget alvorlige somatiske sygdom. Depression er hos patienter med gliom vist at forringe både livskvalitet og overlevelse (241, 242) [2a].

Der vil i rehabiliteringsfasen derfor ofte være behov for psykologisk bistand til patienten og de pårørende til støtte og rådgivning i relation til den dystre prognose, de varige fysiske og mentale funktionstab og ikke mindst personlighedsændringerne. Behandling med antidepressiva kan blive nødvendig men kan sjældent stå alene i den samlede behandling og behovet for medicinsk behandling af depression hos denne patientgruppe bør bero på tæt monitorering (243) [5].

Antidepressivas indflydelse på tumorbiologi og på effekten af Temozolomid og dermed potentelt på prognosen er aktuelt mangelfuldtykt belyst (242, 244, 245) [4].

Det er velkendt, at antidepressiva kan nedsætte krampetærsklen, hvilket kræver opmærksomhed ved opstart af behandling hos gliopatienter med epileptogene tumores.

Ofte er de sociale konsekvenser af sygdommen dramatiske og patienterne kan opleve stigmatisering (219, 246) [4]. Der bør derfor tidligt i forløbet etableres kontakt til en socialrådgiver med henblik på støtte og rådgivning i forbindelse med ændret tilknytning til arbejdsmarkedet, sygemelding, pensionsansøgning, ansøgning om udbetaling af privat sygeforsikring, spørgsmål vedrørende forsikring i forbindelse med kritisk sygdom, boligændringer og eventuelt boligskifte.

Patientværdier og – præferencer

Bedømt ud fra klinisk erfaring vurderes hver patient individuelt, og de fleste vil i udgangspunktet følge det angivne.

Rationale

Der henvises til EANO retningslinjen, som er suppleret med praktiske betragtninger, der har tilpasset anbefalingerne til danske forhold.

Bemærkninger og overvejelser

Ingen særlige bemærkninger.

Neuropalliation

- 78. Den pallierende indsats bør forløbe integreret med rehabiliteringsindsatsen (D)**
- 79. Patient og pårørende bør informeres om forventelige progredierende symptomer i terminalfasen, også ud fra tumors beliggenhed i hjernen (D)**
- 80. Somatiske følgesymptomer og psykosociale problemstillinger bør adresseres og håndteres (B)**
- 81. Der bør være et kontinuerligt højt informationsniveau til patient og pårørende og denne information bør rettidigt involvere samtale om end-of-life-overvejelser og ønsker (D)**

Litteratur og evidensgennemgang

Det anbefales, at der samtidig med tidligt indsættende neuro-rehabilitering informeres, støttes ogrådges i forhold til de begrænsninger, som de kognitive og fysiske forstyrrelser måtte medføre. Information om de lokale muligheder for palliative tiltag bør forelægges patienter med højgradsgliom og deres pårørende tidligt i forløbet (247) [5].

Palliation har til formål at lindre patientens symptomer og de problemer af både fysisk, psykisk, social og eksistentiel art, der for både patienten og de pårørende er forbundet med livstruende sygdom, med henblik på

at fremme livskvaliteten igennem hele patientforløbet. Den palliative indsats ved malignt gliom bør således ved behov indsættes tidligt i sygdomsforløbet og integreres med rehabiliteringsindsatsen (248-250) [5]. Indsatsen koncentreres i den tidlige fase om de fysiske tab og et oftest upretteligt tab af erhvervsevne og social status i forhold til familie, venner og tidligere arbejdskollegaer.

Patienter med cerebrale gliomer adskiller sig fra andre patientgrupper, også i den palliative fase, ved at disse patienter uddover at have en terminal cancersygd også udviser progredierende neurologiske udfaldssymptomer.

Tumorens anatomiske lokalisations spiller en afgørende rolle for typen og omfanget af neurologisk skade. Den af patient og pårørende oplevede livskvalitet synes at være afhængig af tumorlokalisationen. Tumorlokalisations i højre hemisfære synes at medføre ringere livskvalitet end tumorlokalisation i venstre hemisfære (251) [4]. Forhøjet intrakranielt tryk samt følger efter strålebehandling mod hjernen kan medføre encephalopatiske symptomer og omfanget af kognitive sequelae fra behandlingen alene kan være betydelige.

Patienter med afasi vil uddover de typiske palliative indsatsområder, der også findes hos patienter med andre cancer typer, have særlige behov og medføre særlige udfordringer for plejepersonale/pårørende, også i den terminale fase. De kommunikative problemer udfordrer optimal varetagelse af psykosociale/åndelige problemstillinger.

Den specifikke palliative indsats i forbindelse med kræft i hjernen målrettes de varierende grader af kognitive forstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, den patologiske træthed og det kontinuum, der forekommer, fra normale reaktioner som tristhed over tilpasnings- og belastningsreaktioner til depression, terminalt delir og varierende grader af panikangst. Optimeret symptombehandling og højt informationsniveau samt imødekommenlse af patient og pårørende ønske om, hvor og hvordan den afsluttende palliative fase skal foregå, er af stor betydning for den oplevede kvalitet af patientforløbet (207) [4].

Hospice

Over de seneste år er der kommet øget bevågenhed på gliom patienters behov for hospiceophold. Dette har ikke altid været tilfældet, da mange gliompatienter ikke opfylder de klassiske krav for hospicebehandling: Smærter behøver ikke være udtalte og angst samt åndelige kriser kan være vanskelige at håndtere hos patienter med fremskredne neurologiske deficit som afasi og/eller kognitive forstyrrelser. Både hospiceophold og udkørende palliative teams fra hospice og palliative hospitalsafdelinger kan inddrages hos terminale gliompatienter. Optimeret symptombehandling og højt informationsniveau samt imødekommenlse af patient og pårørendes ønske om, hvor og hvordan den afsluttende palliative fase skal foregå er af stor betydning for den oplevede kvalitet af patientforløbet. Her bør mulighederne for hospice indgå i informationen.

Smærter

Hovedpine er et hyppigt symptom i den palliative fase af et gliomforløb. Hovedpinen er ofte betinget af ødem og deraf forhøjet intrakranielt tryk. Der er evidens for at cerebralt ødem kan forsøges behandlet i den palliative fase med steroid (154, 252) [3] og såfremt hovedpine ikke er forårsaget af øget ICP anbefales opioider. Ved manglende effekt kan bevacizumab forsøges (154) [4].

Epilepsi

Anbefalinger for antiepileptisk behandling ved maligne gliomer er særskilt omtalt i Epilepsi-kapitel.

Op mod 90 % af patienter med cerebrale gliomer får epileptiske anfald på et tidspunkt i deres sygdomsforløb. Trods travær af epilepsi i de tidlige faser oplever flere patienter anfald som sygdommen skrider frem. Epilepsi kan i sig selv være meget angstprovokerende, især når anfaldkontrolen ofte bliver mere vanskelig i terminalfasen. Den palliative indsats over for den behandlingsrefraktære epilepsi udgøres først og fremmest af information, rådgivning og undervisning af patienter og de pårørende ledsaget af hyppig kontrol og optimering af den medikamentelle behandling på en neurologisk afdeling.

Er der opnået rimelig anfaldkontrol på et eller flere AED tidligere i forløbet bør det tilstræbes at fortsætte med dette præparat livslangt. Vanskeligheder med oral administration af lægemidler i terminalfasen gør at præparerter der udeover peroral dosering også kan administreres iv, sc eller rektalt ofte må foretrækkes (valproat, levetiracetam, lacosamid).

Supplerende behandling i terminalfasen, både fast anfaldsforbyggende og akut anfaldbrydende kan ske i form af benzodiazepiner, hvoraf der er bedst evidens for anvendelsen af diazepam (sc/iv/im, rect) og Midazolam (sc/iv/nasalt/gingivalt) (207, 253, 254)[4].

Venøs tromboemboli (VTE)

Også hos patienter med malignt gliom er risikoen for VTE forøget som det fysiske funktionsniveau aftager og patienten bliver bundet til kørestol/seng i længere perioder. Ligeledes har selve cancersygdommen indflydelse på funktionen af koagulationssystemet med mulig øget tendens til tromboemboliske følger. Studier har indikeret op til 40% risiko for venøs tromboemboli hos gliom patienter (255, 256) [2b] og risikoen for VTE er hos gliompatienter generelt højere end ved mange andre癌ctyper (257) [4].

I overvejelserne om opstart af profylaktisk behandling med Heparin-præparerter skal risikoen for intrakraniel blødning i tumor tages i betragtning. Der er høj evidens for ICH hos gliompatienter i profylaktisk behandling mod VTE og profylaktisk behandling er ikke anbefalet (256) [4].

Profylaktisk behandling med Heparin hos oppegaende patienter kan på det foreliggende evidensniveau ikke anbefales. Manifest VTE behandles i henhold til gældende nationale retningslinjer herfor, under hensyntagen til nævnte øgede blødningsrisiko i tumor (257, 258) [5].

Træthed/Fatigue

Hurtig trætbarhed og en træthed, som ikke kan afhjælpes med søvn/hvile, også kaldet fatigue er et dominerende symptom hos en stor del af patienterne med hjernekræft og et af de mest betydende symptomer i forhold til patienternes oplevelse af forringet livskvalitet (219, 259-262) [4]. Der er ikke evidens for, at denne fatigue kan afhjælpes medikamentelt (263, 264) [NA].

Depression

Forekomsten af depression er velkendt i terminalfasen hos cancerpatienter uanset tumortype og -lokalisations. Hos gliompatienter er der øget forekomst af affektive symptomer, der er delvist afhængig af tumors lokalisation i hjernen. Dette gælder især for tumorer beliggende i frontallapperne og tumorer involverende det limbiske system.

Ved klinisk depressive patienter med malignt gliom i terminalfasen er der evidens grad B for effekt af non-farmakologiske interventioner (265) [2a]. Der er dog grund til at antage, at antidepressiva i SSRI eller TCA grupper kan have effekt som farmakologisk behandling (266) [4].

Delir

Risikoen for delir i terminalfasen er øget hos patienter med intrakranielle gliomer sammenholdt med andre cancertyper. Dette skyldes tumors direkte virkning på højere cerebrale funktioner men også følger efter strålebehandling og bivirkninger til steroidbehandling.

Såfremt en delirøs tilstand ikke kan brydes ved non-farmakologisk intervention (ved bl.a. døgnrytmeregulering og medicinsanering i det omfang dette er muligt) hvilket er anbefalet (267) [3b] kan farmakologisk behandling med Haloperidol eller Olanzapin forsøges (268) [1b]. Disse antipsykotika må anses for ligeværdige hvad angår effekt (269) [2b].

Anvendelse af Benzodiazepiner har tillige en plads i delirbehandlingen, idet der samtidig opnås såvel en anxiolytisk som antiepileptisk effekt herved.

Kognitive forstyrrelser

Forstyrrelser i kognition spiller sammen med hurtig udtrætning og depression en afgørende rolle for oplevelsen af dårlig livskvalitet i terminalfasen. Der er ikke nogen guldstandard for, hvordan symptomerne afhjælpes. Dog er der ikke fundet evidens for at medikamentel behandling har effekt og dette kan derfor ikke anbefales (269). Der er imidlertid næppe tvivl om, at tidlig tværfaglig indsats og samtidig støtte og rådgivning til patient og pårørende er afgørende.

Patientværdier og – præferencer

Bedømt ud fra klinisk erfaring vurderes hver patient individuelt, og de fleste vil i udgangspunktet følge det angivne.

Rationale

Der henvises til EANO retningslinjen, som er suppleret med praktiske betragtninger, der har tilpasset anbefalingerne til danske forhold.

Bemærkninger og overvejelser

Ingen særlige bemærkninger.

Kørekort

For gruppe 2-kategorierne gælder:

82. Ved højgradsgliomer gives varigt kørselsforbud (D)
83. Ved lavgradsgliomer med samtidig nydiagnosticeret epilepsi gives kørselsforbud indtil mindst 10 års anfaldfrihed uden medicinsk behandling med antiepileptika er opnået (D)

For gruppe 1-kategorierne gælder:

84. Ved gliomsygdom gives 12 måneders kørselsforbud ved tumorrelateret nydiagnosiceret epilepsi, hvoraf minimum de seneste seks måneder skal være med anfallsforebyggende behandling. Før kørselsforbuddet kan ophæves, skal der foreligge fornyet vurdering af patientens føreregnehed for at vurdere, om der er tilkommet betydende fysiske og kognitive symptomer (D)
85. Der gives seks måneders kørselsforbud ved recidiv af anfall. Før kørselsforbuddet kan ophæves, skal der foreligge fornyet vurdering af patientens føreregnehed for at vurdere, om der er tilkommet betydende fysiske og kognitive symptomer (D)
86. Påbud om kørselsforbud skal journalføres (D)
87. Initial og kontinuerlig vurdering af føreregnehed i forhold til motoriske og kognitive symptomer og eventuel epileptisk anfalddsygdom (D)
88. Ved behov og mindste tvil anbefales supplerende neuropsykologisk vurdering og evt. vejledende helbredsmæssig køretest (D)
89. Hvis det vurderes, at patienten ikke er indstillet på at overholde det lægelige kørselsforbud, informeres patienten om, og der søges indhentet samtykke forud for, at der foretages anmeldelse til Styrelsen for patientsikkerhed (D)

Litteratur og evidensgennemgang

Anbefalingerne baseres på gældende dansk lovgivning (1-3, 5, 270) [NA]. Anbefalingerne er således fortolkning af lovtekst i et klinisk perspektiv, og evidensgraderes derfor ud fra ekspertvurdering som grad D. Flere studier baseret på spørgeskemaundersøgelser blandt læger med behandlingsansvar eller berøring med hjernetumorpatienter viser udbredt mangel på ensrettethed i anbefalingerne af føreregnehed hos denne patientgruppe (271-274) [NA].

Patienter med intrakranielle gliomer har ofte både kognitive og fysiske symptomer. En stor andel af patienterne lider også af epilepsi på baggrund af tumor, og dette kan i sig selv yderligere forværre de kognitive symptomer udover at epilepsien er en åbenlys selvstændig risikofaktor ved færdsel i trafikken.

Disse, ofte både blivende og i de fleste tilfælde progredierende symptomer gør, at voksne gliompatienters egnethed til at føre motorkøretøj skal vurderes løbende. Dansk sundhedslov vurderes dækkende på området. Retningslinjerne for føreregnehed ved epilepsi er klare. Ved motoriske og/eller kognitive symptomer kan vurderingen i det enkelte tilfælde være mere vanskelig: Regelret neuropsykologisk test kan blive nødvendig i vurderingen ligesom en objektiv neurologisk undersøgelse bør indgå ved løbende ambulante kontroller når spørgsmålet om føreregnehed skal besvares.

Vurdering af føreregnethed

I "Vejledning om helbredskrav til kørekort" Styrelsen for Patientsikkerhed, august 2017 anføres:

"Der bør som udgangspunkt udstedes et lægeligt kørselsforbud ved kognitiv eller fysisk påvirkning af funktionsevnen (eksempelvis svimmelhed, balance- eller bevægeapparatsproblemer), hvis det bliver vurderet, at tilstanden medfører en risiko for trafiksikkerheden.

Ved multipel sklerose, Parkinsons sygdom, dystrofia myotonika og andre progressive neurologiske sygdomme, skal spørgsmålet om føreregnetheden vurderes ud fra det samlede symptombilledes fysiske, sansemæssige og kognitive dysfunktioner. Hvis patienten har nedsat funktionsevne, kan der være behov for at starte en kørekortsag som nærmere beskrevet i kapitel 2.4. Sagen vil herefter blive forelagt en bilinspektør med henblik på, at der eventuelt vil blive stillet krav om specialindretning af køretøjet. Der kan også være behov for en vejledende helbredsmæssig køretest (VHK), hvis der er symptomer på kognitiv påvirkning, som i så fald bør beskrives bedst muligt i den kørekortattest, der skal udfyldes ved start af kørekortsagen" (275) [NA].

I Bekendtgørelse om kørekort BEK nr 815 af 21/06/2017 anføres:

"For ansøgere eller førere, der lider af neurologiske sygdomme, som medfører kognitive eller fysiske symptomer, kan kørekort kun udstedes, fornøjes eller bevares efter en lægelig udtalelse. Hvor andet ikke er angivet, skal udtalelsen afgives af en speciallæge i neurologi. Er der risiko for, at sygdommen forværres, udstedes, fornøjes eller bevares kørekortet med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning. I denne forbindelse skal lægen i sin vurdering tage højde for risikoen for udvikling af de funktionsmæssige neurologiske udfald, der skyldes sygdomme, traumer eller operationer i centralnervesystemet eller i det perifere nervesystem, hvilket kan medføre kognitive udfald eller funktionsudfalde, herunder påvirkning af motoriske og sensoriske funktioner, balance og koordination" (276)[NA].

I tidligere udgave af Sundhedsstyrelsens vejledning, VEJ 9584 af 10/10/2013 anføres: "Ved den objektive neurologiske undersøgelse bør der samtidig udføres kognitive tests, for at sikre, at betydende udtrætnings- og opmærksomhedsproblemer, manglende overblik og dømmekraft samt svigtende evne til besvarelse af komplekse opgaver identificeres. Ved behov kan neuropsykologisk vurdering og evt. vejledende helbredsmæssig køretest anbefales" (277)[NA].

Generelt gælder det, at patienter med en fremadskridende sygdomstilstand kun kan få udstedt kørekort eller få køretilladelse med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning med henblik på løbende at vurdere, om ansøgeren/føreren fortsat uden risiko kan føre motordrevet køretøj.

For gruppe 1-kategorierne skal der nedlæggelse af 12 måneders kørselsforbud ved samtidig nydiagnosticeret epilepsi. Mindst de seneste seks måneder skal være med anfaldforebyggende behandling før end kørsel kan genoptages. Motorkørsel kan genoptages herefter under forudsætning af, at der ikke har været epileptiske anfall i perioden, og at der ikke er tilkommet betydende motoriske og kognitive symptomer. Hvis der ikke er givet antiepileptisk behandling kan kørsel først genoptages efter 2 år uden yderligere anfall.

Ved recidiv af anfall nedlægges seks måneders kørselsforbud. Motorkørsel kan genoptages herefter under forudsætning af, at der ikke har været epileptiske anfall i perioden, og at der ikke er tilkommet betydende motoriske og kognitive symptomer.

Føreregnetheden hos patienter uden epilepsi vurderes individuelt ud fra graden af kognitive og fysiske symptomer der måtte forhindre sikker føring af motorkøretøj.

For gruppe 2-kategorierne anbefales nedlæggelse af varigt kørselsforbud ved højgradsgliomer. Ved lavgradsgliomer med samtidig nydiagnosticeret epilepsi skal der gives kørselsforbud indtil mindst 10 års anfaldfrihed uden medicinsk behandling med antiepileptika er opnået.

Andre transportmidler

Patienter der i fritids- eller erhvervsøjemed har førerbevis til sejlads eller luftfart er ikke lovgivningsmæssigt inkluderet i VEJ nr 9693 af 31/07/2017.

For certifikat til sejlads gøres individuel vurdering. For certifikat til erhvervsmæssig sejlads anbefales forbud som for kørekort til bil, gruppe 2.

For flycertifikat gives totalt forbud ved enhver neurologisk sygdom medførende udfald på bevidsthed, kognition eller motorisk formåen.

Der henvises desuden til individuelle anbefalinger og vejledninger fra hhv Søfartsstyrelsen og Luftfartsstyrelsen samt at disse instanser og embedslægen altid inddrages i vurderingen ved tvivlsspørgsmål.

Lægens handlepligt

Det er den læge, der i sin faglige virksomhed vurderer, at patienten ikke kan føre motorkøretøj på betryggende vis, der har handlepligten. Hvis lægen er overbevist om, at patienten er indstillet på at efterkomme det lægelige kørselsforbud, skal lægen ikke foretage sig yderligere. Kørselsforbuddet skal journalføres. Det lægelige kørselsforbud kan være for en begrænset periode eller permanent. Såfremt en læge vurderer, at en patient ikke agter af overholde et givent kørselsforbud har lægen pligt, jvfr Autorisationslovens §44, at indberette dette til Styrelsen for Patientsikkerhed. Der skal altid søges indhentet informeret samtykke hertil, jvfr Sundhedslovens § 43, stk. 2 (278) [NA].

Autorisationslovens § 44 giver ikke lægen mulighed for, uden patientens samtykke, at videregive helbredsoplysninger til andre end Styrelsen for Patientsikkerhed (embedslægeinstitutionen) (279)[NA].
Der henvises desuden til www.sundhed.dk (280) [NA].

Kørekortkategorier og grupper

Gruppe 1: A Motorcykel (knallert, lille/mellem/stor motorcykel)

B Personbil

B/E Stort påhængskøretøj

TM Traktor og motorredskab

Gruppe 2: C Lastbil (lille/stor)

D Bus (lille/stor)

CE/DE Stort påhængskøretøj til lastbil og bus

Udvidelser: Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring: erhverv B (Taxa) og erhverv D(Bus) og godkendelse som kørelærer.

Patientværdier og – præferencer

Bedømt ud fra klinisk erfaring vurderes hver patient individuelt, og de fleste vil i udgangspunktet følge det angivne.

Rationale

Der henvises til EANO retningslinjen, som er suppleret med praktiske betragtninger, der har tilpasset anbefalingerne til danske forhold.

Bemærkninger og overvejelser

Ingen særlige bemærkninger.

Opfølgningsforløb

90. Alle patienter med gliom bør tilbydes livslang neuro-onkologisk kontrol (A)
91. Hyppigheden af den efterfølgende opfølgning bør afhænge af gliomgrad, symptomatologi, behandling, comorbiditet, funktionsniveau og behov (D)
92. Opfølgningsforløbet bør varetages af et multidisciplinært neuroonkologisk team (neurolog, neurokirurg, neuroradiolog og onkolog) (C)
93. Der bør ikke udføres rutinemæssig MR-skanning ved påvirket funktionsniveau (PS>2), og hvor neurokirurgiske og onkologiske behandlingstilbud er opbrugte (D)
94. Der bør tilbydes åbent forløb på lokal neurologisk afdeling for alle patienter med højgradsgliomer (D)
95. Forløbskoordinationen bør fastlægges i regionale samarbejdsaftaler (D)

Litteratur og evidensgennemgang

Der foreligger meget sparsom videnskabelig litteratur om opfølgning/kontrol af patienter, der er behandlet for gliom (66, 281-283) [2a].

Opfølgning bør ved gliomer især fokusere på:

- at kontrollere, om der er opstået komplikationer i forbindelse med behandlingen
- at opspore tidlige tegn på progression
- at kontrollere, om den givne behandling har haft den tilsigtede virkning
- at kontrollere, og evt. justere den understøttende behandling (steroid, antiepileptika, analgetika, antiemetika)
- at vurdere mulighederne for yderligere behandling

- at afdække og justere behov for indsatser i forhold til rehabilitering og palliation indenfor såvel kræft- som hjerneskade-rehabilitering
- at sikre/følge op på information af patient og pårørende
- at understøtte patient og familie psykosocialt
- at hjælpe med at planlægge den terminale fase

Patientforløb

Opfølgningsforløbet varetages af et multidisciplinært team (MDT), der er karakteriseret ved et tæt formaliseret samarbejde mellem de neurologiske, neurokirurgiske og neuroradiologiske afdelinger samt de onkologiske funktioner. Ved behov suppleres MDT teamet af neuropatologisk og/eller klinisk nuklearmedicinsk funktion. De overordnede indsatser i opfølgningsprogrammet for hjernekræft omfatter løbende multidisciplinær vurdering for afklaring af behandlingstiltag individuelt tilpasset patientens samlede kliniske, fysiske og psykosociale situation inkl. evt. komorbiditet.

Da patienter med kræft i hjernen er ramt af en betydelig og i forløbet tiltagende kompleks symptombyrde relateret til både sygdommen og behandlingen er der behov for vedvarende opfølgningsindsats fra diagnosen er stillet og herefter livslangt.

Patienterne vil således kunne have opfølgningsforløb på mere end én specialafdeling samtidig og bør sikres éntydig forløbskoordination via samarbejdsaftaler mellem de involverede afdelinger:

1. Neurokirurgiske og onkologiske afdelinger, der kan tage den nødvendige behandlingsmæssige konsekvens af en given observation.
2. Neurologiske afdelinger, hvor patienterne kan rehabiliteres, pallieres og modtage understøttende behandling i bred forstand, enten ambulant eller under indlæggelse.

Tidsforløb

I det følgende beskrives tidspunkter, hvor en standardpatient skal kontrolleres klinisk og billeddiagnostisk når det aktive kirurgiske og onkologiske behandlingsforløb er afsluttet. Opfølgningsforløbet bør imidlertid altid individuelt tilpasses den enkelte patient.

Patienter med WHO grad I og grad II gliomer

- Kontrol-MR-skanning samt klinisk kontrol tre måneder efter biopsi/operation eller tre måneder efter erkendt tumor uden primært operativt tilbud.
- Kontrol-MR-skanning og klinisk kontrol 6-12 måneder herefter. Hyppigere ved prognostisk ugunstige molekulærbiologiske karakteristika eller ændring af symptomer.
- Efterfølgende kontrol afhænger af resultatet af ovennævnte MR-skanning; hvis der ikke er nogen vækst eller klinisk progression, foretages der nye skanninger med 6-12 mdr. mellemrum.
- Ved progression tages der stilling til fornyet udredning inkluderende neurokirurgisk og onkologisk vurdering.

Patienter med WHO grad III og grad IV gliomer

- Klinisk kontrol og MR-skanning 4 uger (21-35 dage) efter afsluttet strålebehandling eller kemoterapi (baseline) Når den onkologiske behandling er slut, har onkologen en samtale med patienten og de pårørende om forløbet af behandlingen, den aktuelle status og planen for kontrol i efterforløbet.
- MR-skanning og klinisk kontrol i onkologisk/neurologisk regi med 3 måneders mellemrum. Herefter foretages der MR-skanning og klinisk lægekontrol hver 3.-6. måned hos en onkolog, neurokirurg og/eller neurolog i henhold til interne samarbejdsaftaler for forløbskoordination inkl. MDT-konferencer i de enkelte regioner.
- Ved tvetydige MR-fund, mistanke om pseudoprogression eller diskrepans mellem MR-fund og klinisk status kan MR-skanning gentages efter min. 4 uger (f.eks. efter 4-8 uger) for at be- eller afbekræfte eventuel progression. Dette gælder især for kontrastopladelte tumorer ≤12 uger efter stråleterapi, hvor risikoen for pseudoprogression er størst.
- Alle patienter med højgradsgliomer bør have et åbent forløb på neurologisk afdeling og kan frit henvises på mistanke om sygdomsprogression.
- Kontrol MR-skanning udføres kun, hvis der er behandlingsmæssige konsekvenser.

Patienter opereret for progression

- Tidlig postoperativ MR-skanning (< 48 timer), excl. ved biopsi, eller hvor der er tale om lavgradsgliom.
- Tidlig klinisk kontrol: Samtale om patologisvar. Det videre behandlingstilbud og prognosen diskuteres i relation til patientens almene tilstand, og hvis relevant medgives tid til samtale om videre behandling på onkologisk afdeling.
- Yderligere kontrol afhænger af valg af behandling.
- For alle patienter, både lavgrads- og højgradsgliomer bør tilbydes *livsværtig* klinisk neurologisk opfølgning og støtte. Patienterne bør tilbydes tværfaglig behovsvurdering i hele forløbet afhængig af individuelle behov betinget af symptom- og epilepsibyrde samt psykosocial belastning i øvrigt.

For både 1. gangs-opererede patienter og patienter opereret/behandlet for progression planlægges opfølgende ambulante forløb i henhold til interne samarbejdsaftaler for forløbskoordination inkl. MDT-konferencer i de enkelte regioner.

Patienter, der ikke modtager kirurgisk og/eller onkologisk behandling

Afhængig af patientens præmorbide funktionsniveau, patientens egne ønsker om behandlinsniveau samt en vurdering af tumors operabilitet forekommer der patientforløb der ikke involverer kirurgisk og/eller onkologisk behandling.

Det er i disse forløb af stor vigtighed, at lokal neurologisk afdeling inddrages fra diagnosetidspunktet for at individuelt tilpasset opfølgning kan planlægges. Typisk vil dette primært dreje sig om kontrol af behandling med antiepileptika og steroid, koordinering af palliative tiltage og rehabiliteringindsats og sikring af optimalt informationsniveau for både patient og pårørende.

Patientværdier og – præferencer

Bedømt ud fra klinisk erfaring vurderes hver patient individuelt, og de fleste vil i udgangspunktet følge det angivne.

Rationale

Der henvises til EANO-retningslinjen, som er suppleret med praktiske betragtninger, der har tilpasset anbefalingerne til danske forhold.

Bemærkninger og overvejelser

Ingen særlige bemærkninger.

4. Referencer

1. Weller M, van den Bent M, Tonn JC, Stupp R, Preusser M, Cohen-Jonathan-Moyal E, et al. European Association for Neuro-Oncology (EANO) guideline on the diagnosis and treatment of adult astrocytic and oligodendroglial gliomas. *The Lancet Oncology*. 2017;18(6):e315-e29.
2. Rasmussen BK, Hansen S, Laursen RJ, Kosteljanetz M, Schultz H, Norgard BM, et al. Epidemiology of glioma: clinical characteristics, symptoms, and predictors of glioma patients grade I-IV in the the Danish Neuro-Oncology Registry. *Journal of neuro-oncology*. 2017;135(3):571-9.
3. Laursen EL, Rasmussen BK. A brain cancer pathway in clinical practice. *Danish medical journal*. 2012;59(5):A4437.
4. Weller M, van den Bent M, Preusser M, Le Rhun E, Tonn JC, Minniti G, et al. EANO guidelines on the diagnosis and treatment of diffuse gliomas of adulthood. *Nat Rev Clin Oncol*. 2021;18(3):170-86.
5. Ruda R. EANO guidelines for the diagnosis and treatment of ependymal tumors. *Neuro Oncol*. 2017;20(4):445-56.
6. Pope WB, Brandal G. Conventional and advanced magnetic resonance imaging in patients with high-grade glioma. *The quarterly journal of nuclear medicine and molecular imaging : official publication of the Italian Association of Nuclear Medicine (AIMN) [and] the International Association of Radiopharmacology (IAR), [and] Section of the Society of*. 2018;62(3):239-53.
7. Hirschler L, Sollmann N, Schmitz-Abecassis B, Pinto J, Arzanforoosh F, Barkhof F, et al. Advanced MR Techniques for Preoperative Glioma Characterization: Part 1. *J Magn Reson Imaging*. 2023;57(6):1655-75.
8. Hangel G, Schmitz-Abecassis B, Sollmann N, Pinto J, Arzanforoosh F, Barkhof F, et al. Advanced MR Techniques for Preoperative Glioma Characterization: Part 2. *J Magn Reson Imaging*. 2023;57(6):1676-95.
9. Law I, Albert NL, Arbizu J, Boellaard R, Drzezga A, Galldiks N, et al. Joint EANM/EANO/RANO practice guidelines/SNMMI procedure standards for imaging of gliomas using PET with radiolabelled amino acids and [(18)F]FDG: version 1.0. *European journal of nuclear medicine and molecular imaging*. 2018.
10. Rao B, Ikuta I, Mahajan A, Karam AA, Zohrabian VM. Brain Tumor Reporting and Data System: A Pictorial Review. *Neurographics*. 2021;11(3):175-85.
11. Zhang JY, Weinberg BD, Hu R, Saindane A, Mullins M, Allen J, et al. Quantitative Improvement in Brain Tumor MRI Through Structured Reporting (BT-RADS). *Acad Radiol*. 2020;27(6):780-4.
12. Wen PY, van den Bent M, Youssef G, Cloughesy TF, Ellingson BM, Weller M, et al. RANO 2.0: Update to the Response Assessment in Neuro-Oncology Criteria for High- and Low-Grade Gliomas in Adults. *J Clin Oncol*. 2023;41(33):5187-99.
13. Patel P, Baradaran H, Delgado D, Askin G, Christos P, John Tsioris A, et al. MR perfusion-weighted imaging in the evaluation of high-grade gliomas after treatment: a systematic review and meta-analysis. *Neuro-oncology*. 2017;19(1):118-27.
14. Albert NL, Weller M, Suchorska B, Galldiks N, Soffietti R, Kim MM, et al. Response Assessment in Neuro-Oncology working group and European Association for Neuro-Oncology recommendations for the clinical use of PET imaging in gliomas. *Neuro-oncology*. 2016;18(9):1199-208.
15. Friedman WA, Sceats DJ, Jr., Nestok BR, Ballinger WE, Jr. The incidence of unexpected pathological findings in an image-guided biopsy series: a review of 100 consecutive cases. *Neurosurgery*. 1989;25(2):180-4.
16. Julia-Sape M, Acosta D, Majos C, Moreno-Torres A, Wesseling P, Acebes JJ, et al. Comparison between neuroimaging classifications and histopathological diagnoses using an international multicenter brain tumor magnetic resonance imaging database. *Journal of neurosurgery*. 2006;105(1):6-14.
17. Quick-Weller J, Lescher S, Bruder M, Dinc N, Behmanesh B, Seifert V, et al. Stereotactic biopsy of brainstem lesions: 21 years experiences of a single center. *J Neurooncol*. 2016;129(2):243-50.

18. Tobin WO, Meyer FB, Keegan BM. Diagnostic Yield and Safety of Cerebellar and Brainstem Parenchymal Biopsy. *World Neurosurgery*. 2015;84(6):1973-6.
19. Cheng G, Yu X, Zhao H, Cao W, Li H, Li Q, et al. Complications of stereotactic biopsy of lesions in the sellar region, pineal gland, and brainstem: A retrospective, single-center study. *Medicine (Baltimore)*. 2020;99(8):e18572.
20. Riche M, Marijon P, Amelot A, Bielle F, Mokhtari K, Chambrun MP, et al. Severity, timeline, and management of complications after stereotactic brain biopsy. *J Neurosurg*. 2022;136(3):867-76.
21. Dallabona M, Sarubbo S, Merler S, Corsini F, Pulcrano G, Rozzanigo U, et al. Impact of mass effect, tumor location, age, and surgery on the cognitive outcome of patients with high-grade gliomas: a longitudinal study. *Neuro-Oncology Practice*. 2017;4(4):229-40.
22. Duffau H, Capelle L, Lopes M, Bitar A, Sicchez JP, van Effenterre R. Medically intractable epilepsy from insular low-grade gliomas: improvement after an extended lesionectomy. *Acta Neurochirurgica*. 2002;144(6):563-72; discussion 72-3.
23. Nielsen SH, Rasmussen R, Ziebell M, Hansen AE, Skjoth-Rasmussen J, von Oettingen GB, et al. [MR-guided laser interstitial thermal therapy in the treatment of brain tumours and epilepsy]. *Ugeskr Laeger*. 2021;183(25).
24. Ening G, Huynh MT, Schmieder K, Brenke C. Repeat-surgery at Glioblastoma recurrence, when and why to operate? *Clinical neurology and neurosurgery*. 2015;136:89-94.
25. Perrini P, Gambacciani C, Weiss A, Pasqualetti F, Delishaj D, Paiar F, et al. Survival outcomes following repeat surgery for recurrent glioblastoma: a single-center retrospective analysis. *Journal of neuro-oncology*. 2017;131(3):585-91.
26. McGirt MJ, Chaichana KL, Gathinji M, Attenello FJ, Than K, Olivi A, et al. Independent association of extent of resection with survival in patients with malignant brain astrocytoma. *Journal of neurosurgery*. 2009;110(1):156-62.
27. Karschnia P, Dono A, Young JS, Juenger ST, Teske N, Häni L, et al. Prognostic evaluation of re-resection for recurrent glioblastoma using the novel RANO classification for extent of resection: A report of the RANO resect group. *Neuro Oncol*. 2023;25(9):1672-85.
28. De Witt Hamer PC, Robles SG, Zwinderman AH, Duffau H, Berger MS. Impact of intraoperative stimulation brain mapping on glioma surgery outcome: a meta-analysis. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology*. 2012;30(20):2559-65.
29. Motomura K, Natsume A, Iijima K, Kuramitsu S, Fujii M, Yamamoto T, et al. Surgical benefits of combined awake craniotomy and intraoperative magnetic resonance imaging for gliomas associated with eloquent areas. *Journal of neurosurgery*. 2017;127(4):790-7.
30. Eseonu CI, Rincon-Torroella J, ReFaey K, Lee YM, Nangiana J, Vivas-Buitrago T, et al. Awake Craniotomy vs Craniotomy Under General Anesthesia for Perirolandic Gliomas: Evaluating Perioperative Complications and Extent of Resection. *Neurosurgery*. 2017;81(3):481-9.
31. Keles GE, Lamborn KR, Berger MS. Low-grade hemispheric gliomas in adults: a critical review of extent of resection as a factor influencing outcome. *Journal of neurosurgery*. 2001;95(5):735-45.
32. Lacroix M, Abi-Said D, Journey DR, Gokaslan ZL, Shi W, DeMonte F, et al. A multivariate analysis of 416 patients with glioblastoma multiforme: prognosis, extent of resection, and survival. *Journal of neurosurgery*. 2001;95(2):190-8.
33. Jakola AS, Myrmel KS, Kloster R, Torp SH, Lindal S, Unsgard G, et al. Comparison of a strategy favoring early surgical resection vs a strategy favoring watchful waiting in low-grade gliomas. *Jama*. 2012;308(18):1881-8.
34. Jakola AS, Skjulsvik AJ, Myrmel KS, Sjavik K, Unsgard G, Torp SH, et al. Surgical resection versus watchful waiting in low-grade gliomas. *Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology*. 2017;28(8):1942-8.

35. Aghi MK, Nahed BV, Sloan AE, Ryken TC, Kalkanis SN, Olson JJ. The role of surgery in the management of patients with diffuse low grade glioma: A systematic review and evidence-based clinical practice guideline. *Journal of neuro-oncology*. 2015;125(3):503-30.
36. Sanai N, Polley MY, McDermott MW, Parsa AT, Berger MS. An extent of resection threshold for newly diagnosed glioblastomas. *Journal of neurosurgery*. 2011;115(1):3-8.
37. Grabowski MM, Recinos PF, Nowacki AS, Schroeder JL, Angelov L, Barnett GH, et al. Residual tumor volume versus extent of resection: predictors of survival after surgery for glioblastoma. *Journal of neurosurgery*. 2014;121(5):1115-23.
38. Brown TJ, Brennan MC, Li M, Church EW, Brandmeir NJ, Rakaszewski KL, et al. Association of the Extent of Resection With Survival in Glioblastoma: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA oncology*. 2016;2(11):1460-9.
39. Molinaro AM ea. Association of Maximal Extent of Resection of Contrast-Enhanced and Non-Contrast-Enhanced Tumor With Survival Within Molecular Subgroups of Patients With Newly Diagnosed Glioblastoma. *JAMA Oncol*. 2020.
40. Karschnia P, Young JS, Dono A, Häni L, Sciortino T, Bruno F, et al. Prognostic validation of a new classification system for extent of resection in glioblastoma: A report of the RANO resect group. *Neuro Oncol*. 2023;25(5):940-54.
41. Oppenlander ME, Wolf AB, Snyder LA, Bina R, Wilson JR, Coons SW, et al. An extent of resection threshold for recurrent glioblastoma and its risk for neurological morbidity. *Journal of neurosurgery*. 2014;120(4):846-53.
42. Picart T, Pallud J, Berthiller J, Dumot C, Berhouma M, Ducray F, et al. Use of 5-ALA fluorescence-guided surgery versus white-light conventional microsurgery for the resection of newly diagnosed glioblastomas (RESECT study): a French multicenter randomized phase III study. *J Neurosurg*. 2024;140(4):987-1000.
43. Roder C, Stummer W, Coburger J, Scherer M, Haas P, von der Brelie C, et al. Intraoperative MRI-Guided Resection Is Not Superior to 5-Aminolevulinic Acid Guidance in Newly Diagnosed Glioblastoma: A Prospective Controlled Multicenter Clinical Trial. *J Clin Oncol*. 2023;41(36):5512-23.
44. Karschnia P, Gerritsen JK, Teske N, Cahill DP, Jakola AS, van den Bent M, et al. The oncological role of resection in newly diagnosed diffuse adult-type glioma defined by the WHO 2021 classification: a Review by the RANO resect group. *The Lancet Oncology*. 2024;25(9):e404-e19.
45. Molinaro AM, Hervey-Jumper S, Morshed RA, Young J, Han SJ, Chunduru P, et al. Association of Maximal Extent of Resection of Contrast-Enhanced and Non-Contrast-Enhanced Tumor With Survival Within Molecular Subgroups of Patients With Newly Diagnosed Glioblastoma. *JAMA Oncol*. 2020;6(4):495-503.
46. Incekara F, Smits M, van der Voort SR, Dubbink HJ, Atmodimedjo PN, Kros JM, et al. The Association Between the Extent of Glioblastoma Resection and Survival in Light of MGMT Promoter Methylation in 326 Patients With Newly Diagnosed IDH-Wildtype Glioblastoma. *Front Oncol*. 2020;10:1087.
47. Karschnia P, Dietrich J, Bruno F, Dono A, Juenger ST, Teske N, et al. Surgical management and outcome of newly diagnosed glioblastoma without contrast enhancement (low-grade appearance): a report of the RANO resect group. *Neuro Oncol*. 2024;26(1):166-77.
48. Brown TJ, Brennan MC, Li M, Church EW, Brandmeir NJ, Rakaszewski KL, et al. Association of the Extent of Resection With Survival in Glioblastoma: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Oncol*. 2016;2(11):1460-9.
49. Hansen RW, Pedersen CB, Halle B, Korshoej AR, Schulz MK, Kristensen BW, et al. Comparison of 5-aminolevulinic acid and sodium fluorescein for intraoperative tumor visualization in patients with high-grade gliomas: a single-center retrospective study. *J Neurosurg*. 2019;1-8.

50. Ahrens LC, Krabbenhøft MG, Hansen RW, Mikic N, Pedersen CB, Poulsen FR, et al. Effect of 5-Aminolevulinic Acid and Sodium Fluorescein on the Extent of Resection in High-Grade Gliomas and Brain Metastasis. *Cancers (Basel)*. 2022;14(3).
51. Karschnia P, Smits M, Reifenberger G, Le Rhun E, Ellingson BM, Galldiks N, et al. A framework for standardised tissue sampling and processing during resection of diffuse intracranial glioma: joint recommendations from four RANO groups. *Lancet Oncol*. 2023;24(11):e438-e50.
52. Niemi T, Armstrong E. Thromboprophylactic management in the neurosurgical patient with high risk for both thrombosis and intracranial bleeding. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2010;23(5):558-63.
53. Dansk selskab for trombose og h. Perioperative regulering af antitrombotisk behandling. *Retningslinje 2016*.
54. Lee E, Wen P. Treatment and prevention of venous thromboembolism in patients with brain tumors. *UpToDate*. 2018.
55. Taylor WA, Thomas NW, Wellings JA, Bell BA. Timing of postoperative intracranial hematoma development and implications for the best use of neurosurgical intensive care. *J Neurosurg*. 1995;82(1):48-50.
56. Michelucci R, Pasini E, Meletti S, Fallica E, Rizzi R, Florindo I, et al. Epilepsy in primary cerebral tumors: the characteristics of epilepsy at the onset (results from the PERNO study--Project of Emilia Romagna Region on Neuro-Oncology). *Epilepsia*. 2013;54 Suppl 7:86-91.
57. Altieri R, Cofano F, Agnoletti A, Fornaro R, Ajello M, Zenga F, et al. Postoperative Care of Patients with High-grade Glioma: Is There a Real Need for the Neurocritical ICU and Early CT Scan? *Journal of neurological surgeryPart A, Central European neurosurgery*. 2018;79(1):25-30.
58. Kaakaji W, Barnett GH, Bernhard D, Warbel A, Valaitis K, Stamp S. Clinical and economic consequences of early discharge of patients following supratentorial stereotactic brain biopsy. *J Neurosurg*. 2001;94(6):892-8.
59. Belhawi SMK, Hoefnagels FWA, Baaijen JC, et al. Early postoperative MRI overestimates residual tumour after resection of gliomas with no or minimal enhancement. *Eur Radiol*. 2011;21(7).
60. Louis DN, Perry A, Wesseling P, Brat DJ, Cree IA, Figarella-Branger D, et al. The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. *Neuro Oncol*. 2021;23(8):1231-51.
61. Khan L, Soliman H, Sahgal A, Perry J, Xu W, Tsao MN. External beam radiation dose escalation for high grade glioma. *Cochrane Database Syst Rev*. 2020;5:CD011475.
62. Shapiro WR, Green SB, Burger PC, Mahaley MS, Jr., Selker RG, VanGilder JC, et al. Randomized trial of three chemotherapy regimens and two radiotherapy regimens and two radiotherapy regimens in postoperative treatment of malignant glioma. *Brain Tumor Cooperative Group Trial 8001*. *Journal of neurosurgery*. 1989;71(1):1-9.
63. Kita M, Okawa T, Tanaka M, Ikeda M. Radiotherapy of malignant glioma--prospective randomized clinical study of whole brain vs local irradiation. *Gan no rinshoJapan journal of cancer clinics*. 1989;35(11):1289-94.
64. Mohile N MHea. Therapy for Diffuse Astrocytic and Oligodendroglial tumors in Adult:ASCO-SNO Guideline. *J Clin Oncol*. 2021.
65. Stupp R, Mason WP, van den Bent MJ, Weller M, Fisher B, Taphoorn MJ, et al. Radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide for glioblastoma. *The New England journal of medicine*. 2005;352(10):987-96.
66. Stupp R, Hegi ME, Mason WP, van den Bent MJ, Taphoorn MJ, Janzer RC, et al. Effects of radiotherapy with concomitant and adjuvant temozolomide versus radiotherapy alone on survival in glioblastoma in a randomised phase III study: 5-year analysis of the EORTC-NCIC trial. *The LancetOncology*. 2009;10(5):459-66.
67. Athanassiou H, Synodinou M, Maragoudakis E, Paraskevaidis M, Verigos C, Misailidou D, et al. Randomized phase II study of temozolomide and radiotherapy compared with radiotherapy alone in

- newly diagnosed glioblastoma multiforme. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology.* 2005;23(10):2372-7.
68. Stupp R, Taillibert S, Kanner A, Read W, Steinberg DM, Lhermitte B, et al. Effect of Tumor-Treating Fields Plus Maintenance Temozolomide vs Maintenance Temozolomide Alone on Survival in Patients With Glioblastoma: A Randomized Clinical Trial. *JAMA.* 2017;318(23):2306-16.
69. Shah PP, White T, Khalafallah AM, Romo CG, Price C, Mukherjee D. A systematic review of tumor treating fields therapy for high-grade gliomas. *J Neurooncol.* 2020;148(3):433-43.
70. Wen PY, Weller M, Lee EQ, Alexander BM, Barnholtz-Sloan JS, Barthel FP, et al. Glioblastoma in adults: a Society for Neuro-Oncology (SNO) and European Society of Neuro-Oncology (EANO) consensus review on current management and future directions. *Neuro Oncol.* 2020;22(8):1073-113.
71. Regev O, Merkin V, Blumenthal DT, Melamed I, Kaisman-Elbaz T. Tumor-Treating Fields for the treatment of glioblastoma: a systematic review and meta-analysis. *Neurooncol Pract.* 2021;8(4):426-40.
72. Herrlinger U, Tzardis T, Mack F, Steinbach JP, Schlegel U, Sabel M, et al. Lomustine-temozolomide combination therapy versus standard temozolomide therapy in patients with newly diagnosed glioblastoma with methylated MGMT promoter (CeTeG/NOA-09): a randomised, open-label, phase 3 trial. *Lancet.* 2019;393(10172):678-88.
73. Hegi ME, Diserens AC, Gorlia T, Hamou MF, de Tribolet N, Weller M, et al. MGMT gene silencing and benefit from temozolomide in glioblastoma. *The New England journal of medicine.* 2005;352(10):997-1003.
74. Gilbert MR, Wang M, Aldape KD, Stupp R, Hegi ME, Jaeckle KA, et al. Dose-dense temozolomide for newly diagnosed glioblastoma: a randomized phase III clinical trial. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology.* 2013;31(32):4085-91.
75. Blumenthal DT, Gorlia T, Gilbert MR, Kim MM, Burt Nabors L, Mason WP, et al. Is more better? The impact of extended adjuvant temozolomide in newly diagnosed glioblastoma: a secondary analysis of EORTC and NRG Oncology/RTOG. *Neuro-oncology.* 2017;19(8):1119-26.
76. Gramatzki D, Kickingereder P, Hentschel B, Felsberg J, Herrlinger U, Schackert G, et al. Limited role for extended maintenance temozolomide for newly diagnosed glioblastoma. *Neurology.* 2017;88(15):1422-30.
77. Omuro A, Brandes AA, Carpentier AF, Idbaih A, Reardon DA, Cloughesy T, et al. Radiotherapy combined with nivolumab or temozolomide for newly diagnosed glioblastoma with unmethylated MGMT promoter: An international randomized phase III trial. *Neuro Oncol.* 2023;25(1):123-34.
78. Lim M, Weller M, Idbaih A, Steinbach J, Finocchiaro G, Raval RR, et al. Phase III trial of chemoradiotherapy with temozolomide plus nivolumab or placebo for newly diagnosed glioblastoma with methylated MGMT promoter. *Neuro Oncol.* 2022;24(11):1935-49.
79. Hanna C, Lawrie TA, Rogozinska E, Kernohan A, Jefferies S, Bulbeck H, et al. Treatment of newly diagnosed glioblastoma in the elderly: a network meta-analysis. *Cochrane Database of Systematic Reviews.* 2020(3).
80. Laperriere N, Zuraw L, Cairncross G, Cancer Care Ontario Practice Guidelines Initiative Neuro-Oncology Disease Site G. Radiotherapy for newly diagnosed malignant glioma in adults: a systematic review. *Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology.* 2002;64(3):259-73.
81. Malmstrom A, Gronberg BH, Marosi C, Stupp R, Frappaz D, Schultz H, et al. Temozolomide versus standard 6-week radiotherapy versus hypofractionated radiotherapy in patients older than 60 years with glioblastoma: the Nordic randomised, phase 3 trial. *The Lancet Oncology.* 2012;13(9):916-26.
82. Wick A, Kessler T, Platten M, Meissner C, Bamberg M, Herrlinger U, et al. P01.013 Long-term analyses of the NOA-08 randomized phase III trial of temozolomide versus radiotherapy for elderly patients with malignant astrocytomas. *Neuro-oncology.* 2018;20:iii230-iii1.

83. Wick W, Platten M, Meisner C, Felsberg J, Tabatabai G, Simon M, et al. Temozolomide chemotherapy alone versus radiotherapy alone for malignant astrocytoma in the elderly: the NOA-08 randomised, phase 3 trial. *The Lancet Oncology*. 2012;13(7):707-15.
84. van den Bent MJ, Baumert B, Erridge SC, Vogelbaum MA, Nowak AK, Sanson M, et al. Interim results from the CATNON trial (EORTC study 26053-22054) of treatment with concurrent and adjuvant temozolomide for 1p/19q non-co-deleted anaplastic glioma: a phase 3, randomised, open-label intergroup study. *Lancet (London, England)*. 2017;390(10103):1645-53.
85. van den Bent MJ, Tesileanu CMS, Wick W, Sanson M, Brandes AA, Clement PM, et al. Adjuvant and concurrent temozolomide for 1p/19q non-co-deleted anaplastic glioma (CATNON; EORTC study 26053-22054): second interim analysis of a randomised, open-label, phase 3 study. *Lancet Oncol*. 2021;22(6):813-23.
86. Wick W, Roth P, Hartmann C, Hau P, Nakamura M, Stockhammer F, et al. Long-term analysis of the NOA-04 randomized phase III trial of sequential radiochemotherapy of anaplastic glioma with PCV or temozolomide. *Neuro Oncol*. 2016;18(11):1529-37.
87. Mohile NA, Messersmith H, Gatson NT, Hottinger AF, Lassman A, Morton J, et al. Therapy for Diffuse Astrocytic and Oligodendroglial Tumors in Adults: ASCO-SNO Guideline. *J Clin Oncol*. 2022;40(4):403-26.
88. Lecavalier-Barsoum M, Quon H, Abdulkarim B. Adjuvant treatment of anaplastic oligodendrogiomas and oligoastrocytomas. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2014;(5).
89. van den Bent MJ, Brandes AA, Taphoorn MJ, Kros JM, Kouwenhoven MC, Delattre JY, et al. Adjuvant procarbazine, lomustine, and vincristine chemotherapy in newly diagnosed anaplastic oligodendrogloma: long-term follow-up of EORTC brain tumor group study 26951. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology*. 2013;31(3):344-50.
90. Cairncross G, Wang M, Shaw E, Jenkins R, Brachman D, Buckner J, et al. Phase III trial of chemoradiotherapy for anaplastic oligodendrogloma: long-term results of RTOG 9402. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology*. 2013;31(3):337-43.
91. Perry JR, Belanger K, Mason WP, Fulton D, Kavan P, Easaw J, et al. Phase II trial of continuous dose-intense temozolomide in recurrent malignant glioma: RESCUE study. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology*. 2010;28(12):2051-7.
92. Friedman HS, Prados MD, Wen PY, Mikkelsen T, Schiff D, Abrey LE, et al. Bevacizumab alone and in combination with irinotecan in recurrent glioblastoma. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology*. 2009;27(28):4733-40.
93. van den Bent MJ, Carpentier AF, Brandes AA, Sanson M, Taphoorn MJ, Bernsen HJ, et al. Adjuvant procarbazine, lomustine, and vincristine improves progression-free survival but not overall survival in newly diagnosed anaplastic oligodendrogiomas and oligoastrocytomas: a randomized European Organisation for Research and Treatment of Cancer phase III trial. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology*. 2006;24(18):2715-22.
94. Cairncross G, Berkey B, Shaw E, Jenkins R, Scheithauer B, Brachman D, et al. Phase III trial of chemotherapy plus radiotherapy compared with radiotherapy alone for pure and mixed anaplastic oligodendrogloma: Intergroup Radiation Therapy Oncology Group Trial 9402. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology*. 2006;24(18):2707-14.
95. Cairncross JG, Wang M, Jenkins RB, Shaw EG, Giannini C, Brachman DG, et al. Benefit from procarbazine, lomustine, and vincristine in oligodendroglial tumors is associated with mutation of IDH. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology*. 2014;32(8):783-90.
96. Jaeckle KA, Ballman KV, van den Bent M, Giannini C, Galanis E, Brown PD, et al. CODEL: Phase III study of RT, RT + Temozolomide (TMZ), or TMZ for newly-diagnosed 1p/19q Codeleted Oligodendrogloma. Analysis from the initial study design. *Neuro Oncol*. 2020.

97. Lawrie TA, Gillespie D, Dowswell T, Evans J, Erridge S, Vale L, et al. Long-term neurocognitive and other side effects of radiotherapy, with or without chemotherapy, for glioma. Cochrane Database Syst Rev. 2019;8:CD013047.
98. Miller JJ, Gonzalez Castro LN, McBrayer S, Weller M, Cloughesy T, Portnow J, et al. Isocitrate dehydrogenase (IDH) mutant gliomas: A Society for Neuro-Oncology (SNO) consensus review on diagnosis, management, and future directions. Neuro Oncol. 2023;25(1):4-25.
99. Wick A, Sander A, Koch M, Bendszus M, Combs S, Haut T, et al. Improvement of functional outcome for patients with newly diagnosed grade 2 or 3 gliomas with co-deletion of 1p/19q – IMPROVE CODEL: the NOA-18 trial. BMC Cancer. 2022;22(1):645.
100. Dhawan S, Patil CG, Chen C, Venteicher AS. Early versus delayed postoperative radiotherapy for treatment of low-grade gliomas. Cochrane Database Syst Rev. 2020;1:CD009229.
101. Hanzely Z, Polgar C, Fodor J, Brucher JM, Vitanovics D, Mangel LC, et al. Role of early radiotherapy in the treatment of supratentorial WHO Grade II astrocytomas: long-term results of 97 patients. Journal of neuro-oncology. 2003;63(3):305-12.
102. Karim AB, Afra D, Cornu P, Bleehan N, Schraub S, De Witte O, et al. Randomized trial on the efficacy of radiotherapy for cerebral low-grade glioma in the adult: European Organization for Research and Treatment of Cancer Study 22845 with the Medical Research Council study BRO4: an interim analysis. International journal of radiation oncology, biology, physics. 2002;52(2):316-24.
103. Pignatti F, van den Bent M, Curran D, Debruyne C, Sylvester R, Therasse P, et al. Prognostic factors for survival in adult patients with cerebral low-grade glioma. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology. 2002;20(8):2076-84.
104. Gorlia T, Wu W, Wang M, Baumert BG, Mehta M, Buckner JC, et al. New validated prognostic models and prognostic calculators in patients with low-grade gliomas diagnosed by central pathology review: a pooled analysis of EORTC/RTOG/NCCTG phase III clinical trials. Neuro-oncology. 2013;15(11):1568-79.
105. Karim AB, Maat B, Hatlevoll R, Menten J, Rutten EH, Thomas DG, et al. A randomized trial on dose-response in radiation therapy of low-grade cerebral glioma: European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Study 22844. International journal of radiation oncology, biology, physics. 1996;36(3):549-56.
106. Shaw E, Arusell R, Scheithauer B, O'Fallon J, O'Neill B, Dinapoli R, et al. Prospective randomized trial of low- versus high-dose radiation therapy in adults with supratentorial low-grade glioma: initial report of a North Central Cancer Treatment Group/Radiation Therapy Oncology Group/Eastern Cooperative Oncology Group study. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology. 2002;20(9):2267-76.
107. Schiff D, Van den Bent M, Vogelbaum MA, Wick W, Miller CR, Taphoorn M, et al. Recent developments and future directions in adult lower-grade gliomas: Society for Neuro-Oncology (SNO) and European Association of Neuro-Oncology (EANO) consensus. Neuro-Oncology. 2019;21(7):837-53.
108. Buckner JC, Shaw EG, Pugh SL, Chakravarti A, Gilbert MR, Barger GR, et al. Radiation plus Procarbazine, CCNU, and Vincristine in Low-Grade Glioma. The New England journal of medicine. 2016;374(14):1344-55.
109. B. Hell Eea. Comprehensive genomic analysis in NRG oncology/RTOG9802; A phase III trial of radiation versus radiation plus procarbazine, Lomustine(CCNU), and vincristine in high-risk low-grade glioma. J clin Oncol. 2013.
110. Baumert BG, Hegi ME, van den Bent MJ, von Deimling A, Gorlia T, Hoang-Xuan K, et al. Temozolomide chemotherapy versus radiotherapy in high-risk low-grade glioma (EORTC 22033-26033): a randomised, open-label, phase 3 intergroup study. The LancetOncology. 2016;17(11):1521-32.
111. McDuff SGR, Dietrich J, Atkins KM, Oh KS, Loeffler JS, Shih HA. Radiation and chemotherapy for high-risk lower grade gliomas: Choosing between temozolomide and PCV. Cancer Med. 2020;9(1):3-11.

112. Mellinghoff IK, van den Bent MJ, Blumenthal DT, Touat M, Peters KB, Clarke J, et al. Vorasidenib in IDH1- or IDH2-Mutant Low-Grade Glioma. *N Engl J Med.* 2023;389(7):589-601.
113. Schiff D. Low-Grade Gliomas: A New Mutation, New Targeted Therapy, and Many Questions. *Neurology.* 2024;103(3):e209688.
114. Wick W, Gorlia T, Bendszus M, Taphoorn M, Sahm F, Harting I, et al. Lomustine and Bevacizumab in Progressive Glioblastoma. *The New England journal of medicine.* 2017;377(20):1954-63.
115. Hasselbalch B, Lassen U, Hansen S, Holmberg M, Sorensen M, Kosteljanetz M, et al. Cetuximab, bevacizumab, and irinotecan for patients with primary glioblastoma and progression after radiation therapy and temozolamide: a phase II trial. *Neuro-oncology.* 2010;12(5):508-16.
116. Ameratunga M, Pavlakis N, Wheeler H, Grant R, Simes J, Khasraw M. Anti-angiogenic therapy for high-grade glioma. *The Cochrane database of systematic reviews.* 2018;11:CD008218.
117. Hofmann S, Schmidt MA, Weissmann T, Eyupoglu I, Strnad A, Semrau S, et al. Evidence for improved survival with bevacizumab treatment in recurrent high-grade gliomas: a retrospective study with ("pseudo-randomized") treatment allocation by the health insurance provider. *J Neurooncol.* 2020;148(2):373-9.
118. Urup T, Dahlrot RH, Grunnet K, Christensen IJ, Michaelsen SR, Toft A, et al. Development and validation of a prognostic model for recurrent glioblastoma patients treated with bevacizumab and irinotecan. *Acta Oncologica (Stockholm, Sweden).* 2016;55(4):418-22.
119. McBain C, Lawrie TA, Rogozinska E, Kernohan A, Robinson T, Jefferies S. Treatment options for progression or recurrence of glioblastoma: a network meta-analysis. *Cochrane Database Syst Rev.* 2021;5:CD013579.
120. Wen PY, Stein A, van den Bent M, De Greve J, Wick A, de Vos F, et al. Dabrafenib plus trametinib in patients with BRAF(V600E)-mutant low-grade and high-grade glioma (ROAR): a multicentre, open-label, single-arm, phase 2, basket trial. *Lancet Oncol.* 2022;23(1):53-64.
121. Mosele MF, Westphalen CB, Stenzinger A, Barlesi F, Bayle A, Bièche I, et al. Recommendations for the use of next-generation sequencing (NGS) for patients with advanced cancer in 2024: a report from the ESMO Precision Medicine Working Group. *Ann Oncol.* 2024;35(7):588-606.
122. Capper D, Reifenberger G, French PJ, Schweizer L, Weller M, Touat M, et al. EANO guideline on rational molecular testing of gliomas, glioneuronal, and neuronal tumors in adults for targeted therapy selection. *Neuro Oncol.* 2023;25(5):813-26.
123. van den Bent MJ, Chinot O, Boogerd W, Bravo Marques J, Taphoorn MJ, Kros JM, et al. Second-line chemotherapy with temozolamide in recurrent oligodendrogloma after PCV (procarbazine, lomustine and vincristine) chemotherapy: EORTC Brain Tumor Group phase II study 26972. *Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology.* 2003;14(4):599-602.
124. Brada M, Viviers L, Abson C, Hines F, Britton J, Ashley S, et al. Phase II study of primary temozolamide chemotherapy in patients with WHO grade II gliomas. *Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology.* 2003;14(12):1715-21.
125. Quinn JA, Reardon DA, Friedman AH, Rich JN, Sampson JH, Provenzale JM, et al. Phase II trial of temozolamide in patients with progressive low-grade glioma. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology.* 2003;21(4):646-51.
126. Pace A, Vidiri A, Galie E, Carosi M, Telera S, Cianciulli AM, et al. Temozolamide chemotherapy for progressive low-grade glioma: clinical benefits and radiological response. *Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology.* 2003;14(12):1722-6.
127. Hoang-Xuan K, Capelle L, Kujas M, Taillibert S, Duffau H, Lejeune J, et al. Temozolamide as initial treatment for adults with low-grade oligodendrogiomas or oligoastrocytomas and correlation with chromosome 1p deletions. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology.* 2004;22(15):3133-8.

128. van den Bent MJ, Klein M, Smits M, Reijneveld JC, French PJ, Clement P, et al. Bevacizumab and temozolomide in patients with first recurrence of WHO grade II and III glioma, without 1p/19q co-deletion (TAVAREC): a randomised controlled phase 2 EORTC trial. *Lancet Oncol.* 2018;19(9):1170-9.
129. Metellus P, Guyotat J, Chinot O, Durand A, Barrie M, Giorgi R, et al. Adult intracranial WHO grade II ependymomas: long-term outcome and prognostic factor analysis in a series of 114 patients. *Neuro-oncology.* 2010;12(9):976-84.
130. Reni M, Gatta G, Mazza E, Vecht C. Ependymoma. Critical reviews in oncology/hematology. 2007;63(1):81-9.
131. Wu J, Armstrong TS, Gilbert MR. Biology and management of ependymomas. *Neuro-oncology.* 2016;18(7):902-13.
132. Oya N, Shibamoto Y, Nagata Y, Negoro Y, Hiraoka M. Postoperative radiotherapy for intracranial ependymoma: analysis of prognostic factors and patterns of failure. *Journal of neuro-oncology.* 2002;56(1):87-94.
133. Rogers L, Pueschel J, Spetzler R, Shapiro W, Coons S, Thomas T, et al. Is gross-total resection sufficient treatment for posterior fossa ependymomas? *Journal of neurosurgery.* 2005;102(4):629-36.
134. Mansur DB, Perry A, Rajaram V, Michalski JM, Park TS, Leonard JR, et al. Postoperative radiation therapy for grade II and III intracranial ependymoma. *International journal of radiation oncology, biology, physics.* 2005;61(2):387-91.
135. Nuno M, Yu JJ, Varshneya K, Alexander J, Mukherjee D, Black KL, et al. Treatment and survival of supratentorial and posterior fossa ependymomas in adults. *Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of Australasia.* 2016;28:24-30.
136. Zheng Y, Ong SH, Nga VDW, Vellayappan B. Adjuvant radiotherapy versus observation after gross total resection of WHO grade II ependymoma: a systematic review and individual-participant data meta-analysis. *Chin Clin Oncol.* 2024;13(2):22.
137. Bouffet E, Hawkins CE, Ballourah W, Taylor MD, Bartels UK, Schoenhoff N, et al. Survival benefit for pediatric patients with recurrent ependymoma treated with reirradiation. *International journal of radiation oncology, biology, physics.* 2012;83(5):1541-8.
138. Merchant TE, Boop FA, Kun LE, Sanford RA. A retrospective study of surgery and reirradiation for recurrent ependymoma. *International journal of radiation oncology, biology, physics.* 2008;71(1):87-97.
139. Eaton BR, Chowdhry V, Weaver K, Liu L, Ebb D, MacDonald SM, et al. Use of proton therapy for re-irradiation in pediatric intracranial ependymoma. *Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology.* 2015;116(2):301-8.
140. Ruda R, Bosa C, Magistrello M, Franchino F, Pellerino A, Fiano V, et al. Temozolomide as salvage treatment for recurrent intracranial ependymomas of the adult: a retrospective study. *Neuro-oncology.* 2016;18(2):261-8.
141. Gilbert MR, Yuan Y, Wu J, Mendoza T, Vera E, Omuro A, et al. A phase II study of dose-dense temozolomide and lapatinib for recurrent low-grade and anaplastic supratentorial, infratentorial, and spinal cord ependymoma. *Neuro Oncol.* 2021;23(3):468-77.
142. Ingraham FD, Matson DD, McLaurin RL. Cortisone and ACTH as an adjunct to the surgery of craniopharyngiomas. *The New England journal of medicine.* 1952;246(15):568-71.
143. Kofman S, Garvin JS, Nagamani D, Taylor SG, 3rd. Treatment of cerebral metastases from breast carcinoma with prednisolone. *Journal of the American Medical Association.* 1957;163(16):1473-6.
144. Galichich JH, French LA, Melby JC. Use of dexamethasone in treatment of cerebral edema associated with brain tumors. *The Journal-lancet.* 1961;81:46-53.
145. Sarin R, Murthy V. Medical decompressive therapy for primary and metastatic intracranial tumours. *The LancetNeurology.* 2003;2(6):357-65.

146. Kotsarini C, Griffiths PD, Wilkinson ID, Hoggard N. A systematic review of the literature on the effects of dexamethasone on the brain from in vivo human-based studies: implications for physiological brain imaging of patients with intracranial tumors. *Neurosurgery*. 2010;67(6):1799-815; discussion 815.
147. Nahaczewski AE, Fowler SB, Hariharan S. Dexamethasone therapy in patients with brain tumors--a focus on tapering. *The Journal of neuroscience nursing : journal of the American Association of Neuroscience Nurses*. 2004;36(6):340-3.
148. Raslan A, Bhardwaj A. Medical management of cerebral edema. *Neurosurgical focus*. 2007;22(5):E12.
149. Ryan R, Booth S, Price S. Corticosteroid-use in primary and secondary brain tumour patients: a review. *Journal of neuro-oncology*. 2012;106(3):449-59.
150. Kostaras X, Cusano F, Kline GA, Roa W, Easaw J. Use of dexamethasone in patients with high-grade glioma: a clinical practice guideline. *Current oncology (Toronto, Ont)*. 2014;21(3):e493-503.
151. Jessurun CAC, Hulsbergen AFC, Cho LD, Aglio LS, Nandoe Tewarie RDS, Broekman MLD. Evidence-based dexamethasone dosing in malignant brain tumors: what do we really know? *J Neurooncol*. 2019;144(2):249-64.
152. Ryken TC, Kuo JS, Prabhu RS, Sherman JH, Kalkanis SN, Olson JJ. Congress of Neurological Surgeons Systematic Review and Evidence-Based Guidelines on the Role of Steroids in the Treatment of Adults With Metastatic Brain Tumors. *Neurosurgery*. 2019;84(3):E189-E91.
153. Petrelli F, De Stefani A, Ghidini A, Bruschieri L, Riboldi V, Dottorini L, et al. Steroids use and survival in patients with glioblastoma multiforme: a pooled analysis. *J Neurol*. 2021;268(2):440-7.
154. Roth P, Regli L, Tonder M, Weller M. Tumor-associated edema in brain cancer patients: pathogenesis and management. *Expert review of anticancer therapy*. 2013;13(11):1319-25.
155. Dubinski D, Hattingen E, Senft C, Seifert V, Peters KG, Reiss Y, et al. Controversial roles for dexamethasone in glioblastoma - Opportunities for novel vascular targeting therapies. *J Cereb Blood Flow Metab*. 2019;39(8):1460-8.
156. Ohmura K, Tomita H, Hara A. Peritumoral Edema in Gliomas: A Review of Mechanisms and Management. *Biomedicines*. 2023;11(10).
157. Pitter KL, Tamagno I, Alikhanyan K, Hosni-Ahmed A, Pattwell SS, Donnola S, et al. Corticosteroids compromise survival in glioblastoma. *Brain : a journal of neurology*. 2016;139(Pt 5):1458-71.
158. Shields LB, Shelton BJ, Shearer AJ, Chen L, Sun DA, Parsons S, et al. Dexamethasone administration during definitive radiation and temozolomide renders a poor prognosis in a retrospective analysis of newly diagnosed glioblastoma patients. *Radiation oncology (London, England)*. 2015;10:222-015-0527-0.
159. Diez Valle R, Becerra Castro V, Marigil Sanchez M, Gallego Perez-Larraya J, Nunez-Cordoba JM, Tejada Solis S. Results of a Policy of Fast Tapering of Steroids After Resection Surgery in Glioblastoma. *World neurosurgery*. 2018;109:e845-e52.
160. Dinsen S, Baslund B, Klose M, Rasmussen AK, Friis-Hansen L, Hilsted L, et al. Why glucocorticoid withdrawal may sometimes be as dangerous as the treatment itself. *European journal of internal medicine*. 2013;24(8):714-20.
161. Conn HO, Blitzer BL. Nonassociation of adrenocorticosteroid therapy and peptic ulcer. *The New England journal of medicine*. 1976;294(9):473-9.
162. Conn HO, Poynard T. Adrenocorticosteroid administration and peptic ulcer: a critical analysis. *Journal of chronic diseases*. 1985;38(6):457-68.
163. Carson JL, Strom BL, Schinnar R, Duff A, Sim E. The low risk of upper gastrointestinal bleeding in patients dispensed corticosteroids. *The American Journal of Medicine*. 1991;91(3):223-8.
164. Caplan A, Fett N, Rosenbach M, Werth VP, Micheletti RG. Prevention and management of glucocorticoid-induced side effects: A comprehensive review: Gastrointestinal and endocrinologic side effects. *J Am Acad Dermatol*. 2017;76(1):11-6.

165. Roth P, Wick W, Weller M. Steroids in neurooncology: actions, indications, side-effects. *Current opinion in neurology.* 2010;23(6):597-602.
166. Dropcho EJ, Soong SJ. Steroid-induced weakness in patients with primary brain tumors. *Neurology.* 1991;41(8):1235-9.
167. Batchelor TT, Taylor LP, Thaler HT, Posner JB, DeAngelis LM. Steroid myopathy in cancer patients. *Neurology.* 1997;48(5):1234-8.
168. Dietrich J, Rao K, Pastorino S, Kesari S. Corticosteroids in brain cancer patients: benefits and pitfalls. *Expert review of clinical pharmacology.* 2011;4(2):233-42.
169. Liu RH, Werth VP. What is new in the treatment of steroid-induced osteoporosis? *Seminars in cutaneous medicine and surgery.* 2007;26(4):203-9.
170. Grossman JM, Gordon R, Ranganath VK, Deal C, Caplan L, Chen W, et al. American College of Rheumatology 2010 recommendations for the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis. *Arthritis care & research.* 2010;62(11):1515-26.
171. Ross DA, Cetas JS. Steroid psychosis: a review for neurosurgeons. *Journal of neuro-oncology.* 2012;109(3):439-47.
172. Ismail MF, Lavelle C, Cassidy EM. Steroid-induced mental disorders in cancer patients: a systematic review. *Future oncology (London, England).* 2017;13(29):2719-31.
173. Grossman SA, Ye X, Lesser G, Sloan A, Carraway H, Desideri S, et al. Immunosuppression in patients with high-grade gliomas treated with radiation and temozolomide. *Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research.* 2011;17(16):5473-80.
174. Englot DJ, Chang EF, Vecht CJ. Epilepsy and brain tumors. *Handbook of clinical neurology.* 2016;134:267-85.
175. Li Y, Shan X, Wu Z, Wang Y, Ling M, Fan X. IDH1 mutation is associated with a higher preoperative seizure incidence in low-grade glioma: A systematic review and meta-analysis. *Seizure.* 2018;55:76-82.
176. Kerkhof M, Vecht CJ. Seizure characteristics and prognostic factors of gliomas. *Epilepsia.* 2013;54 Suppl 9:12-7.
177. Yuen T, O'Brien TJ, Morokoff AP. Epilepsy Associated with Brain Tumors. *Brain Tumors:* Butterworth-Heinemann; 2012. p. 237-48.
178. Lee JW, Wen PY, Hurwitz S, Black P, Kesari S, Drappatz J, et al. Morphological characteristics of brain tumors causing seizures. *Archives of Neurology.* 2010;67(3):336-42.
179. Chaichana KL, Parker SL, Olivi A, Quinones-Hinojosa A. Long-term seizure outcomes in adult patients undergoing primary resection of malignant brain astrocytomas. *Clinical article. Journal of neurosurgery.* 2009;111(2):282-92.
180. Chang EF, Potts MB, Keles GE, Lamborn KR, Chang SM, Barbaro NM, et al. Seizure characteristics and control following resection in 332 patients with low-grade gliomas. *Journal of neurosurgery.* 2008;108(2):227-35.
181. Hildebrand J, Lecaille C, Perennies J, Delattre JY. Epileptic seizures during follow-up of patients treated for primary brain tumors. *Neurology.* 2005;65(2):212-5.
182. Sirven JI, Wingerchuk DM, Drazkowski JF, Lyons MK, Zimmerman RS. Seizure prophylaxis in patients with brain tumors: a meta-analysis. *Mayo Clinic proceedings.* 2004;79(12):1489-94.
183. Perucca E. Optimizing antiepileptic drug treatment in tumoral epilepsy. *Epilepsia.* 2013;54 Suppl 9:97-104.
184. Avila EK, Gruber J. Seizures and epilepsy in cancer patients. *Current neurology and neuroscience reports.* 2010;10(1):60-7.
185. Glantz MJ, Forsyth PA, Recht LD, Wen PY, Chamberlain MC, Grossman SA, et al. Practice parameter: Anticonvulsant prophylaxis in patients with newly diagnosed brain tumors - Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. *Neurology.* 2000;54(10):1886-93.

186. Berntsson SG, Merrell RT, Amirian ES, Armstrong GN, Lachance D, Smits A, et al. Glioma-related seizures in relation to histopathological subtypes: a report from the glioma international case-control study. *Journal of neurology*. 2018;265(6):1432-42.
187. Pallud J, Capelle L, Huberfeld G. Tumoral epileptogenicity: how does it happen? *Epilepsia*. 2013;54 Suppl 9:30-4.
188. Shamji MF, Fric-Shamji EC, Benoit BG. Brain tumors and epilepsy: pathophysiology of peritumoral changes. *Neurosurgical review*. 2009;32(3):275-84; discussion 84-6.
189. Lynam LM, Lyons MK, Drazkowski JF, Sirven JI, Noe KH, Zimmerman RS, et al. Frequency of seizures in patients with newly diagnosed brain tumors: a retrospective review. *Clinical neurology and neurosurgery*. 2007;109(7):634-8.
190. van Breemen MS, Wilms EB, Vecht CJ. Epilepsy in patients with brain tumours: epidemiology, mechanisms, and management. *The Lancet Neurology*. 2007;6(5):421-30.
191. Liigant A, Haldre S, Oun A, Linnamagi U, Saar A, Asser T, et al. Seizure disorders in patients with brain tumors. *European neurology*. 2001;45(1):46-51.
192. Guerrini R, Rosati A, Giordano F, Genitori L, Barba C. The medical and surgical treatment of tumoral seizures: current and future perspectives. *Epilepsia*. 2013;54 Suppl 9:84-90.
193. Japp A, Gielen GH, Becker AJ. Recent aspects of classification and epidemiology of epilepsy-associated tumors. *Epilepsia*. 2013;54 Suppl 9:5-11.
194. Brodie MJ, Covaris A, Gil-Nagel A, Lerche H, Perucca E, Sills GJ, et al. Antiepileptic drug therapy: does mechanism of action matter? *Epilepsy & behavior : E&B*. 2011;21(4):331-41.
195. Nakken K, Taubøll E. Farmakoresistent epilepsy. *Tidsskr Nor Legeforen*. 2008(129):1986-9.
196. Duncan JS, de Tisi J. MRI in the diagnosis and management of epileptomas. *Epilepsia*. 2013;54 Suppl 9:40-3.
197. Englot DJ, Berger MS, Barbaro NM, Chang EF. Predictors of seizure freedom after resection of supratentorial low-grade gliomas. A review. *Journal of neurosurgery*. 2011;115(2):240-4.
198. Englot DJ, Han SJ, Berger MS, Barbaro NM, Chang EF. Extent of surgical resection predicts seizure freedom in low-grade temporal lobe brain tumors. *Neurosurgery*. 2012;70(4):921-8; discussion 8.
199. Vecht CJ, Kerkhof M, Duran-Pena A. Seizure prognosis in brain tumors: new insights and evidence-based management. *The oncologist*. 2014;19(7):751-9.
200. Vecht C, Royer-Perron L, Houillier C, Huberfeld G. Seizures and Anticonvulsants in Brain Tumours: Frequency, Mechanisms and Anti-Epileptic Management. *Current pharmaceutical design*. 2017;23(42):6464-87.
201. Tremont-Lukats IW, Ratilal BO, Armstrong T, Gilbert MR. Antiepileptic drugs for preventing seizures in people with brain tumors. *The Cochrane database of systematic reviews*. 2008;(2):CD004424. doi(2):CD004424.
202. Kerrigan S, Grant R. Antiepileptic drugs for treating seizures in adults with brain tumours. *The Cochrane database of systematic reviews*. 2011;(8):CD008586. doi(8):CD008586.
203. Maschio M, Aguglia U, Avanzini G, Banfi P, Buttinelli C, Capovilla G, et al. Management of epilepsy in brain tumors. *Neurol Sci*. 2019;40(10):2217-34.
204. Yuan Y, Xiang W, Qing M, Yanhui L, Jiewen L, Yunhe M. Survival analysis for valproic acid use in adult glioblastoma multiforme: a meta-analysis of individual patient data and a systematic review. *Seizure*. 2014;23(10):830-5.
205. Ruda R, Soffietti R. What is New in the Management of Epilepsy in Gliomas? Current treatment options in neurology. 2015;17(6):351-015-0351-8.
206. Knudsen-Baas KM, Engeland A, Gilhus NE, Storstein AM, Owe JF. Does the choice of antiepileptic drug affect survival in glioblastoma patients? *Journal of neuro-oncology*. 2016;129(3):461-9.

207. Koekkoek JA, Dirven L, Reijneveld JC, Sizoo EM, Pasman HR, Postma TJ, et al. End of life care in high-grade glioma patients in three European countries: a comparative study. *Journal of neuro-oncology*. 2014;120(2):303-10.
208. Ruda R, Bello L, Duffau H, Soffietti R. Seizures in low-grade gliomas: natural history, pathogenesis, and outcome after treatments. *Neuro-oncology*. 2012;14 Suppl 4:iv55-64.
209. Villani V, Merola R, Vidiri A, Fabi A, Carosi M, Giannarelli D, et al. Temozolomide low-dose chemotherapy in newly diagnosed low-grade gliomas: activity, safety, and long-term follow-up. *Tumori*. 2017;103(3):255-60.
210. Lange F, Wesslau K, Porath K, Hornschemeyer J, Bergner C, Krause BJ, et al. AMPA receptor antagonist perampanel affects glioblastoma cell growth and glutamate release in vitro. *PLoS One*. 2019;14(2):e0211644.
211. Rizzo A, Donzelli S, Gireggi V, Sacconi A, Vasco C, Salmaggi A, et al. In vitro antineoplastic effects of brivaracetam and lacosamide on human glioma cells. *J Exp Clin Cancer Res*. 2017;36(1):76.
212. Remi C, Zwanzig V, Feddersen B. Subcutaneous Use of Lacosamide. *Journal of pain and symptom management*. 2016;51(2):e2-4.
213. Furtado I, Goncalves F, Goncalves J, Neves J. Continuous subcutaneous levetiracetam in end-of-life care. *BMJ case reports*. 2018;2018:10.1136/bcr-2017-222340.
214. O'Dell MW, Barr K, Spanier D, Warnick RE. Functional outcome of inpatient rehabilitation in persons with brain tumors. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*. 1998;79(12):1530-4.
215. Greenberg E, Treger I, Ring H. Rehabilitation outcomes in patients with brain tumors and acute stroke: comparative study of inpatient rehabilitation. *American journal of physical medicine & rehabilitation*. 2006;85(7):568-73.
216. Geler-Kulcu D, Gulsen G, Buyukbaba E, Ozkan D. Functional recovery of patients with brain tumor or acute stroke after rehabilitation: a comparative study. *Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of Australasia*. 2009;16(1):74-8.
217. Khan F, Amatya B, Drummond K, Galea M. Effectiveness of integrated multidisciplinary rehabilitation in primary brain cancer survivors in an Australian community cohort: a controlled clinical trial. *Journal of Rehabilitation Medicine*. 2014;46(8):754-60.
218. Khan MS, Gan C, Ahmed K, Ismail AF, Watkins J, Summers JA, et al. A Single-centre Early Phase Randomised Controlled Three-arm Trial of Open, Robotic, and Laparoscopic Radical Cystectomy (CORAL). *Eur Urol*. 2016;69(4):613-21.
219. Catt S, Chalmers A, Fallowfield L. Psychosocial and supportive-care needs in high-grade glioma. *The Lancet Oncology*. 2008;9(9):884-91.
220. Davies E, Hall S, Clarke C. Two year survival after malignant cerebral glioma: patient and relative reports of handicap, psychiatric symptoms and rehabilitation. *Disability and rehabilitation*. 2003;25(6):259-66.
221. Archibald YM, Lunn D, Ruttan LA, Macdonald DR, Del Maestro RF, Barr HW, et al. Cognitive functioning in long-term survivors of high-grade glioma. *Journal of neurosurgery*. 1994;80(2):247-53.
222. Hansen A, Sogaard K, Minet LR, Jarden JO. A 12-week interdisciplinary rehabilitation trial in patients with gliomas - a feasibility study. *Disability and rehabilitation*. 2018;40(12):1379-85.
223. Bartolo M, Zucchella C, Pace A, Lanzetta G, Vecchione C, Bartolo M, et al. Early rehabilitation after surgery improves functional outcome in inpatients with brain tumours. *Journal of neuro-oncology*. 2012;107(3):537-44.
224. Greer JA, Jackson VA, Meier DE, Temel JS. Early integration of palliative care services with standard oncology care for patients with advanced cancer. *CA: a cancer journal for clinicians*. 2013;63(5):349-63.
225. Piil K, Jakobsen J, Christensen KB, Juhler M, Guetterman TC, Fetters MD, et al. Needs and preferences among patients with high-grade glioma and their caregivers - A longitudinal mixed methods study. *European journal of cancer care*. 2018;27(2):e12806.

226. Formica V, Del Monte G, Giacchetti I, Grenga I, Giaquinto S, Fini M, et al. Rehabilitation in neuro-oncology: a meta-analysis of published data and a mono-institutional experience. *Integrative cancer therapies.* 2011;10(2):119-26.
227. Nicole Culos-Reed S, Leach HJ, Capozzi LC, Easaw J, Eves N, Millet GY. Exercise preferences and associations between fitness parameters, physical activity, and quality of life in high-grade glioma patients. *Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer.* 2017;25(4):1237-46.
228. Gehring K, Sitskoorn MM, Gundy CM, Sikkes SA, Klein M, Postma TJ, et al. Cognitive rehabilitation in patients with gliomas: a randomized, controlled trial. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology.* 2009;27(22):3712-22.
229. Gehring K, Aaronson NK, Taphoorn MJ, Sitskoorn MM. Interventions for cognitive deficits in patients with a brain tumor: an update. *Expert review of anticancer therapy.* 2010;10(11):1779-95.
230. Gehring K, Aaronson N, Taphoorn M, Sitskoorn M. A description of a cognitive rehabilitation programme evaluated in brain tumour patients with mild to moderate cognitive deficits. *Clinical rehabilitation.* 2011;25(8):675-92.
231. Soffietti R, Baumert BG, Bello L, von Deimling A, Duffau H, Frenay M, et al. Guidelines on management of low-grade gliomas: report of an EFNS-EANO Task Force. *European journal of neurology.* 2010;17(9):1124-33.
232. Klein M, Duffau H, De Witt Hamer PC. Cognition and resective surgery for diffuse infiltrative glioma: an overview. *Journal of neuro-oncology.* 2012;108(2):309-18.
233. Weitzner MA, Meyers CA. Cognitive functioning and quality of life in malignant glioma patients: a review of the literature. *Psycho-oncology.* 1997;6(3):169-77.
234. Rofes A, Mandonnet E, Godden J, Baron MH, Colle H, Darlix A, et al. Survey on current cognitive practices within the European Low-Grade Glioma Network: towards a European assessment protocol. *Acta Neurochirurgica.* 2017;159(7):1167-78.
235. Yang S, Chun MH, Son YR. Effect of virtual reality on cognitive dysfunction in patients with brain tumor. *Annals of rehabilitation medicine.* 2014;38(6):726-33.
236. Zucchella C, Capone A, Codella V, De Nunzio AM, Vecchione C, Sandrini G, et al. Cognitive rehabilitation for early post-surgery inpatients affected by primary brain tumor: a randomized, controlled trial. *Journal of neuro-oncology.* 2013;114(1):93-100.
237. Bergo E, Lombardi G, Pambuku A, Della Puppa A, Bellu L, D'Avella D, et al. Cognitive Rehabilitation in Patients with Gliomas and Other Brain Tumors: State of the Art. *BioMed research international.* 2016;2016:3041824.
238. Litofsky NS, Resnick AG. The relationships between depression and brain tumors. *Journal of neuro-oncology.* 2009;94(2):153-61.
239. Mainio A, Hakko H, Niemela A, Koivukangas J, Rasanen P. Depression and functional outcome in patients with brain tumors: a population-based 1-year follow-up study. *Journal of neurosurgery.* 2005;103(5):841-7.
240. Pelletier G, Verhoef MJ, Khatri N, Hagen N. Quality of life in brain tumor patients: the relative contributions of depression, fatigue, emotional distress, and existential issues. *Journal of neuro-oncology.* 2002;57(1):41-9.
241. Rooney AG, Carson A, Grant R. Depression in cerebral glioma patients: a systematic review of observational studies. *Journal of the National Cancer Institute.* 2011;103(1):61-76.
242. Shi C, Lamba N, Zheng LJ, Cote D, Regestein QR, Liu CM, et al. Depression and survival of glioma patients: A systematic review and meta-analysis. *Clinical neurology and neurosurgery.* 2018;172:8-19.
243. Rooney AG, Brown PD, Reijneveld JC, Grant R. Depression in glioma: a primer for clinicians and researchers. *Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry.* 2014;85(2):230-5.

244. Bielecka AM, Obuchowicz E. Antidepressant drugs can modify cytotoxic action of temozolomide. *European journal of cancer care*. 2017;26(5):10.1111/ecc.12551. Epub 2016 Aug 2.
245. Bielecka-Wajzman AM, Lesiak M, Luduga T, Sieron A, Obuchowicz E. Reversing glioma malignancy: a new look at the role of antidepressant drugs as adjuvant therapy for glioblastoma multiforme. *Cancer chemotherapy and pharmacology*. 2017;79(6):1249-56.
246. Salander P, Bergenheim AT, Henriksson R. How was life after treatment of a malignant brain tumour? *Social science & medicine* (1982). 2000;51(4):589-98.
247. Oberndorfer S, Hutterer M. Palliative care in glioma management. *Curr Opin Oncol*. 2019;31(6):548-53.
248. Hjortbak BR, et al. Udfordringer til rehabilitering i Danmark. Aarhus: Rehabiliteringsforum Danmark; eksp. Marselisborgcentret; 2011. 266 sider, illustreret p.
249. Sundhedsstyrelsen. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. 2012.
250. Sundhedsstyrelsen. Opfølgningsprogram for hjernekræft. 2015.
251. Salo J, Niemela A, Joukamaa M, Koivukangas J. Effect of brain tumour laterality on patients' perceived quality of life. *Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry*. 2002;72(3):373-7.
252. Vecht CJ, Hovestadt A, Verbiest HB, van Vliet JJ, van Putten WL. Dose-effect relationship of dexamethasone on Karnofsky performance in metastatic brain tumors: a randomized study of doses of 4, 8, and 16 mg per day. *Neurology*. 1994;44(4):675-80.
253. Koekkoek JA, Postma TJ, Heimans JJ, Reijneveld JC, Taphoorn MJ. Antiepileptic drug treatment in the end-of-life phase of glioma patients: a feasibility study. *Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer*. 2016;24(4):1633-8.
254. Anderson GD, Saneto RP. Current oral and non-oral routes of antiepileptic drug delivery. *Advanced Drug Delivery Reviews*. 2012;64(10):911-8.
255. Yust-Katz S, Mandel JJ, Wu J, Yuan Y, Webre C, Pawar TA, et al. Venous thromboembolism (VTE) and glioblastoma. *Journal of neuro-oncology*. 2015;124(1):87-94.
256. Edwin NC, Elson P, Ahluwalia MS, Khorana AA. Venous thromboembolism in patients with glioblastoma: Risk factors and prognostic importance. *JCO*. 2015;33(15):e13027-e.
257. Dansk Center for Trombose og Hæmostase. *Cancer og Venøs Tromboembolisme*. 2017.
258. Perry JR. Thromboembolic disease in patients with high-grade glioma. *Neuro-oncology*. 2012;14 Suppl 4:iv73-80.
259. Kim BR, Chun MH, Han EY, Kim DK. Fatigue assessment and rehabilitation outcomes in patients with brain tumors. *Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer*. 2012;20(4):805-12.
260. Struik K, Klein M, Heimans JJ, Gielissen MF, Bleijenberg G, Taphoorn MJ, et al. Fatigue in low-grade glioma. *Journal of neuro-oncology*. 2009;92(1):73-8.
261. Wen PY, Schiff D, Kesari S, Drappatz J, Gigas DC, Doherty L. Medical management of patients with brain tumors. *Journal of neuro-oncology*. 2006;80(3):313-32.
262. Brown PD, Ballman KV, Rummans TA, Maurer MJ, Sloan JA, Boeve BF, et al. Prospective study of quality of life in adults with newly diagnosed high-grade gliomas. *Journal of neuro-oncology*. 2006;76(3):283-91.
263. Armstrong TS, Gilbert MR. Practical strategies for management of fatigue and sleep disorders in people with brain tumors. *Neuro-oncology*. 2012;14 Suppl 4:iv65-72.
264. Day J, Yust-Katz S, Cachia D, Wefel J, Katz LH, Tremont I, et al. Interventions for the management of fatigue in adults with a primary brain tumour. *The Cochrane database of systematic reviews*. 2016;4:CD011376.
265. Ownsworth T, Chambers S, Damborg E, Casey L, Walker DG, Shum DH. Evaluation of the making sense of brain tumor program: a randomized controlled trial of a home-based psychosocial intervention. *Psycho-oncology*. 2015;24(5):540-7.
266. Vargo M. Rehabilitation of patients with glioma. *Handbook of clinical neurology*. 2016;134:287-304.

267. Breitbart W, Alici Y. Evidence-based treatment of delirium in patients with cancer. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology*. 2012;30(11):1206-14.
268. Agar MR, Lawlor PG, Quinn S, Draper B, Caplan GA, Rowett D, et al. Efficacy of Oral Risperidone, Haloperidol, or Placebo for Symptoms of Delirium Among Patients in Palliative Care: A Randomized Clinical Trial. *JAMA internal medicine*. 2017;177(1):34-42.
269. Boettger S, Jenewein J, Breitbart W. Haloperidol, risperidone, olanzapine and aripiprazole in the management of delirium: A comparison of efficacy, safety, and side effects. *Palliative & supportive care*. 2015;13(4):1079-85.
270. Eano. EANO Guidelines: Gliom, ependymom, palliation. 2017.
271. Chan E, Louie AV, Hanna M, Bauman GS, Fisher BJ, Palma DA, et al. Multidisciplinary assessment of fitness to drive in brain tumour patients in southwestern Ontario: a grey matter. *Curr Oncol*. 2013;20(1):e4-e12.
272. Chin YS, Jayamohan J, Clouston P, Gebski V, Cakir B. Driving and patients with brain tumours: a postal survey of neurosurgeons, neurologists and radiation oncologists. *J Clin Neurosci*. 2004;11(5):471-4.
273. Mansur A, Desimone A, Vaughan S, Schweizer TA, Das S. To drive or not to drive, that is still the question: current challenges in driving recommendations for patients with brain tumours. *Journal of Neuro-Oncology*. 2018;137(2):379-85.
274. Thomas S, Mehta MP, Kuo JS, Ian Robins H, Khuntia D. Current practices of driving restriction implementation for patients with brain tumors. *J Neurooncol*. 2011;103(3):641-7.
275. Styrelsen for p. Vejledning om helbredskrav til kørekort.
276. Bekendtgørelse om kørekort 2017.
277. Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning, VEJ 9584. 2013.
278. Sundhedslovens § 43, stk. 2.
279. Autorisationslovens §44.
280. Sundhed.dk. Kørselsforbud. 2018.
281. Davies E, Hopkins A. Good practice in the management of adults with malignant cerebral glioma: clinical guidelines. Working Group, Royal College of Physicians. *British journal of neurosurgery*. 1997;11(4):318-30.
282. Stupp R, Pavlidis N, Jelic S. ESMO Minimum Clinical Recommendations for diagnosis, treatment and follow-up of malignant glioma2005. i64-5 p.
283. Ellingson BM, Bendszus M, Boxerman J, Barboriak D, Erickson BJ, Smits M, et al. Consensus recommendations for a standardized Brain Tumor Imaging Protocol in clinical trials. *Neuro Oncol*. 2015;17(9):1188-98.
284. Magrath IT, Mugerwa J, Bailey I, Olweny C, Kiryabwire Y. Intracerebral Burkitt's lymphoma: pathology, clinical features and treatment. *Q J Med*. 1974;43(172):489-508.
285. Pace R, Pluye P, Bartlett G, Macaulay AC, Salsberg J, Jagosh J, et al. Testing the reliability and efficiency of the pilot Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) for systematic mixed studies review. *Int J Nurs Stud*. 2012;49(1):47-53.
286. Avivi I, Arcaini L, Ferretti VV, Boumendil A, Finel H, Milone G, et al. High-dose therapy and autologous stem cell transplantation in marginal zone lymphomas: a retrospective study by the EBMT Lymphoma Working Party and FIL-GITMO. *Br J Haematol*. 2018;182(6):807-15.
287. Baumert BG, Hegi ME, van den Bent MJ, von Deimling A, Gorlia T, Hoang-Xuan K, et al. Temozolomide chemotherapy versus radiotherapy in high-risk low-grade glioma (EORTC 22033-26033): a randomised, open-label, phase 3 intergroup study. *The LancetOncology*. 2016;17(11):1521-32.
288. Pitter KL, Tamagno I, Alikhanyan K, Hosni-Ahmed A, Pattwell SS, Donnola S, et al. Corticosteroids compromise survival in glioblastoma. *Brain : a journal of neurology*. 2016;139(Pt 5):1458-71.

289. Poulsen SH, Urup T, Grunnet K, Christensen IJ, Larsen VA, Jensen ML, et al. The prognostic value of FET PET at radiotherapy planning in newly diagnosed glioblastoma. European journal of nuclear medicine and molecular imaging. 2017;44(3):373-81.
290. Galldiks N, Rapp M, Stoffels G, Fink GR, Shah NJ, Coenen HH, et al. Response assessment of bevacizumab in patients with recurrent malignant glioma using [18F]Fluoroethyl-L-tyrosine PET in comparison to MRI. European journal of nuclear medicine and molecular imaging. 2013;40(1):22-33.
291. Galldiks N, Dunkl V, Stoffels G, Hutterer M, Rapp M, Sabel M, et al. Diagnosis of pseudoprogression in patients with glioblastoma using O-(2-[18F]fluoroethyl)-L-tyrosine PET. European journal of nuclear medicine and molecular imaging. 2015;42(5):685-95.
292. Pauleit D, Floeth F, Hamacher K, Riemenschneider MJ, Reifenberger G, Muller HW, et al. O-(2-[18F]fluoroethyl)-L-tyrosine PET combined with MRI improves the diagnostic assessment of cerebral gliomas. Brain : a journal of neurology. 2005;128(Pt 3):678-87.
293. Pöpperl G, Götz C, Rachinger W, Schnell O, Gildehaus FJ, Tonn JC, et al. Serial O-(2-[18F]fluoroethyl)-L-tyrosine PET for monitoring the effects of intracavitary radioimmunotherapy in patients with malignant glioma. European journal of nuclear medicine and molecular imaging. 2006;33(7):792-800.
294. Bashir A, Mathilde Jacobsen S, Mølby Henriksen O, Broholm H, Urup T, Grunnet K, et al. Recurrent glioblastoma versus late posttreatment changes: diagnostic accuracy of O-(2-[18F]fluoroethyl)-L-tyrosine positron emission tomography (18F-FET PET). Neuro-Oncology. 2019;21(12):1595-606.
295. Hutterer M, Nowosielski M, Putzer D, Jansen NL, Seiz M, Schocke M, et al. 18F]-fluoro-ethyl-L-tyrosine PET: a valuable diagnostic tool in neuro-oncology, but not all that glitters is glioma. Neuro-oncology. 2013;15(3):341-51.
296. Ellingson BM, Sanvito F, Cloughesy TF, Huang RY, Villanueva-Meyer JE, Pope WB, et al. A Neuroradiologist's Guide to Operationalizing the Response Assessment in Neuro-Oncology (RANO) Criteria Version 2.0 for Gliomas in Adults. AJNR Am J Neuroradiol. 2024;45(12):1846-56.
297. Oken MM, Creech RH, Tormey DC, Horton J, Davis TE, McFadden ET, et al. Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. American journal of clinical oncology. 1982;5(6):649-55.
298. Schag CC, Heinrich RL, Ganz PA. Karnofsky performance status revisited: reliability, validity, and guidelines. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology. 1984;2(3):187-93.

5. Metode

DNOG's retningslinje for behandling af intrakranielle gliomer hos voksne er godkendt af bestyrelsen for DNOG. Retningslinjen er fortrinsvis en adaptation af EANO-retningslinjen for gliom, suppleret med en systematisk litteratursøgning, med tilpasning til danske forhold og konsensus imellem de fire centre der behandler hjernetumorer i Danmark.

Litteratursøgning

Primært baseret på litteratur angivet i den europæiske retningslinje – EANO 2021 gliom, ependymom og palliation. Hertil er der lavet systematisk litteratursøgning, samt gjort anvendelse af kendt litteratur (bilag1).

Litteraturgennemgang

Der henvises til EANO 2021 retningslinje for gliom, ependymom og palliation. Vi har valgt at adaptere EANOs gennemgang af litteraturen, som ligger til grund for ovenstående anbefalinger. Herudover er der lavet litteraturgennemgang (bilag 1), hvor relevante studier er evidensgraderede efter "The Oxford 2009 Levels of Evidence". Referencer er angivet med () efterfulgt af evidensniveau 1-5 med [], der ligger til grund for anbefalingens styrke A-D angivet med () efter hver anbefaling.

Formulering af anbefalinger

Primært adapteret fra EANO 2021 retningslinjer. Formuleringer er afvejet i forhold til evidens efter drøftelse i DNOG.

Interessentinvolvering

Retningslinjerne er udarbejdet uden involvering af 3. part.

Høring

Der er ikke planlagt høring.

Godkendelse

Faglig godkendelse:

Retningslinjen er i forhold til klinisk praksis og kvalitetsindikatorer løbende diskuteret i DNOG. Baseret på dette har retningslinjegruppen i DNOG lavet litteraturgennemgang og drøftet ændringer med den øvrige bestyrelse. Anbefalingerne er gennemgået og godkendt af DNOG. Retningslinjen har ikke været i høring hos 3. part. Retningslinjen er tilsidst godkendt af DNOG og Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet.

Administrativ godkendelse:

16. december 2024

Anbefalinger, der udløser betydelig merudgift

Ingen noteret.

Behov for yderligere forskning

Generelt er prognosen alvorlig for patienter med hjernetumor, hvorfor der især er behov for forskning i nye behandlingsmuligheder, der forbedrer overlevelsen. Patienterne lider ofte under forringelse af arbejdsevne, samt kognitive og sociale færdigheder. Tilsvarende er det et meget ressourcetungt område med betydelige behandlingsudgifter omfattende komplikerede hjerneoperationer, avanceret strålebehandling og dyr medicin; men også betydelige omkostninger til rehabilitering og i andre tilfælde tunge plejekrævende forløb.

Samfundsmæssigt er der derfor også gode perspektiver i at holde et stort forskningsmæssigt fokus på disse områder.

Forfattere

Ved hver revision er der foretaget opdateret litteraturgennemgang af repræsentanter fra DNOG's aktuelle bestyrelse sammen med de relevante faggrupper. Arbejdsgruppen for 2024 gliomretningslinjen har været Anders Rosendal Korshøj, Charlotte Haslund, David Scheie, Emilie Lund Larsen, Rikke Beese Dalby, Christian Bonde Pedersen og Steinbjørn Hansen.

For Radiologi-kapitlet har der været litteraturgennemgang og primær revision ved Rikke Beese Dalby, som efterfølgende er gennemgået i billeddiagnostikgruppen sammen med Ian Law og Vibeke André Larsen.

For Kirurgi-kapitlet har der været litteraturgennemgang og primær revision ved Anders Rosendal Korshøj, som efterfølgende er gennemgået i kirurgigruppen sammen med Kåre Schmidt Ettrup, Christian Bonde Pedersen, og Jane Skjøth-Rasmussen.

For Patologi-kapitlet har der været litteraturgennemgang og primær revision ved David Scheie, som efterfølgende er gennemgået i patologigruppen sammen med Benedicte Parm Ulhøi, Jeanette Krogh Petersen, og Marianne Schmidt Ettrup.

For Onkologi-kapitlet har der været litteraturgennemgang og primær revision ved Charlotte Haslund, som efterfølgende er gennemgået i onkologiudvalget sammen med Slavka Lukacova, Steinbjørn Hansen, Benedikte Hasselbalch, Aida Muhic og Rikke Hedegaard Dahlrot.

For øvrige kapitler har der været litteraturgennemgang ved Emilie Lund Larsen, men der er besluttet ikke at lave revision af dem i denne udgave.

Retningslinjen er tilsidst gennemgået og godkendt af bestyrelsen for DNOG. [LINK til DNOGs bestyrelse.](#)

Ingen forfattere har anmeldt interesseinvolvering i forhold til anbefalinger i denne retningslinje. For detaljerede samarbejdsrelationer henvises til Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/sundhedspersoners-tilknytning-til-virksomheder/lister-over-tilknytning-til-virksomheder/apotekere,-laeger,-sygeplejersker-og-tandlaeger

Plan for opdatering

Der opdateres som anført på forsiden. Formanden igangsætter processen. Behov for ændret faglig praksis diskuteres løbende i bestyrelsen og kan tilføjes retningslinjen før planlagte opdatering.

Version af retningslinjeskabelon

Retningslinjen er udarbejdet i version 9.3 af skabelonen.

6. Monitorering

Udvikling af kvaliteten på dette område understøttes af viden fra DNOG i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), idet indikatorerne i databasen skal belyse relevante kliniske retningslinjer.

Den kliniske kvalitetsdatabases styregruppe har mandatet til at beslutte databasens indiktorsæt, herunder hvilke specifikke processer og resultater der monitoreres i databasen.

Standarder og indikatorer

Med afsæt i retningslinjen er der udarbejdet kliniske kvalitetsindikatorer, der monitoreres i regi af Dansk Neuro-Onkologisk Register (DNOR).

Plan for audit og feedback

Styregruppen for DNOR holder årligt audit, og resultaterne fra DNOR drøftes løbende i bestyrelsen for DNOG.

7. Bilag

Bilag 1 – Søgestrategi

Primært baseret på litteratur angivet i den europæiske retningslinje EANO 2021 gliom, ependymom og palliation: <https://www.eano.eu/publications/eano-guidelines/>

Hertil er der lavet systematisk litteratsøgning, samt gjort anvendelse af kendt litteratur.

Søgestreng - Radiologi:

((glioblastoma) OR (gliomas)) AND ((recommendation OR recommendations OR consensus OR systematic reviews OR systematic review OR guidelines OR guideline OR meta analysis) AND (MRI OR Magnetic Resonance Imaging OR "Magnetic Resonance Imaging"[Mesh] OR Neuroimaging OR "Neuroimaging"[Mesh]))
Filters: from 2010/1/1

Søgestreng - PET:

(Positron-Emission Tomography) AND (((glioblastoma) OR (gliomas)) AND ((recommendation OR recommendations OR consensus OR systematic reviews OR systematic review OR guidelines OR guideline OR meta analysis) AND (MRI OR Magnetic Resonance Imaging OR "Magnetic Resonance Imaging"[Mesh] OR Neuroimaging OR "Neuroimaging"[Mesh])))

Søgestreng – Steroid:

((glioma OR glioblastoma OR brain tumor OR brain tumour OR cerebral metastases) AND (oedema OR edema) AND (steroid OR steroids OR dexamethasone OR glucocorticoid OR corticosteroids OR prednisolone)) AND (recommendation OR recommendations OR consensus OR review OR reviews OR systematic reviews OR systematic review OR guidelines OR guideline OR meta analysis)

Søgestreng – Epilepsi:

((glioma OR astrocytoma OR brain tumor OR brain tumour) AND (epilepsy)) AND (recommendation OR recommendations OR consensus OR review OR reviews OR systematic reviews OR systematic review OR guidelines OR guideline OR meta analysis)

Date 2010-01-01 to 2020-01-06

Søgestreng – Kørekort:

((glioma OR brain tumor OR brain tumour) AND (automobile OR fitness to drive)) AND (consensus OR guideline OR guidelines OR recommendations OR recommendation)

Date 2010-01-01 to 2020-06-01

Søgestreng – Onkologi:

A – Lav-grads gliom

| Database | Interface | Resultat | Dato |
|------------------|------------|------------|------------|
| PubMed | PubMed.gov | 92 | 02.05.2024 |
| Embase | Embase.com | 323 | 02.05.2024 |
| Cochrane Library | Wiley | 335 | 02.05.2024 |
| I alt | | 750 | 02.05.2024 |

PubMed

| Search number | Search Details | Results |
|---------------|--|---------|
| 5 | (("Glioma"[MeSH Terms] OR "glioma*"[Text Word] OR "astrocytoma*"[Text Word] OR "oligodendrogloma*"[Text Word] OR "ganglioglioma*"[Text Word] OR "oligoastrocytoma*"[Text Word] OR "xanthoastrocytoma*"[Text Word] OR "astroblastoma*"[Text Word]) AND ("Radiotherapy"[MeSH Terms] OR ("radiotherap*"[Text Word] OR "radiosurg*"[Text Word]) OR ("radiat*"[Text Word] OR "irradiat*"[Text Word]) OR "Radiotherapy"[MeSH Subheading] OR ("Antineoplastic Agents"[MeSH Terms] OR "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols"[MeSH Terms] OR ("temozolomide"[Text Word] OR "TMZ"[Text Word] OR "Temodal"[Text Word] OR "Temedar"[Text Word] OR "Temodal"[Text Word] OR "temcad*"[Text Word] OR "chemotherap*"[Text Word] OR "procarbazine"[Text Word] OR "Lomustine"[Text Word] OR "CCNU"[Text Word] OR "vincristine"[Text Word] OR "PCV"[Text Word] OR "cisplatinum"[Text Word] OR "carboplatinum"[Text Word]) OR "Chemoradiotherapy"[MeSH Terms] OR ("radiochemo*"[Text Word] OR "chemoradio*"[Text Word]) OR "Immunotherapy"[MeSH Terms] OR "immunotherap*"[Text Word] OR "Steroids"[MeSH Terms] OR ("dexamethasone"[Text Word] OR "prednisolone"[Text Word] OR "methylprednisolone"[Text Word]) OR ("idh mutant*"[Text Word] OR "isocitrate dehydrogenase mutant*"[Text Word]) OR ("idh wildtype*"[Text Word] OR "isocitrate dehydrogenase wildtype*"[Text Word]) OR "chemotherap*"[Text Word] OR "nitrosoureas"[Text Word] OR "Bevacizumab"[Text Word] OR ("VEGF"[Text Word] OR "vascular endothelial growth factor*"[Text Word]) OR ("avastin"[Text Word] OR "antiangiogenic"[Text Word] OR "anti-angiogenic"[Text Word]) OR (("angiogenesis"[Text Word] AND "inhibit*"[Text Word])) OR "vorasidenib"[Supplementary Concept] OR "vorasidenib"[Text Word])) AND ("Controlled Clinical Trial"[Publication Type] OR "Controlled Clinical Trials as Topic"[MeSH Terms]) AND (2022/01/01:3000/12/31[Date - | 92 |

| | | |
|---|--|-----------|
| | Publication] AND ("English"[Language] OR "danish"[Language] OR "norwegian"[Language] OR "swedish"[Language])) | |
| 4 | 2022/01/01:3000/12/31[Date - Publication] AND ("English"[Language] OR "danish"[Language] OR "norwegian"[Language] OR "swedish"[Language])) | 3,699,197 |
| 3 | ("Glioma"[MeSH Terms] OR "glioma*"[Text Word] OR "astrocytoma*"[Text Word] OR "oligodendrogloma*"[Text Word] OR "ganglioglioma*"[Text Word] OR "oligoastrocytoma*"[Text Word] OR "xanthoastrocytoma*"[Text Word] OR "astroblastoma*"[Text Word]) AND ("Radiotherapy"[MeSH Terms] OR ("radiotherap*"[Text Word] OR "radiosurg*"[Text Word]) OR ("radiat*"[Text Word] OR "irradiat*"[Text Word]) OR "Radiotherapy"[MeSH Subheading] OR ("Antineoplastic Agents"[MeSH Terms] OR "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols"[MeSH Terms] OR ("temozolomide"[Text Word] OR "TMZ"[Text Word] OR "Temodal"[Text Word] OR "Temedar"[Text Word] OR "Temodal"[Text Word] OR "temcad*"[Text Word] OR "chemotherap*"[Text Word] OR "procarbazine"[Text Word] OR "Lomustine"[Text Word] OR "CCNU"[Text Word] OR "vincristine"[Text Word] OR "PCV"[Text Word] OR "cisplatinum"[Text Word] OR "carboplatinum"[Text Word]) OR "Chemoradiotherapy"[MeSH Terms] OR ("radiochemo*"[Text Word] OR "chemoradio*"[Text Word]) OR "Immunotherapy"[MeSH Terms] OR "immunotherap*"[Text Word] OR "Steroids"[MeSH Terms] OR ("dexamethasone"[Text Word] OR "prednisolone"[Text Word] OR "methylprednisolone"[Text Word]) OR ("idh mutant*"[Text Word] OR "isocitrate dehydrogenase mutant*"[Text Word] OR ("idh wildtype*"[Text Word] OR "isocitrate dehydrogenase wildtype*"[Text Word]) OR "chemotherap*"[Text Word] OR "nitrosoureas"[Text Word] OR "Bevacizumab"[Text Word] OR ("VEGF"[Text Word] OR "vascular endothelial growth factor*"[Text Word]) OR ("avastin"[Text Word] OR "antiangiogenic"[Text Word] OR "anti-angiogenic"[Text Word]) OR ("angiogenesis"[Text Word] AND "inhibit*"[Text Word]) OR "vorasidenib"[Supplementary Concept] OR "vorasidenib"[Text Word])) AND ("Controlled Clinical Trial"[Publication Type] OR "Controlled Clinical Trials as Topic"[MeSH Terms]) | 1,069 |
| 2 | "Controlled Clinical Trial"[Publication Type] OR "Controlled Clinical Trials as Topic"[MeSH Terms] | 874,494 |
| 1 | ("Glioma"[MeSH Terms] OR "glioma*"[Text Word] OR "astrocytoma*"[Text Word] OR "oligodendrogloma*"[Text Word] OR "ganglioglioma*"[Text Word] OR "oligoastrocytoma*"[Text Word] OR "xanthoastrocytoma*"[Text Word] OR "astroblastoma*"[Text Word]) AND ("Radiotherapy"[MeSH Terms] OR ("radiotherap*"[Text Word] OR "radiosurg*"[Text Word]) OR ("radiat*"[Text Word] OR "irradiat*"[Text Word]) OR "Radiotherapy"[MeSH Subheading] OR ("Antineoplastic Agents"[MeSH Terms] OR "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols"[MeSH Terms] OR ("temozolomide"[Text Word] OR "TMZ"[Text Word] OR "Temodal"[Text Word] OR "Temedar"[Text Word] OR "Temodal"[Text Word] OR "temcad*"[Text Word] OR "chemotherap*"[Text Word] OR "procarbazine"[Text Word] OR "Lomustine"[Text Word] OR "CCNU"[Text Word] OR "vincristine"[Text Word] OR "PCV"[Text Word] OR "cisplatinum"[Text Word] OR "carboplatinum"[Text Word]) OR "Chemoradiotherapy"[MeSH Terms] OR ("radiochemo*"[Text Word] OR "chemoradio*"[Text Word]) OR "Immunotherapy"[MeSH Terms] OR "immunotherap*"[Text Word] OR "Steroids"[MeSH Terms] OR ("dexamethasone"[Text Word] OR "prednisolone"[Text Word] OR "methylprednisolone"[Text Word]) OR ("idh mutant*"[Text Word] OR "isocitrate dehydrogenase mutant*"[Text Word] OR ("idh wildtype*"[Text Word] OR "isocitrate dehydrogenase wildtype*"[Text Word]) OR "chemotherap*"[Text Word] OR "nitrosoureas"[Text Word] OR "Bevacizumab"[Text Word] OR ("VEGF"[Text Word] OR "vascular endothelial growth factor*"[Text Word]) OR ("avastin"[Text Word] OR "antiangiogenic"[Text Word] OR "anti-angiogenic"[Text Word]) OR ("angiogenesis"[Text Word] AND "inhibit*"[Text Word]) OR "vorasidenib"[Supplementary Concept] OR "vorasidenib"[Text Word])) | 47,869 |

| | | |
|--|---|--|
| | "temcad*"[Text Word] OR "chemotherap*"[Text Word] OR "procarbazine"[Text Word] OR "Lomustine"[Text Word] OR "CCNU"[Text Word] OR "vincristine"[Text Word] OR "PCV"[Text Word] OR "cisplatinum"[Text Word] OR "carboplatinum"[Text Word]) OR "Chemoradiotherapy"[MeSH Terms] OR ("radiochemo*"[Text Word] OR "chemoradio*"[Text Word]) OR "Immunotherapy"[MeSH Terms] OR "immunotherap*"[Text Word] OR "Steroids"[MeSH Terms] OR ("dexamethasone"[Text Word] OR "prednisolone"[Text Word] OR "methylprednisolone"[Text Word]) OR ("idh mutant*"[Text Word] OR "isocitrate dehydrogenase mutant*"[Text Word]) OR ("idh wildtype*"[Text Word] OR "isocitrate dehydrogenase wildtype*"[Text Word]) OR "chemotherap*"[Text Word] OR "nitrosoureas"[Text Word] OR "Bevacizumab"[Text Word] OR ("VEGF"[Text Word] OR "vascular endothelial growth factor*"[Text Word]) OR ("avastin"[Text Word] OR "antiangiogenic"[Text Word] OR "anti-angiogenic"[Text Word]) OR ("angiogenesis"[Text Word] AND "inhibit*"[Text Word]) OR "vorasidenib"[Supplementary Concept] OR "vorasidenib"[Text Word])) | |
|--|---|--|

Embase

| No. | Query | Results |
|-----|--|---------|
| #31 | #30 AND [2022-2024]/py AND ([danish]/lim OR [english]/lim OR [norwegian]/lim OR [swedish]/lim) | 323 |
| #30 | #28 AND #29 | 2775 |
| #29 | 'controlled clinical trial'/exp OR 'randomized controlled trial'/exp | 100288 |
| #28 | #3 AND #27 | 8 |
| #27 | #8 OR #26 | 115015 |
| #26 | #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 | 646550 |
| #25 | angiogenesis AND inhibit* | 2 |
| #24 | avastin OR antiangiogenic OR 'anti angiogenic' OR 'vorasidenib'/exp OR vorasidenib | 396555 |
| #23 | vegf OR 'vascular endothelial growth factor*' | 3 |
| #22 | bevacizumab | 123175 |
| #21 | nitrosoureas | 59328 |
| #20 | chemotherap* | 1141 |
| #19 | 'idh wild type*' OR 'isocitrate dehydrogenase wild type*' | 960752 |
| #18 | 'idh wildtype*' OR 'isocitrate dehydrogenase wildtype*' | 618 |
| #17 | 'idh mutant*' OR 'isocitrate dehydrogenase mutant*' | 417 |
| #16 | dexamethasone OR prednisolone OR methylprednisolone | 967 |
| | | 373200 |

| | | |
|-----|---|-------------|
| #15 | 'steroid'/exp | 161920 5 |
| #14 | immunotherap* | 226133 |
| #13 | 'immunotherapy'/exp | 217402 |
| #12 | radiochemo* OR chemoradio* | 66446 |
| #11 | 'chemoradiotherapy'/exp | 52082 |
| #10 | temozolomide OR tmz OR temodar OR temodal OR temcad* OR chemotherap* OR procarbazine OR lomustine OR ccnu OR vincristine OR pcv OR cisplatinum OR carboplatinum | 102376 3 |
| #9 | 'antineoplastic agent'/exp | 233797 8 |
| #8 | #4 OR #5 OR #6 OR #7 | 152484 4 |
| #7 | radiotherapy:lnk | 340145 |
| #6 | radiat* OR irradiat* | 122178 4 |
| #5 | radiotherap* OR radiosurg* | 637442 |
| #4 | 'radiotherapy'/exp | 564335 |
| #3 | #1 OR #2 | 159862 |
| #2 | glioma* OR astrocytoma* OR oligodendrogloma* OR ganglioglioma* OR oligoastrocytoma* OR xanthoastrocytoma* OR astroblastoma* | 118695 |
| #1 | 'glioma'/exp | 138112 |

Cochrane

| Search | Hits | |
|--------|--|-------|
| #1 | MeSH descriptor: [Glioma] explode all trees | 2072 |
| #2 | (glioma* OR astrocytoma* OR oligodendrogloma* OR ganglioglioma* OR oligoastrocytoma* OR xanthoastrocytoma* OR astroblastoma*):ti,ab,kw | 2533 |
| #3 | #1 OR #2 | 3435 |
| #4 | MeSH descriptor: [Radiotherapy] explode all trees | 10011 |
| #5 | MeSH descriptor: [] explode all trees and with qualifier(s): [radiotherapy - RT] | 12364 |
| #6 | (radiotherap* OR radiosurg*):ti,ab,kw | 42325 |
| #7 | (radiat* OR irradiat*):ti,ab,kw | 42634 |
| #8 | (284-#7) | 64783 |
| #9 | MeSH descriptor: [Antineoplastic Agents] explode all trees | 19592 |
| #10 | MeSH descriptor: [Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols] explode all trees | 21656 |

| | | |
|-----|---|--------|
| #11 | (temozolomide OR tmz OR temodar OR temodal OR temcad* OR chemotherap* OR procarbazine OR lomustine OR ccnu OR vincristine OR pcv OR cisplatin OR carboplatinum):ti,ab,kw | 100010 |
| #12 | MeSH descriptor: [Chemoradiotherapy] explode all trees | 2116 |
| #13 | (radiochemo* OR chemoradio*):ti,ab,kw | 9666 |
| #14 | MeSH descriptor: [Immunotherapy] explode all trees | 12102 |
| #15 | (immunotherap*):ti,ab,kw | 14201 |
| #16 | MeSH descriptor: [Steroids] explode all trees | 76124 |
| #17 | (dexamethasone OR prednisolone OR methylprednisolone):ti,ab,kw | 27935 |
| #18 | (isocitrate dehydrogenase wild type OR isocitrate dehydrogenase wild types):ti,ab,kw | 28 |
| #19 | (isocitrate dehydrogenase wildtype OR isocitrate dehydrogenase wildtypes):ti,ab,kw | 37 |
| #20 | (idh NEXT (mutant* OR wildtype* OR wild type OR wild types)):ti,ab,kw | 92 |
| #21 | (chemotherap* OR nitrosoureas):ti,ab,kw | 96596 |
| #22 | (bevacizumab OR vegf OR (vascular endothelial growth NEXT factor*) OR avastin OR vorasidenib OR antiangiogenic OR anti NEXT angiogenic OR (angiogenesis AND inhibit*) OR irinotecan):ti,ab,kw | 18819 |
| #23 | (285-#22) | 220230 |
| #24 | #8 OR #23 | 256764 |
| #25 | #3 AND #24 with Cochrane Library publication date Between Jan 2022 and Dec 2024, in Cochrane Reviews, Trials | 335 |

B – Anaplastisk oligodendrogliom

| Database | Interface | Resultat | Dato |
|------------------|------------|-----------|------------|
| PubMed | PubMed.gov | 3 | 02.05.2024 |
| Embase | Embase.com | 14 | 02.05.2024 |
| Cochrane Library | Wiley | 15 | 02.05.2024 |
| I alt | | 32 | |

PubMed

| Search number | Search Details | Results |
|---------------|---|---------|
| 4 | (("Oligodendroglioma"[MeSH Terms] OR ("oligodendroglioma*"[Text Word] OR "oligoastrocytoma*"[Text Word])) AND (((("drug therapy"[MeSH Subheading] OR "Antineoplastic Agents"[MeSH Terms] OR "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols"[MeSH Terms] OR "chemotherap*"[Text Word] OR ("idh mutant*"[Text Word] OR "isocitrate dehydrogenase mutant*"[Text Word]) OR ("idh wildtype*"[Text Word] OR "isocitrate dehydrogenase wildtype*"[Text Word] OR "idh wild type*"[Text Word] OR "isocitrate dehydrogenase wild type*"[Text Word]) OR "antineoplastic agent*"[Text Word] OR "Immunotherapy"[MeSH Terms] OR "Chemoradiotherapy"[MeSH Terms] OR ("immunotherap*"[Text Word] OR "radiochemo*"[Text Word] OR "chemoradio*"[Text Word]) OR ("temozolomide"[Text Word] OR "nitrosoureas"[Text Word] OR "procarbazine"[Text Word] OR "lomustine"[Text Word] OR "vincristine"[Text Word] OR "PCV"[Text Word] OR "cisplatinum"[Text Word] OR "carboplatinum"[Text Word]) OR "Bevacizumab"[Text Word] OR "Steroids"[MeSH Terms] OR "steroid*"[Text Word])) AND ("Radiotherapy"[MeSH Subheading] OR "Radiotherapy"[MeSH Terms] OR ("radiotherap*"[Text Word] OR "radiat*"[Text Word] OR "irradiat*"[Text Word]))) OR ("Combined Modality Therapy"[MeSH Terms] OR "combined modality therap*"[Text Word] OR "multimodal treatment*"[Text Word]) OR ("chromosomes, human, pair 1"[MeSH Terms] OR "chromosomes, human, pair 19"[MeSH Terms] OR ("chromosome 1"[Text Word] OR "chromosome 19"[Text Word]) OR "DNA Mutational Analysis"[MeSH Terms] OR "Genotype"[MeSH Terms] OR "Loss of Heterozygosity"[MeSH Terms] OR "Loss of Heterozygosity"[Text Word] OR "Genetic Markers"[MeSH Terms] OR "genetic marker*"[Text Word])) AND ("Controlled Clinical Trial"[Publication Type] OR "Controlled Clinical Trials as Topic"[MeSH Terms]) AND (2022/01/01:3000/12/31[Date - Publication] AND | 3 |

| | | |
|---|---|-----------|
| | ("English"[Language] OR "danish"[Language] OR "norwegian"[Language] OR "swedish"[Language])) | |
| 3 | 2022/01/01:3000/12/31[Date - Publication] AND ("English"[Language] OR "danish"[Language] OR "norwegian"[Language] OR "swedish"[Language])) | 3,699,197 |
| 2 | "Controlled Clinical Trial"[Publication Type] OR "Controlled Clinical Trials as Topic"[MeSH Terms] | 874,494 |
| 1 | ("Oligodendrogloma"[MeSH Terms] OR ("oligodendrogloma*"[Text Word] OR "oligoastrocytoma*"[Text Word])) AND (((("drug therapy"[MeSH Subheading] OR "Antineoplastic Agents"[MeSH Terms] OR "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols"[MeSH Terms] OR "chemotherap*"[Text Word] OR ("idh mutant*"[Text Word] OR "isocitrate dehydrogenase mutant*"[Text Word]) OR ("idh wildtype*"[Text Word] OR "isocitrate dehydrogenase wildtype*"[Text Word] OR "idh wild type*"[Text Word] OR "isocitrate dehydrogenase wild type*"[Text Word])) OR "antineoplastic agent*"[Text Word] OR "Immunotherapy"[MeSH Terms] OR "Chemoradiotherapy"[MeSH Terms] OR ("immunotherap*"[Text Word] OR "radiochemo*"[Text Word] OR "chemoradio*"[Text Word]) OR ("temozolomide"[Text Word] OR "nitrosoureas"[Text Word] OR "procarbazine"[Text Word] OR "lomustine"[Text Word] OR "vincristine"[Text Word] OR "PCV"[Text Word] OR "cisplatinum"[Text Word] OR "carboplatinum"[Text Word]) OR "Bevacizumab"[Text Word] OR "Steroids"[MeSH Terms] OR "steroid*"[Text Word])) AND ("Radiotherapy"[MeSH Subheading] OR "Radiotherapy"[MeSH Terms] OR ("radiotherap*"[Text Word] OR "radiat*"[Text Word] OR "irradiat*"[Text Word]))) OR ("Combined Modality Therapy"[MeSH Terms] OR "combined modality therap*"[Text Word] OR "multimodal treatment*"[Text Word]) OR ("chromosomes, human, pair 1"[MeSH Terms] OR "chromosomes, human, pair 19"[MeSH Terms] OR ("chromosome 1"[Text Word] OR "chromosome 19"[Text Word]) OR "DNA Mutational Analysis"[MeSH Terms] OR "Genotype"[MeSH Terms] OR "Loss of Heterozygosity"[MeSH Terms] OR "Loss of Heterozygosity"[Text Word] OR "Genetic Markers"[MeSH Terms] OR "genetic marker*"[Text Word])) | 1,754 |

Embase

| No. | Query | Results |
|-----|--|---------|
| #42 | #40 AND [2022-2024]/py AND ([danish]/lim OR [english]/lim OR [norwegian]/lim OR [swedish]/lim) | 14 |
| #41 | #40 AND ('Article'/it OR 'Article in Press'/it OR 'Review'/it) | 1032 |
| #40 | #38 AND #39 | 150 |
| #39 | 'controlled clinical trial'/exp OR 'randomized controlled trial'/exp | 1003293 |
| #38 | #3 AND #37 | 4118 |
| #37 | #26 OR #36 | 1389858 |
| #36 | #27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 OR #35 | 688852 |

| | | |
|-----|--|---------|
| #35 | 'genetic marker*' OR 'genetic marker'/exp | 95869 |
| #34 | 'heterozygosity loss' | 130493 |
| #33 | 'heterozygosity loss'/de | 17206 |
| #32 | 'chromosome 1' OR 'chromosome 19' | 17190 |
| #31 | 'genotype'/exp | 543138 |
| #30 | 'dna mutational analysis'/de | 2126 |
| #29 | 'chromosome 19'/de | 19530 |
| #28 | 'chromosome 1'/de | 4642 |
| #27 | #21 OR #25 | 8773 |
| #26 | #22 OR #23 OR #24 | 708140 |
| #25 | 'multimodal treatment*' OR 'combined modality therap*' OR 'multimodality cancer therapy'/de | 82396 |
| #24 | 'radiotherap*' OR 'radiat*' OR 'irradiat*' OR 'radiotherapy'/exp | 7817 |
| #23 | 'radiotherapy':lnk | 4059 |
| #22 | #16 AND #20 | 73892 |
| #21 | #17 OR #18 OR #19 | 659392 |
| #20 | #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 | 1521321 |
| #19 | temozolomide OR nitrosoureas OR procarbazine OR lomustine OR vincristine OR pcv OR cisplatin OR carboplatin OR bevacizumab | 1503153 |
| #18 | 'immunotherap*' OR 'radiochemotherap*' OR 'chemoradiotherap*' OR 'chemotherapy'/exp | 564526 |
| #17 | 'immunotherapy':lnk | 340260 |
| #16 | #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 | 6389426 |
| #15 | 'steroid*' OR 'steroid':exp | 459793 |
| #14 | 'idh wildtype*' OR 'isocitrate dehydrogenase wildtype*' OR 'idh wild-type*' OR 'isocitrate dehydrogenase wild-type*' OR 'idh mutant*' OR 'isocitrate dehydrogenase mutant*' OR 'idh':exp | 1619587 |
| #13 | 'antineoplastic agent*' OR 'drug therapy':lnk | 206188 |
| #12 | 'chemoradiotherapy'/exp | 290092 |
| #11 | 'chemotherapy'/exp | 52107 |
| #10 | 'immunotherapy'/exp | 217537 |
| #9 | 'oligodendrogloma*' OR 'oligoastrocytoma*' OR 'oligodendrogloma'/de | 310469 |
| #8 | 'oligodendrogloma':lnk | 1010 |
| #7 | 'oligoastrocytoma':lnk | 968 |
| #6 | 'oligodendrogloma':exp | 961113 |
| #5 | 'oligodendrogloma':exp | 2338772 |
| #4 | 'oligodendrogloma':lnk | 3938308 |
| #3 | #1 OR #2 | 10356 |
| #2 | #3 OR #4 | 10356 |
| #1 | #5 OR #6 | 8508 |

Cochrane

| ID | Search | Hits |
|----|--------|------|
| | | |

| | | |
|-----|---|--------|
| #1 | MeSH descriptor: [Oligodendrogloma] explode all trees | 86 |
| #2 | (oligodendrogloma* OR oligoastrocytoma*):ti,ab,kw | 251 |
| #3 | #1 or #2 | 251 |
| #4 | MeSH descriptor: [] explode all trees and with qualifier(s): [drug therapy - DT] | 284702 |
| #5 | MeSH descriptor: [Antineoplastic Agents] explode all trees | 19592 |
| #6 | (chemotherap*):ti,ab,kw | 96579 |
| #7 | (idh NEXT (mutant* OR wildtype* OR wild type OR wild types)):ti,ab,kw | 92 |
| #8 | (isocitrate dehydrogenase wildtype OR isocitrate dehydrogenase wildtypes):ti,ab,kw | 37 |
| #9 | (isocitrate dehydrogenase wild type OR isocitrate dehydrogenase wild types):ti,ab,kw | 28 |
| #10 | (antineoplastic NEXT agent*):ti,ab,kw | 16012 |
| #11 | MeSH descriptor: [Immunotherapy] explode all trees | 12102 |
| #12 | MeSH descriptor: [Chemoradiotherapy] explode all trees | 2116 |
| #13 | (immunotherap* OR radiochemotherap* OR chemoradiotherap*):ti,ab,kw | 23338 |
| #14 | (temozolomide OR nitrosoureas OR procarbazine OR lomustine OR vincristine OR pcv OR cisplatinum OR carboplatinum OR bevacizumab):ti,ab,kw | 16023 |
| #15 | MeSH descriptor: [Steroids] explode all trees | 76124 |
| #16 | (steroid*):ti,ab,kw | 37892 |
| #17 | (284-#16) | 436901 |
| #18 | MeSH descriptor: [] explode all trees and with qualifier(s): [radiotherapy - RT] | 12364 |
| #19 | MeSH descriptor: [Radiotherapy] explode all trees | 10011 |
| #20 | (radiotherap* OR radiat* OR irradiat*):ti,ab,kw | 64240 |
| #21 | (286-#20) | 64634 |
| #22 | #17 AND #21 | 30466 |
| #23 | MeSH descriptor: [Combined Modality Therapy] explode all trees | 30856 |
| #24 | (combined modality NEXT therap*):ti,ab,kw | 20320 |
| #25 | (multimodal NEXT treatment*):ti,ab,kw | 588 |
| #26 | (287-#25) | 31906 |

| | | |
|-----|---|-------|
| #27 | #22 OR #26 | 54641 |
| #28 | MeSH descriptor: [Chromosomes, Human, Pair 1] explode all trees | 27 |
| #29 | MeSH descriptor: [Chromosomes, Human, Pair 19] explode all trees | 23 |
| #30 | (chromosome 1 OR chromosome 19):ti,ab,kw | 1890 |
| #31 | MeSH descriptor: [DNA Mutational Analysis] explode all trees | 311 |
| #32 | MeSH descriptor: [Genotype] explode all trees | 6739 |
| #33 | MeSH descriptor: [Loss of Heterozygosity] explode all trees | 126 |
| #34 | loss of heterozygosity | 232 |
| #35 | MeSH descriptor: [Genetic Markers] explode all trees | 391 |
| #36 | (genetic NEXT marker*):ti,ab,kw | 2562 |
| #37 | (288-#36) | 11166 |
| #38 | #27 OR #37 | 65404 |
| #39 | #3 AND #38 with Cochrane Library publication date Between Jan 2022 and Dec 2024, in Cochrane Reviews and Trials | 15 |

C – Anaplastisk astrocytoma

| Database | Interface | Resultat | Dato |
|------------------|------------|------------|------------|
| PubMed | PubMed.gov | 38 | 06.05.2024 |
| Embase | Embase.com | 148 | 06.05.2024 |
| Cochrane Library | Wiley | 79 | 06.05.2024 |
| I alt | | 265 | |

PubMed

| Search number | Search Details | Results |
|---------------|--|---------|
| 4 | <p>("Astrocytoma"[MeSH Terms] OR ("astrocytoma*"[Text Word] OR "oligoastrocytoma*"[Text Word])) AND (((("drug therapy"[MeSH Subheading] OR "Antineoplastic Agents"[MeSH Terms] OR "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols"[MeSH Terms] OR "chemotherap*"[Text Word] OR ("idh mutant*"[Text Word] OR "isocitrate dehydrogenase mutant*"[Text Word]) OR ("idh wildtype*"[Text Word] OR "isocitrate dehydrogenase wildtype*"[Text Word] OR "idh wild type*"[Text Word] OR "isocitrate dehydrogenase wild type*"[Text Word]) OR "antineoplastic agent*"[Text Word] OR "Immunotherapy"[MeSH Terms] OR "Chemoradiotherapy"[MeSH Terms] OR ("immunotherap*"[Text Word] OR "radiochemo*"[Text Word] OR "chemoradio*"[Text Word]) OR ("temozolomide"[Text Word] OR "nitrosoureas"[Text Word] OR "procarbazine"[Text Word] OR "lomustine"[Text Word] OR "vincristine"[Text Word] OR "PCV"[Text Word] OR "cisplatinum"[Text Word] OR "carboplatinum"[Text Word]) OR "Bevacizumab"[Text Word] OR "Steroids"[MeSH Terms] OR "steroid*"[Text Word] OR ("VEGF"[Text Word] OR "vascular endothelial growth factor*"[Text Word]) OR ("avastin"[Text Word] OR "antiangiogenic"[Text Word] OR "anti-angiogenic"[Text Word]) OR ("angiogenesis"[Text Word] AND "inhibit*"[Text Word])) AND ("Radiotherapy"[MeSH Subheading] OR "Radiotherapy"[MeSH Terms] OR ("radiotherap*"[Text Word] OR "radiat*"[Text Word] OR "irradiat*"[Text Word]))) OR ("Combined Modality Therapy"[MeSH Terms] OR "combined modality therap*"[Text Word] OR "multimodal treatment*"[Text Word]) OR ("chromosomes, human, pair 1"[MeSH Terms] OR "chromosomes, human, pair 19"[MeSH Terms] OR ("chromosome 1"[Text Word] OR "chromosome 19"[Text Word]) OR "DNA Mutational Analysis"[MeSH Terms] OR "Genotype"[MeSH Terms] OR "Loss of Heterozygosity"[MeSH Terms] OR "Loss of Heterozygosity"[Text Word] OR "Genetic Markers"[MeSH Terms] OR "genetic marker*"[Text Word])) AND ("Controlled Clinical Trial"[Publication Type] OR "Controlled Clinical Trials as Topic"[MeSH</p> | 38 |

| | | |
|---|---|-----------|
| | Terms]) AND (2022/01/01:3000/12/31[Date - Publication] AND ("English"[Language] OR "danish"[Language] OR "norwegian"[Language] OR "swedish"[Language])) | |
| 3 | 2022/01/01:3000/12/31[Date - Publication] AND ("English"[Language] OR "danish"[Language] OR "norwegian"[Language] OR "swedish"[Language])) | 3,712,324 |
| 2 | "Controlled Clinical Trial"[Publication Type] OR "Controlled Clinical Trials as Topic"[MeSH Terms] | 874,858 |
| 1 | ("Astrocytoma"[MeSH Terms] OR ("astrocytoma*"[Text Word] OR "oligoastrocytoma*"[Text Word])) AND (((("drug therapy"[MeSH Subheading] OR "Antineoplastic Agents"[MeSH Terms] OR "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols"[MeSH Terms] OR "chemotherap*"[Text Word] OR ("idh mutant*"[Text Word] OR "isocitrate dehydrogenase mutant*"[Text Word]) OR ("idh wildtype*"[Text Word] OR "isocitrate dehydrogenase wildtype*"[Text Word] OR "idh wild type*"[Text Word] OR "isocitrate dehydrogenase wild type*"[Text Word]) OR "antineoplastic agent*"[Text Word] OR "Immunotherapy"[MeSH Terms] OR "Chemoradiotherapy"[MeSH Terms] OR ("immunotherap*"[Text Word] OR "radiochemo*"[Text Word] OR "chemoradio*"[Text Word]) OR ("temozolomide"[Text Word] OR "nitrosoureas"[Text Word] OR "procarbazine"[Text Word] OR "lomustine"[Text Word] OR "vincristine"[Text Word] OR "PCV"[Text Word] OR "cisplatinum"[Text Word] OR "carboplatinum"[Text Word] OR "Bevacizumab"[Text Word] OR "Steroids"[MeSH Terms] OR "steroid*"[Text Word] OR ("VEGF"[Text Word] OR "vascular endothelial growth factor*"[Text Word]) OR ("avastin"[Text Word] OR "antiangiogenic"[Text Word] OR "anti-angiogenic"[Text Word]) OR ("angiogenesis"[Text Word] AND "inhibit*"[Text Word])) AND ("Radiotherapy"[MeSH Subheading] OR "Radiotherapy"[MeSH Terms] OR ("radiotherap*"[Text Word] OR "radiat*"[Text Word] OR "irradiat*"[Text Word]))) OR ("Combined Modality Therapy"[MeSH Terms] OR "combined modality therap*"[Text Word] OR "multimodal treatment*"[Text Word]) OR ("chromosomes, human, pair 1"[MeSH Terms] OR "chromosomes, human, pair 19"[MeSH Terms] OR ("chromosome 1"[Text Word] OR "chromosome 19"[Text Word]) OR "DNA Mutational Analysis"[MeSH Terms] OR "Genotype"[MeSH Terms] OR "Loss of Heterozygosity"[MeSH Terms] OR "Loss of Heterozygosity"[Text Word] OR "Genetic Markers"[MeSH Terms] OR "genetic marker*"[Text Word])) | 10,55 |

Embase

| No. | Query | Results |
|-----|--|---------|
| #42 | #40 AND #41 | 148 |
| #41 | [2022-2024]/py AND ([danish]/lim OR [english]/lim OR [norwegian]/lim OR [swedish]/lim) | 4208691 |
| #40 | #38 AND #39 | 1334 |
| #39 | 'controlled clinical trial'/exp OR 'randomized controlled trial'/exp | 1003293 |

| | | |
|-----|---|---------|
| #38 | #3 AND #37 | 23569 |
| #37 | #26 OR #36 | 1104526 |
| #36 | #27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 OR #35 | 558052 |
| #35 | 'genetic marker*' | 71534 |
| #34 | 'genetic marker'/exp | 100312 |
| #33 | 'heterozygosity loss' | 14479 |
| #32 | 'heterozygosity loss'/de | 14467 |
| #31 | 'genotype'/exp | 444551 |
| #30 | 'dna mutational analysis'/de | 1612 |
| #29 | 'chromosome 1' OR 'chromosome 19' | 17323 |
| #28 | 'chromosome 19'/de | 4053 |
| #27 | 'chromosome 1'/de | 8774 |
| #26 | #21 OR #25 | 551624 |
| #25 | #22 OR #23 OR #24 | 75499 |
| #24 | 'multimodal treatment*' | 5523 |
| #23 | 'combined modality therap*' | 3599 |
| #22 | 'multimodality cancer therapy'/de | 69030 |
| #21 | #16 AND #20 | 506432 |
| #20 | #17 OR #18 OR #19 | 1521828 |
| #19 | radiotherap* OR radiat* OR irradiat* | 1503650 |
| #18 | 'radiotherapy'/exp | 564694 |
| #17 | 'radiotherapy':lnk | 340373 |
| #16 | #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 | 6485662 |
| #15 | 'steroid*' | 459907 |
| #14 | 'steroid'/exp | 1619958 |
| #13 | temozolomide OR nitrosoureas OR procarbazine OR lomustine OR vincristine OR pcv OR cisplatinum OR carboplatinum OR bevacizumab OR vegf OR 'vascular endothelial growth factor*' OR avastin OR antiangiogenic OR 'anti-angiogenic' OR (angiogenesis AND inhibit*) | 378215 |
| #12 | immunotherap* OR radiochemotherap* OR chemoradiotherap* | 290285 |
| #11 | 'chemoradiotherapy'/exp | 52133 |
| #10 | 'immunotherapy'/exp | 217670 |
| #9 | 'antineoplastic agent*' | 310574 |
| #8 | 'idh wildtype*' OR 'isocitrate dehydrogenase wildtype*' OR 'idh wild-type*' OR 'isocitrate dehydrogenase wild-type*' | 1012 |
| #7 | 'idh mutant*' OR 'isocitrate dehydrogenase mutant*' | 968 |
| #6 | chemotherap* | 961404 |
| #5 | 'antineoplastic agent'/exp | 2339528 |
| #4 | 'drug therapy':lnk | 3939397 |
| #3 | #1 OR #2 | 90596 |
| #2 | astrocytoma* OR oligoastrocytoma* | 33297 |
| #1 | 'astrocytoma'/exp | 85151 |

Cochrane

| ID | Search | Hits |
|-----|---|--------|
| #1 | MeSH descriptor: [Astrocytoma] explode all trees | 1210 |
| #2 | (astrocytoma* OR oligoastrocytoma*):ti,ab,kw | 665 |
| #3 | #1 or #2 | 1607 |
| #4 | MeSH descriptor: [] explode all trees and with qualifier(s): [drug therapy - DT] | 284702 |
| #5 | MeSH descriptor: [Antineoplastic Agents] explode all trees | 19592 |
| #6 | (chemotherap*):ti,ab,kw | 96580 |
| #7 | (idh NEXT (mutant* OR wildtype* OR wild type OR wild types)):ti,ab,kw | 92 |
| #8 | (isocitrate dehydrogenase wildtype OR isocitrate dehydrogenase wildtypes):ti,ab,kw | 37 |
| #9 | (isocitrate dehydrogenase wild type OR isocitrate dehydrogenase wild types):ti,ab,kw | 28 |
| #10 | (antineoplastic NEXT agent*):ti,ab,kw | 16012 |
| #11 | MeSH descriptor: [Immunotherapy] explode all trees | 12102 |
| #12 | MeSH descriptor: [Chemoradiotherapy] explode all trees | 2116 |
| #13 | (immunotherap* OR radiochemotherap* OR chemoradiotherap*):ti,ab,kw | 23338 |
| #14 | (temozolomide OR nitrosoureas OR procarbazine OR lomustine OR vincristine OR pcv OR cisplatin OR carboplatinum OR bevacizumab):ti,ab,kw | 16023 |
| #15 | MeSH descriptor: [Steroids] explode all trees | 76124 |
| #16 | (steroid*):ti,ab,kw | 37892 |
| #17 | (284-#16) | 436902 |
| #18 | MeSH descriptor: [] explode all trees and with qualifier(s): [radiotherapy - RT] | 12364 |
| #19 | MeSH descriptor: [Radiotherapy] explode all trees | 10011 |
| #20 | (radiotherap* OR radiat* OR irradiat*):ti,ab,kw | 64240 |
| #21 | (286-#20) | 64634 |
| #22 | #17 AND #21 | 30466 |
| #23 | MeSH descriptor: [Combined Modality Therapy] explode all trees | 30856 |

| | | |
|-----|--|-------|
| #24 | (combined modality NEXT therap*):ti,ab,kw | 20320 |
| #25 | (multimodal NEXT treatment*):ti,ab,kw | 588 |
| #26 | (287-#25) | 31906 |
| #27 | #22 OR #26 | 54641 |
| #28 | MeSH descriptor: [Chromosomes, Human, Pair 1] explode all trees | 27 |
| #29 | MeSH descriptor: [Chromosomes, Human, Pair 19] explode all trees | 23 |
| #30 | (chromosome 1 OR chromosome 19):ti,ab,kw | 1890 |
| #31 | MeSH descriptor: [DNA Mutational Analysis] explode all trees | 311 |
| #32 | MeSH descriptor: [Genotype] explode all trees | 6739 |
| #33 | MeSH descriptor: [Loss of Heterozygosity] explode all trees | 126 |
| #34 | loss of heterozygosity | 232 |
| #35 | MeSH descriptor: [Genetic Markers] explode all trees | 391 |
| #36 | (genetic NEXT marker*):ti,ab,kw | 2562 |
| #37 | (288-#36) | 11166 |
| #38 | #27 OR #37 | 65404 |
| #39 | #3 AND #38 with Cochrane Library publication date Between Jan 2022 and Dec 2024, in Cochrane Reviews, Trials | 79 |

D – Glioblastom incl. novocure

| Database | Interface | Resultat | Dato |
|------------------|------------|------------|------------|
| PubMed | PubMed.gov | 64 | 08.05.2024 |
| Embase | Embase.com | 273 | 08.05.2024 |
| Cochrane Library | Wiley | 332 | 08.05.2024 |
| I alt | | 605 | |

PubMed

| Search number | Search Details | Results |
|---------------|--|---------|
| 6 | ("Glioblastoma" [MeSH Terms] OR "glioblastoma*" [Text Word] OR "astrocyt*" [Text Word]) AND ("Radiotherapy" [MeSH Terms] OR "Radiotherapy" [MeSH Subheading] OR ("radiotherap*" [Text Word] OR "radiat*" [Text Word] OR "irradiat*" [Text Word]) OR "Antineoplastic Agents" [MeSH Terms] OR "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols" [MeSH Terms] OR ("temozolomide" [Text Word] OR "TMZ" [Text Word] OR "temodal" [Text Word] OR "temodar" [Text Word] OR "temcad*" [Text Word] OR "chemotherap*" [Text Word] OR "procarbazine" [Text Word] OR "lomustine" [Text Word] OR "CCNU" [Text Word] OR "vincristine" [Text Word] OR "PCV" [Text Word] OR "cisplatin" [Text Word] OR "carboplatinum" [Text Word]) OR ("bevacizumab" [Text Word] OR "vegf" [Text Word] OR "vascular endothelial growth factor*" [Text Word] OR "avastin" [Text Word] OR "antiangiogenic" [Text Word] OR "anti-angiogenic" [Text Word] OR ("angiogenesis" [Text Word] AND "inhibit*" [Text Word]) OR "irinotecan" [Text Word]) OR "Chemoradiotherapy" [MeSH Terms] OR ("radiochemo*" [Text Word] OR "chemoradio*" [Text Word]) OR "Immunotherapy" [MeSH Terms] OR "immunotherap*" [Text Word] OR "Steroids" [MeSH Terms] OR ("dexamethasone" [Text Word] OR "prednisolone" [Text Word] OR "methylprednisolone" [Text Word] OR "tumor treating field*" [Text Word] OR "tumour treating field*" [Text Word] OR "optune" [Text Word] OR "ttfield*" [Text Word] OR "optimalttf*" [Text Word] OR (("optimal" [All Fields] OR "optimality" [All Fields] OR "optimally" [All Fields] OR "optimization" [All Fields] OR "optimizations" [All Fields] OR "optimize" [All Fields] OR "optimized" [All Fields] OR "optimizer" [All Fields] OR "optimizers" [All Fields] OR "optimizes" [All Fields] OR "optimizing" [All Fields]) AND "TTF" [Text Word]) OR "novocure" [Text Word])) AND ("Controlled Clinical Trial" [Publication Type] OR "Controlled Clinical Trials as Topic" [MeSH Terms]) AND | 64 |

| | | |
|---|--|-----------|
| | (2022/01/01:3000/12/31[Date - Publication] AND ("English"[Language] OR "danish"[Language] OR "norwegian"[Language] OR "swedish"[Language])) | |
| 5 | 2022/01/01:3000/12/31[Date - Publication] AND ("English"[Language] OR "danish"[Language] OR "norwegian"[Language] OR "swedish"[Language]) | 3,719,655 |
| 4 | "Controlled Clinical Trial"[Publication Type] OR "Controlled Clinical Trials as Topic"[MeSH Terms] | 875,033 |
| 3 | ("Glioblastoma"[MeSH Terms] OR "glioblastoma*"[Text Word] OR "astrocyt*"[Text Word]) AND ("Radiotherapy"[MeSH Terms] OR "Radiotherapy"[MeSH Subheading] OR ("radiotherap*"[Text Word] OR "radiat*"[Text Word] OR "irradiat*"[Text Word]) OR "Antineoplastic Agents"[MeSH Terms] OR "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols"[MeSH Terms] OR ("temozolomide"[Text Word] OR "TMZ"[Text Word] OR "temodal"[Text Word] OR "temodar"[Text Word] OR "temcad*"[Text Word] OR "chemotherap*"[Text Word] OR "procarbazine"[Text Word] OR "lomustine"[Text Word] OR "CCNU"[Text Word] OR "vincristine"[Text Word] OR "PCV"[Text Word] OR "cisplatinum"[Text Word] OR "carboplatinum"[Text Word]) OR ("bevacizumab"[Text Word] OR "vegf"[Text Word] OR "vascular endothelial growth factor*"[Text Word] OR "avastin"[Text Word] OR "antiangiogenic"[Text Word] OR "anti-angiogenic"[Text Word] OR ("angiogenesis"[Text Word] AND "inhibit*"[Text Word]) OR "irinotecan"[Text Word]) OR "Chemoradiotherapy"[MeSH Terms] OR ("radiochemo*"[Text Word] OR "chemoradio*"[Text Word]) OR "Immunotherapy"[MeSH Terms] OR "immunotherap*"[Text Word] OR "Steroids"[MeSH Terms] OR ("dexamethasone"[Text Word] OR "prednisolone"[Text Word] OR "methylprednisolone"[Text Word] OR "tumor treating field*"[Text Word] OR "tumour treating field*"[Text Word] OR "optune"[Text Word] OR "ttfield*"[Text Word] OR "optimalttf*"[Text Word] OR ("optimal"[All Fields] OR "optimality"[All Fields] OR "optimally"[All Fields] OR "optimization"[All Fields] OR "optimizations"[All Fields] OR "optimize"[All Fields] OR "optimized"[All Fields] OR "optimizer"[All Fields] OR "optimizers"[All Fields] OR "optimizes"[All Fields] OR "optimizing"[All Fields]) AND "TTF"[Text Word]) OR "novocure"[Text Word])) | 35,252 |
| 2 | "Radiotherapy"[MeSH Terms] OR "Radiotherapy"[MeSH Subheading] OR ("radiotherap*"[Text Word] OR "radiat*"[Text Word] OR "irradiat*"[Text Word]) OR "Antineoplastic Agents"[MeSH Terms] OR "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols"[MeSH Terms] OR ("temozolomide"[Text Word] OR "TMZ"[Text Word] OR "temodal"[Text Word] OR "temodar"[Text Word] OR "temcad*"[Text Word] OR "chemotherap*"[Text Word] OR "procarbazine"[Text Word] OR "lomustine"[Text Word] OR "CCNU"[Text Word] OR "vincristine"[Text Word] OR "PCV"[Text Word] OR "cisplatinum"[Text Word] OR "carboplatinum"[Text Word]) OR ("bevacizumab"[Text Word] OR "vegf"[Text Word] OR "vascular endothelial growth factor*"[Text Word]) | 3,294,271 |

| | | |
|---|---|---------|
| | OR "avastin"[Text Word] OR "antiangiogenic"[Text Word] OR "anti-angiogenic"[Text Word] OR ("angiogenesis"[Text Word] AND "inhibit*"[Text Word]) OR "irinotecan"[Text Word]) OR "Chemoradiotherapy"[MeSH Terms] OR ("radiochemo*"[Text Word] OR "chemoradio*"[Text Word]) OR "Immunotherapy"[MeSH Terms] OR "immunotherap*"[Text Word] OR "Steroids"[MeSH Terms] OR ("dexamethasone"[Text Word] OR "prednisolone"[Text Word] OR "methylprednisolone"[Text Word] OR "tumor treating field*"[Text Word] OR "tumour treating field*"[Text Word] OR "optune"[Text Word] OR "ttfield*"[Text Word] OR "optimalttf*"[Text Word] OR ("optimal"[All Fields] OR "optimality"[All Fields] OR "optimally"[All Fields] OR "optimization"[All Fields] OR "optimizations"[All Fields] OR "optimize"[All Fields] OR "optimized"[All Fields] OR "optimizer"[All Fields] OR "optimizers"[All Fields] OR "optimizes"[All Fields] OR "optimizing"[All Fields]) AND "TTF"[Text Word]) OR "novocure"[Text Word]) | |
| 1 | "Glioblastoma"[MeSH Terms] OR "glioblastoma*"[Text Word] OR "astrocyt*"[Text Word] | 148,263 |

Embase

| No. | Query | Results |
|-----|--|----------|
| #24 | #23 AND [2022-2024]/py AND ([danish]/lim OR [english]/lim OR [norwegian]/lim OR [swedish]/lim) | 273 |
| #23 | #21 AND #22 | 2345 |
| #22 | 'controlled clinical trial'/exp OR 'randomized controlled trial'/exp | 1002888 |
| #21 | #3 AND #20 | 113776 |
| #20 | #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 | 12164772 |
| #19 | novocure:ti,ab,kw OR 'tumor treating field*':ti,ab,kw OR 'tumour treating field*':ti,ab,kw OR optune:ti,ab,kw OR ttfield*:ti,ab,kw OR optimalttf*:ti,ab,kw OR 'optimal ttf':ti,ab,kw | 2111 |
| #18 | dexamethasone OR prednisolone OR methylprednisolone | 373390 |
| #17 | 'steroid'/exp | 1619958 |
| #16 | 'immunotherapy'/exp | 217670 |
| #15 | radiochemo* OR chemoradio* | 66506 |
| #14 | 'chemoradiotherapy'/exp | 52133 |
| #13 | (bevacizumab OR vegf OR vascular) AND endothelial AND growth AND factor* OR avastin OR antiangiogenic OR 'anti angiogenic' OR (angiogenesis AND inhibit*) OR irinotecan | 220233 |
| #12 | temozolomide OR tmz OR temodal OR temodar OR temcad* OR chemotherap* OR procarbazine OR lomustine OR ccnu OR vincristine OR pcv OR cisplatinum OR carboplatinum | 1024460 |
| #11 | 'antineoplastic agent'/exp | 2339528 |
| #10 | 'chemotherapy'/exp | 657958 |

| | | |
|----|--|---------|
| #9 | radiotherap*:ti,ab OR radiat*:ti,ab OR irradiat*:ti,ab | 886189 |
| #8 | 'radiotherapy':lnk | 340373 |
| #7 | 'radiotherapy'/exp | 564694 |
| #6 | surg* OR neurosurg* OR craniotom* OR resect* OR eor OR intraoperative* | 5981145 |
| #5 | 'surgery':lnk | 2209221 |
| #4 | 'neurosurgery'/exp | 287756 |
| #3 | #1 OR #2 | 160892 |
| #2 | glioblastoma*:ti,ab OR astrocyt*:ti,ab | 142085 |
| #1 | 'glioblastoma'/de | 68060 |

Cochrane

| ID | Search | Hits |
|-----|--|--------|
| #1 | MeSH descriptor: [Glioblastoma] explode all trees | 1075 |
| #2 | (glioblastoma* OR astrocyt*):ti,ab,kw | 3249 |
| #3 | #1 OR #2 | 3249 |
| #4 | MeSH descriptor: [Radiotherapy] explode all trees | 10011 |
| #5 | MeSH descriptor: [] explode all trees and with qualifier(s): [radiotherapy - RT] | 12364 |
| #6 | (radiotherap* OR radiat* OR irradiat*):ti,ab,kw | 64240 |
| #7 | MeSH descriptor: [Antineoplastic Agents] explode all trees | 19592 |
| #8 | MeSH descriptor: [Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols] explode all trees | 21656 |
| #9 | (temozolamide OR tmz OR temodal OR temodar OR temcad* OR chemotherap* OR procarbazine OR lomustine OR ccnu OR vincristine OR pcv OR cisplatin OR carboplatinum):ti,ab,kw | 100011 |
| #10 | (bevacizumab OR vegf OR vascular endothelial growth NEXT factor* OR avastin OR antiangiogenic OR anti NEXT angiogenic OR (angiogenesis AND inhibit*) OR irinotecan):ti,ab,kw | 18797 |
| #11 | MeSH descriptor: [Chemoradiotherapy] explode all trees | 2116 |
| #12 | (radiochemo* OR chemoradio*):ti,ab,kw | 9666 |
| #13 | MeSH descriptor: [Immunotherapy] explode all trees | 12102 |
| #14 | (immunotherap*):ti,ab,kw | 14201 |
| #15 | MeSH descriptor: [Steroids] explode all trees | 76124 |
| #16 | (dexamethasone OR prednisolone OR methylprednisolone):ti,ab,kw | 27936 |

| | | |
|-----|--|--------|
| #17 | ((tumor treating NEXT field*) OR (tumour treating NEXT field*) OR optune OR TTField* OR optimalTTF* OR "optimal TTF" OR novocure):ti,ab,kw | 367 |
| #18 | (284-#16) | 256601 |
| #19 | #3 and #18 with Cochrane Library publication date Between Jan 2022 and Jan 2024, in Cochrane Reviews, Trials | 332 |

E – Ældre glioblastoma

| Database | Interface | Resultat | Dato |
|------------------|------------|------------|------------|
| PubMed | PubMed.gov | 15 | 08.05.2024 |
| Embase | Embase.com | 96 | 08.05.2024 |
| Cochrane Library | Wiley | 72 | 08.05.2024 |
| I alt | | 183 | |

PubMed

| Search number | Search Details | Results |
|---------------|---|---------|
| 8 | ("Glioblastoma" [MeSH Terms] OR "glioblastoma*" [Text Word] OR "astrocyt*" [Text Word]) AND ("Radiotherapy" [MeSH Terms] OR "Radiotherapy" [MeSH Subheading] OR ("radiotherap*" [Text Word] OR "radiat*" [Text Word] OR "irradiat*" [Text Word]) OR "Antineoplastic Agents" [MeSH Terms] OR "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols" [MeSH Terms] OR ("temozolomide" [Text Word] OR "TMZ" [Text Word]) OR "temodal" [Text Word] OR "temodar" [Text Word] OR "temcad*" [Text Word] OR "chemotherap*" [Text Word] OR "procarbazine" [Text Word] OR "lomustine" [Text Word] OR "CCNU" [Text Word] OR "vincristine" [Text Word] OR "PCV" [Text Word] OR "cisplatin" [Text Word] OR "carboplatinum" [Text Word]) OR ("bevacizumab" [Text Word] OR "vegf" [Text Word] OR "vascular endothelial growth factor*" [Text Word] OR "avastin" [Text Word] OR "antiangiogenic" [Text Word] OR "anti-angiogenic" [Text Word] OR ("angiogenesis" [Text Word] AND "inhibit*" [Text Word]) OR "irinotecan" [Text Word]) OR "Chemoradiotherapy" [MeSH Terms] OR ("radiochemo*" [Text Word] OR "chemoradio*" [Text Word]) OR "Immunotherapy" [MeSH Terms] OR "immunotherap*" [Text Word] OR "Steroids" [MeSH Terms] OR ("dexamethasone" [Text Word] OR "prednisolone" [Text Word] OR "methylprednisolone" [Text Word] OR "tumor treating field*" [Text Word] OR "tumour treating field*" [Text Word]) OR "optune" [Text Word] OR "ttfield*" [Text Word] OR "optimalttf*" [Text Word] OR (("optimal" [All Fields] OR "optimality" [All Fields]) OR "optimally" [All Fields] OR "optimization" [All Fields] OR "optimizations" [All Fields]) OR "optimize" [All Fields] OR "optimized" [All Fields] OR "optimizer" [All Fields] OR "optimizers" [All Fields] OR "optimizes" [All Fields] OR "optimizing" [All Fields]) AND ("Controlled Clinical Trial" [Publication Type] OR "Controlled Clinical Trials as Topic" [MeSH Terms]) AND (2022/01/01:3000/12/31 [Date - Publication] AND ("English" [Language] OR "danish" [Language]) OR "Skabelon v. 9.3" [Text Word])) | 15 |

| | | |
|---|---|-----------|
| | "norwegian"[Language] OR "swedish"[Language])) AND ("Aged"[MeSH Terms] OR ("aged*"[Title/Abstract] OR "old"[Title/Abstract] OR "olde*"[Title/Abstract] OR "ageing*"[Title/Abstract] OR "geriatric*"[Title/Abstract]) OR ("elder*"[Title/Abstract] OR "over 60"[Title/Abstract] OR "over 65"[Title/Abstract] OR "over 70"[Title/Abstract] OR "over 80"[Title/Abstract] OR "over 85"[Title/Abstract] OR "60 year*"[Title/Abstract] OR "65 year*"[Title/Abstract] OR "70 year*"[Title/Abstract] OR "80 year*"[Title/Abstract] OR "85 year*"[Title/Abstract])) | |
| 7 | "Aged"[MeSH Terms] OR "aged*"[Title/Abstract] OR "old"[Title/Abstract] OR "olde*"[Title/Abstract] OR "ageing*"[Title/Abstract] OR "geriatric*"[Title/Abstract] OR "elder*"[Title/Abstract] OR "over 60"[Title/Abstract] OR "over 65"[Title/Abstract] OR "over 70"[Title/Abstract] OR "over 80"[Title/Abstract] OR "over 85"[Title/Abstract] OR "60 year*"[Title/Abstract] OR "65 year*"[Title/Abstract] OR "70 year*"[Title/Abstract] OR "80 year*"[Title/Abstract] OR "85 year*"[Title/Abstract] | 5,452,374 |
| 6 | ("Glioblastoma"[MeSH Terms] OR "glioblastoma*"[Text Word] OR "astrocyt*"[Text Word]) AND ("Radiotherapy"[MeSH Terms] OR "Radiotherapy"[MeSH Subheading] OR ("radiotherap*"[Text Word] OR "radiat*"[Text Word] OR "irradiat*"[Text Word]) OR "Antineoplastic Agents"[MeSH Terms] OR "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols"[MeSH Terms] OR ("temozolomide"[Text Word] OR "TMZ"[Text Word] OR "temodal"[Text Word] OR "temodar"[Text Word] OR "temcad*"[Text Word] OR "chemotherap*"[Text Word] OR "procarbazine"[Text Word] OR "lomustine"[Text Word] OR "CCNU"[Text Word] OR "vincristine"[Text Word] OR "PCV"[Text Word] OR "cisplatinum"[Text Word] OR "carboplatinum"[Text Word]) OR ("bevacizumab"[Text Word] OR "vegf"[Text Word] OR "vascular endothelial growth factor*"[Text Word] OR "avastin"[Text Word] OR "antiangiogenic"[Text Word] OR "anti-angiogenic"[Text Word] OR ("angiogenesis"[Text Word] AND "inhibit*"[Text Word]) OR "irinotecan"[Text Word]) OR "Chemoradiotherapy"[MeSH Terms] OR ("radiochemo*"[Text Word] OR "chemoradio*"[Text Word]) OR "Immunotherapy"[MeSH Terms] OR "immunotherap*"[Text Word] OR "Steroids"[MeSH Terms] OR ("dexamethasone"[Text Word] OR "prednisolone"[Text Word] OR "methylprednisolone"[Text Word] OR "tumor treating field*"[Text Word] OR "tumour treating field*"[Text Word] OR "optune"[Text Word] OR "ttfield*"[Text Word] OR "optimaltf*"[Text Word] OR ((("optimal"[All Fields] OR "optimality"[All Fields] OR "optimally"[All Fields] OR "optimization"[All Fields] OR "optimizations"[All Fields] OR "optimize"[All Fields] OR "optimized"[All Fields] OR "optimizer"[All Fields] OR "optimizers"[All Fields] OR "optimizes"[All Fields] OR "optimizing"[All Fields]) AND "TTF"[Text Word]) OR "novocure"[Text Word])) AND ("Controlled Clinical Trial"[Publication Type] OR "Controlled | 64 |

| | | |
|---|--|-----------|
| | Clinical Trials as Topic"[MeSH Terms]) AND (2022/01/01:3000/12/31[Date - Publication] AND ("English"[Language] OR "danish"[Language] OR "norwegian"[Language] OR "swedish"[Language])) | |
| 5 | 2022/01/01:3000/12/31[Date - Publication] AND ("English"[Language] OR "danish"[Language] OR "norwegian"[Language] OR "swedish"[Language]) | 3,719,655 |
| 4 | "Controlled Clinical Trial"[Publication Type] OR "Controlled Clinical Trials as Topic"[MeSH Terms] | 875,033 |
| 3 | ("Glioblastoma"[MeSH Terms] OR "glioblastoma*"[Text Word] OR "astrocyt*"[Text Word]) AND ("Radiotherapy"[MeSH Terms] OR "Radiotherapy"[MeSH Subheading] OR ("radiotherap*"[Text Word] OR "radiat*"[Text Word] OR "irradiat*"[Text Word]) OR "Antineoplastic Agents"[MeSH Terms] OR "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols"[MeSH Terms] OR ("temozolomide"[Text Word] OR "TMZ"[Text Word] OR "temodal"[Text Word] OR "temodar"[Text Word] OR "temcad*"[Text Word] OR "chemotherap*"[Text Word] OR "procarbazine"[Text Word] OR "lomustine"[Text Word] OR "CCNU"[Text Word] OR "vincristine"[Text Word] OR "PCV"[Text Word] OR "cisplatinum"[Text Word] OR "carboplatinum"[Text Word]) OR ("bevacizumab"[Text Word] OR "vegf"[Text Word] OR "vascular endothelial growth factor*"[Text Word] OR "avastin"[Text Word] OR "antiangiogenic"[Text Word] OR "anti-angiogenic"[Text Word] OR ("angiogenesis"[Text Word] AND "inhibit*"[Text Word]) OR "irinotecan"[Text Word]) OR "Chemoradiotherapy"[MeSH Terms] OR ("radiochemo*"[Text Word] OR "chemoradio*"[Text Word]) OR "Immunotherapy"[MeSH Terms] OR "immunotherap*"[Text Word] OR "Steroids"[MeSH Terms] OR ("dexamethasone"[Text Word] OR "prednisolone"[Text Word] OR "methylprednisolone"[Text Word] OR "tumor treating field*"[Text Word] OR "tumour treating field*"[Text Word] OR "optune"[Text Word] OR "ttfield*"[Text Word] OR "optimalttf*"[Text Word] OR ("optimal"[All Fields] OR "optimality"[All Fields] OR "optimally"[All Fields] OR "optimization"[All Fields] OR "optimizations"[All Fields] OR "optimize"[All Fields] OR "optimized"[All Fields] OR "optimizer"[All Fields] OR "optimizers"[All Fields] OR "optimizes"[All Fields] OR "optimizing"[All Fields]) AND "TTF"[Text Word]) OR "novocure"[Text Word])) | 35,252 |
| 2 | "Radiotherapy"[MeSH Terms] OR "Radiotherapy"[MeSH Subheading] OR ("radiotherap*"[Text Word] OR "radiat*"[Text Word] OR "irradiat*"[Text Word]) OR "Antineoplastic Agents"[MeSH Terms] OR "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols"[MeSH Terms] OR ("temozolomide"[Text Word] OR "TMZ"[Text Word] OR "temodal"[Text Word] OR "temodar"[Text Word] OR "temcad*"[Text Word] OR "chemotherap*"[Text Word] OR "procarbazine"[Text Word] OR "lomustine"[Text Word] OR "CCNU"[Text Word] OR "vincristine"[Text Word] OR "PCV"[Text Word] OR "cisplatinum"[Text Word] OR "carboplatinum"[Text Word]) OR ("bevacizumab"[Text Word] OR "vegf"[Text Word] OR "vascular endothelial growth factor*"[Text Word] OR "avastin"[Text Word] OR "antiangiogenic"[Text Word] OR "anti-angiogenic"[Text Word] OR ("angiogenesis"[Text Word] AND "inhibit*"[Text Word]) OR "irinotecan"[Text Word]) OR "Chemoradiotherapy"[MeSH Terms] OR ("radiochemo*"[Text Word] OR "chemoradio*"[Text Word]) OR "Immunotherapy"[MeSH Terms] OR "immunotherap*"[Text Word] OR "Steroids"[MeSH Terms] OR ("dexamethasone"[Text Word] OR "prednisolone"[Text Word] OR "methylprednisolone"[Text Word] OR "tumor treating field*"[Text Word] OR "tumour treating field*"[Text Word] OR "optune"[Text Word] OR "ttfield*"[Text Word] OR "optimalttf*"[Text Word] OR ("optimal"[All Fields] OR "optimality"[All Fields] OR "optimally"[All Fields] OR "optimization"[All Fields] OR "optimizations"[All Fields] OR "optimize"[All Fields] OR "optimized"[All Fields] OR "optimizer"[All Fields] OR "optimizers"[All Fields] OR "optimizes"[All Fields] OR "optimizing"[All Fields]) AND "TTF"[Text Word]) OR "novocure"[Text Word])) | 3,294,271 |

| | | |
|---|---|---------|
| | "vegf"[Text Word] OR "vascular endothelial growth factor*"[Text Word] OR "avastin"[Text Word] OR "antiangiogenic"[Text Word] OR "anti-angiogenic"[Text Word] OR ("angiogenesis"[Text Word] AND "inhibit*"[Text Word]) OR "irinotecan"[Text Word]) OR "Chemoradiotherapy"[MeSH Terms] OR ("radiochemo*"[Text Word] OR "chemoradio*"[Text Word]) OR "Immunotherapy"[MeSH Terms] OR "immunotherap*"[Text Word] OR "Steroids"[MeSH Terms] OR ("dexamethasone"[Text Word] OR "prednisolone"[Text Word] OR "methylprednisolone"[Text Word] OR "tumor treating field*"[Text Word] OR "tumour treating field*"[Text Word] OR "optune"[Text Word] OR "ttfield*"[Text Word] OR "optimalttf*"[Text Word] OR ("optimal"[All Fields] OR "optimality"[All Fields] OR "optimally"[All Fields] OR "optimization"[All Fields] OR "optimizations"[All Fields] OR "optimize"[All Fields] OR "optimized"[All Fields] OR "optimizer"[All Fields] OR "optimizers"[All Fields] OR "optimizes"[All Fields] OR "optimizing"[All Fields]) AND "TTF"[Text Word]) OR "novocure"[Text Word]) | |
| 1 | "Glioblastoma"[MeSH Terms] OR "glioblastoma*"[Text Word] OR "astrocyt*"[Text Word] | 148,263 |

Embase

| No. | Query | Results |
|-----|--|----------|
| #26 | #24 AND #25 | 96 |
| #25 | 'aged'/exp OR aged:ti,ab OR old*:ti,ab OR ageing*:ti,ab OR geriatric*:ti,ab OR elder*:ti,ab OR 'over 60':ti,ab OR 'over 65':ti,ab OR 'over 70':ti,ab OR 'over 80':ti,ab OR 'over 85':ti,ab OR '60 year*':ti,ab OR '65 year*':ti,ab OR '70 year*':ti,ab OR '80 year*':ti,ab OR '85 year*':ti,ab | 6750812 |
| #24 | #23 AND [2022-2024]/py AND ([danish]/lim OR [english]/lim OR [norwegian]/lim OR [swedish]/lim) | 273 |
| #23 | #21 AND #22 | 2345 |
| #22 | 'controlled clinical trial'/exp OR 'randomized controlled trial'/exp | 1002888 |
| #21 | #3 AND #20 | 113776 |
| #20 | #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 | 12164772 |
| #19 | novocure:ti,ab,kw OR 'tumor treating field*':ti,ab,kw OR 'tumour treating field*':ti,ab,kw OR optune:ti,ab,kw OR ttfield*:ti,ab,kw OR optimalttf*:ti,ab,kw OR 'optimal ttf':ti,ab,kw | 2111 |
| #18 | dexamethasone OR prednisolone OR methylprednisolone | 373390 |
| #17 | 'steroid'/exp | 1619958 |
| #16 | 'immunotherapy'/exp | 217670 |
| #15 | radiochemo* OR chemoradio* | 66506 |
| #14 | 'chemoradiotherapy'/exp | 52133 |

| | | |
|-----|---|---------|
| #13 | (bevacizumab OR vegf OR vascular) AND endothelial AND growth AND factor* OR avastin OR antiangiogenic OR 'anti angiogenic' OR (angiogenesis AND inhibit*) OR irinotecan | 220233 |
| #12 | temozolomide OR tmz OR temodal OR temodar OR temcad* OR chemotherap* OR procarbazine OR lomustine OR ccnu OR vincristine OR pcv OR cisplatinum OR carboplatinum | 1024460 |
| #11 | 'antineoplastic agent'/exp | 2339528 |
| #10 | 'chemotherapy'/exp | 657958 |
| #9 | radiotherap*:ti,ab OR radiat*:ti,ab OR irradiat*:ti,ab | 886189 |
| #8 | 'radiotherapy':lnk | 340373 |
| #7 | 'radiotherapy'/exp | 564694 |
| #6 | surg* OR neurosurg* OR craniotom* OR resect* OR eor OR intraoperative* | 5981145 |
| #5 | 'surgery':lnk | 2209221 |
| #4 | 'neurosurgery'/exp | 287756 |
| #3 | #1 OR #2 | 160892 |
| #2 | glioblastoma*:ti,ab OR astrocyt*:ti,ab | 142085 |
| #1 | 'glioblastoma'/de | 68060 |

Cochrane

| ID | Search | Hits |
|-----|--|--------|
| #1 | MeSH descriptor: [Glioblastoma] explode all trees | 1075 |
| #2 | (glioblastoma* OR astrocyt*):ti,ab,kw | 3249 |
| #3 | #1 OR #2 | 3249 |
| #4 | MeSH descriptor: [Radiotherapy] explode all trees | 10011 |
| #5 | MeSH descriptor: [] explode all trees and with qualifier(s): [radiotherapy - RT] | 12364 |
| #6 | (radiotherap* OR radiat* OR irradiat*):ti,ab,kw | 64240 |
| #7 | MeSH descriptor: [Antineoplastic Agents] explode all trees | 19592 |
| #8 | MeSH descriptor: [Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols] explode all trees | 21656 |
| #9 | (temozolomide OR tmz OR temodal OR temodar OR temcad* OR chemotherap* OR procarbazine OR lomustine OR ccnu OR vincristine OR pcv OR cisplatinum OR carboplatinum):ti,ab,kw | 100011 |
| #10 | (bevacizumab OR vegf OR vascular endothelial growth NEXT factor* OR avastin OR antiangiogenic OR anti NEXT angiogenic OR (angiogenesis AND inhibit*) OR irinotecan):ti,ab,kw | 18797 |

| | | |
|-----|---|--------|
| #11 | MeSH descriptor: [Chemoradiotherapy] explode all trees | 2116 |
| #12 | (radiochemo* OR chemoradio*):ti,ab,kw | 9666 |
| #13 | MeSH descriptor: [Immunotherapy] explode all trees | 12102 |
| #14 | (immunotherap*):ti,ab,kw | 14201 |
| #15 | MeSH descriptor: [Steroids] explode all trees | 76124 |
| #16 | (dexamethasone OR prednisolone OR methylprednisolone):ti,ab,kw | 27936 |
| #17 | ((tumor treating NEXT field*) OR (tumour treating NEXT field*) OR optune OR TTField* OR optimalTTF* OR "optimal TTF" OR novocure):ti,ab,kw | 367 |
| #18 | (284-#16) | 256601 |
| #19 | #3 and #18 with Cochrane Library publication date Between Jan 2022 and Jan 2024, in Cochrane Reviews, Trials | 332 |
| #20 | MeSH descriptor: [Aged] explode all trees | 274545 |
| #21 | aged:ti,ab OR old*:ti,ab OR ageing*:ti,ab OR geriatric*:ti,ab OR elder*:ti,ab OR (over NEXT 60):ti,ab OR (over NEXT 65):ti,ab OR (over NEXT 70):ti,ab OR (over NEXT 80):ti,ab OR (over NEXT 85):ti,ab OR (60 NEXT year*):ti,ab OR (65 NEXT year*):ti,ab OR (70 NEXT year):ti,ab OR (80 NEXT year*):ti,ab OR (85 NEXT year*):ti,ab | 345330 |
| #22 | #20 OR #21 | 563954 |
| #23 | #19 AND #22 with Cochrane Library publication date Between Jan 2022 and Jan 2024, in Cochrane Reviews, Trials | 72 |

F – Ependymoma

| Database | Interface | Resultat | Dato |
|------------------|------------|------------|------------|
| PubMed | PubMed.gov | 163 | 08.05.2024 |
| Embase | Embase.com | 103 | 08.05.2024 |
| Cochrane Library | Wiley | 6 | 08.05.2024 |
| I alt | | 272 | |

PubMed

| Search number | Search Details | Results |
|---------------|--|-----------|
| 6 | ("Ependymoma"[MeSH Terms] OR "ependymom*"[Text Word]) AND ("Radiotherapy"[MeSH Terms] OR "radiotherap*"[Text Word] OR ("radiat*"[Text Word] OR "irradiat*"[Text Word]) OR "Radiotherapy"[MeSH Subheading] OR ("Antineoplastic Agents"[MeSH Terms] OR "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols"[MeSH Terms] OR "proton*"[Text Word] OR "Craniospinal Irradiation"[MeSH Terms] OR "Etoposide"[MeSH Terms] OR "Vincristine"[MeSH Terms] OR "Cyclophosphamide"[MeSH Terms] OR "Temozolomide"[MeSH Terms] OR "Carboplatin"[MeSH Terms] OR ("etoposid*"[Text Word] OR "Vincristine"[Text Word] OR "cyclophosphamid*"[Text Word] OR "platin derivative*"[Text Word] OR "temozolomid*"[Text Word] OR "carboplatin*"[Text Word]))) AND (2022/01/01:3000/12/31[Date - Publication] AND ("English"[Language] OR "danish"[Language] OR "norwegian"[Language] OR "swedish"[Language])) | 163 |
| 5 | 2022/01/01:3000/12/31[Date - Publication] AND ("English"[Language] OR "danish"[Language] OR "norwegian"[Language] OR "swedish"[Language])) | 3,719,655 |
| 4 | "Controlled Clinical Trial"[Publication Type] OR "Controlled Clinical Trials as Topic"[MeSH Terms] | 875,033 |
| 3 | ("Ependymoma"[MeSH Terms] OR "ependymom*"[Text Word]) AND ("Radiotherapy"[MeSH Terms] OR "radiotherap*"[Text Word] OR ("radiat*"[Text Word] OR "irradiat*"[Text Word]) OR "Radiotherapy"[MeSH Subheading] OR ("Antineoplastic Agents"[MeSH Terms] OR "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols"[MeSH Terms] OR "proton*"[Text Word] OR "Craniospinal Irradiation"[MeSH Terms] OR "Etoposide"[MeSH Terms] OR "Vincristine"[MeSH Terms] OR "Cyclophosphamide"[MeSH Terms] OR "Temozolomide"[MeSH Terms] OR "Carboplatin"[MeSH Terms] OR ("etoposid*"[Text Word] OR "Vincristine"[Text Word] OR "cyclophosphamid*"[Text Word] OR "platin derivative*"[Text Word] OR "temozolomid*"[Text Word] OR "carboplatin*"[Text Word]))) | 2,211 |
| 2 | "Radiotherapy"[MeSH Terms] OR "radiotherap*"[Text Word] OR ("radiat*"[Text Word] OR "irradiat*"[Text Word] OR "Radiotherapy"[MeSH Subheading] OR "Antineoplastic Agents"[MeSH Terms] OR "Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols"[MeSH Terms] OR "proton*"[Text Word] OR "Craniospinal Irradiation"[MeSH Terms] OR "Etoposide"[MeSH Terms] OR "Vincristine"[MeSH Terms] OR "Cyclophosphamide"[MeSH Terms] OR "Temozolomide"[MeSH Terms] OR "Carboplatin"[MeSH Terms] OR "etoposid*"[Text Word] OR "Vincristine"[Text Word] OR "cyclophosphamid*"[Text Word] OR "platin derivative*"[Text Word] OR "temozolomid*"[Text Word] OR "carboplatin*"[Text Word]) | 1,874,003 |
| 1 | "Ependymoma"[MeSH Terms] OR "ependymom*"[Text Word] | 8,39 |

Embase

| No. | Query | Results |
|-----|---|--------------|
| #9 | #6 AND #7 AND #8 | 103 |
| #8 | [danish]/lim OR [english]/lim OR [norwegian]/lim OR [swedish]/lim | 386750 48 |
| #7 | 'controlled clinical trial'/exp OR 'randomized controlled trial'/exp | 100373 1 |
| #6 | #1 AND #5 | 6124 |
| #5 | #2 OR #3 OR #4 | 466799 3 |
| #4 | chemotherap*:ti,ab,kw OR proton*:ti,ab,kw OR etoposid*:ti,ab,kw OR vincristine:ti,ab,kw OR cyclophosphamid*:ti,ab,kw OR 'platin derivative*':ti,ab,kw OR temozolomid*:ti,ab,kw OR carboplatin*:ti,ab,kw | 113121 0 |
| #3 | 'antineoplastic agent'/exp OR 'craniospinal irradiation'/de OR 'carboplatin'/de OR 'temozolomide'/de OR 'cyclophosphamide'/de OR 'vincristine'/de OR 'etoposide'/de | 323132 4 |
| #2 | 'radiotherapy'/exp OR radiotherapy:lnk OR radiotherap*:ti,ab,kw OR radiat*:ti,ab,kw OR irradiat*:ti,ab,kw | 142863 7 |
| #1 | 'ependymoma'/exp OR ependymom*:ti,ab,kw | 15165 |

Cochrane Library

| ID | Search | Hits |
|----|---|------|
| #1 | MeSH descriptor: [Ependymoma] explode all trees | 34 |
| #2 | (ependymom*):ti,ab,kw with Cochrane Library publication date Between Jan 2022 and Jan 2024, in Cochrane Reviews, Trials | 6 |

Bilag 2 – Anbefalet MR-skanningsprotokol til primær udredning og opfølgning

| MR-skanning af cerebrum standardprotokol (1,5 eller 3 Tesla) (283) | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|
| Sekvens | Snitplan | Snittykkelse, Max. mm | Undersøgelsesområde |
| T2-vægtet | Sagittalt eller axialt | 4 | Hele hjernen |
| T2 FLAIR | Coronalt, axialt eller 3D | 4 | Hele hjernen |
| T1-vægtet | Aksialt eller sagittalt | 4 | Hele hjernen |
| T1-vægtet med kontrast | Aksialt/koronalt/sagittalt | 4 (≤1,5 mm ved 3D) | Hele hjernen |
| DWI ^a | Aksialt | 4 | Hele hjernen |
| Evt. SWI ^b | Aksialt | 4-5 | Hele hjernen |
| Evt. T1-vægtet 3D efter kontrast | Aksialt eller sagittalt, skannet isotropisk | 0,5-1,5 | Hele hjernen |
| Evt. MR-angio-arteriel (TOF) ^c | Aksialt | - | |
| Evt MR-angio-venøs (fasekontrast) ^c | Aksialt/sagittalt | - | |

DWI: diffusionsvægtet sekvens; FLAIR: fluid attenuated inversion recovery; SWI: susceptibility weighted imaging.

a) DWI: Der skelnes mellem nekrotisk tumor og absces samt mellem tumor og iskæmi; celletætte tumorer kan også udvise diffusionsrestriktion.

b) SWI: Supplement til vurdering af tumorvaskularitet/blødning og vurdering af terapirespons ved behandling med antiangiogene præparater.

c) Skal dække det relevante område.

| MR-skanning af spinalkanal standardprotokol (1,5 eller 3 Tesla) | | | |
|--|---|----------------------------------|--|
| Sekvens | Snitplan | Snittykkelse, max. mm | Undersøgelsesområde (FOV), cm |
| T1 før og efter kontrast | Sagittalt | 2-4 | 30-50 |
| T1 efter kontrast | Aksialt i områder med patologi | 4 | 12-14 |
| Evt. T2 | Sagittalt Aksialt i områder med patologi | 3-4 | 30-50 |

Bilag 3 – Indikation for hjerne PET ved gliomer

Følger retningslinjerne fra PET RANO gruppen og EANO gruppen (7):

Præoperativt:

- Differentiering af neoplastisk fra ikke neoplastisk væv.
- Tumorgradering: $[^{18}\text{F}]$ FET er bedst egnet, når der udføres dynamisk optagelse.
- Tumorafrænsning f.eks. som led i operationsplanlægning: Tumors afgrænsning er vanligvis større end T1 MR efter kontrast, da det infiltrative komponent identificeres mere præcist.
- Påvise optimale biopsisteder- højeste tumorgrad (Hot-spot): Denne indikation er mest egnet til større diffuse tumore med usikker kontrastopladning. Det mest aktive område udvælges evt ved overførelse til neuronavigatoren.
- Neuronavigation: PET kan kombineres med MR som led i operationsplanlægningen.

Postoperativt:

- Prognosticering(289).
- Stråleterapi planlægning: Afgrænsning af resttumor postoperativt
- Evaluering af behandlingsrespons: Påvisning af ændringer i aktivt tumorvæv
 - Skelne respons/pseudorespons (290)
 - Tumorafrænsning f.eks. som led i operationsplanlægning for recidiv:
- Skelne tumor recidiv fra behandlingsfølger

(291)

Forslag til PET protokol og beskrivelse(9):

PET skanning med O-(2-[^{18}F]-fluoroethyl)-L-tyrosine ($[^{18}\text{F}]$ FET)

- Forberedelse:
 - Faste i 4 timer
 - Injektion af 200 MBq $[^{18}\text{F}]$ FET, snittykkelse max 3 mm, rekonstruktion med 5 mm Gauss filter.
 - Dynamisk optagelse i 40 min anbefales ved:
 - Primær udredning: Tumor/non-tumor, gradering, biopsi optimering
 - Malign transformation
 - Statisk optagelse i fra 20-40 min efter injektion anbefales ved øvrige indikationer, og sammen med dynamisk optagelse
- Billedbehandling:
 - Fusionering af PET til T1 og T2 vægtet MR
 - Udmåling af maximal aktivitet relative til et kortikal baggrundsareal (B) i kontralaterale raske hemisfære (Tmax/B) og biologisk tumor volumen (BTV) målt som volume > 1.6 * B for $[^{18}\text{F}]$ FET og 1.3 * B for $[^{11}\text{C}]$ MET

- Beskrivelse

- Kort indikation med angivelse af det kliniske spørgsmål, tidligere behandling, og fund fra patologi, MR og PET
- Beskrivelse af de udførte procedure
- Tolkning:
 - Identifikation af aktivt tumorvæv
 - Præcis beskrivelse af de patologiske forandringer, deres normaliserede intensitet (T_{max}/B) og BTV, samt anatomiske lokalisation i relation på MR
 - Primær udredning: $T_{max}/B > 1.6$ indikerer aktivt tumorvæv (292)
 - Efter behandling:
 - $T_{max}/B < 2.0$ indikerer reaktive forandringer
 - $T_{max}/B > 2.4$ indikerer aktivt tumorvæv (293, 294)
 - Tolkning udføres i relation til sygehistorien og strukturelle forhold
 - Falsk øget optagelse kan ses ved bl.a.: vaskulære anomalier og inflammation: MS, strålefølger, infektion, infarkt (295)
- Ved sammenligning med tidlige undersøgelser skal undersøgelsessted og –dato, samt evt. ændringer, herunder i T_{max}/B og BTV beskrives

Beskrivelsen afsluttes med en konklusion afhængigt af det kliniske spørgsmål, der kort sammenfatter undersøgelsesresultatet. Evt. usikkerhed i tolkningen skal fremgå gerne suppleret med anbefalinger om supplerende undersøgelser i relevante tilfælde.

Bilag 4 – Radiologisk beskrivelse baseret på RANO-kriterier

Standardisering af radiologisk beskrivelse, baseret på de internationale RANO-kriterier (12)

Præcis beskrivelse af patologiske forandringer, herunder forandringernes anatomiske lokalisation og udbredelse.

- Målbare læsioner udmales i 2 vinkelrette planer (skal måle $\geq 10 \times 10 \text{ mm}$).
- Ikke-målbare læsioner beskrives (se definitioner nedenfor)
- Ved opfølgende MR-skanninger skal man være særlig opmærksom på behandlingsfølger f.eks. pseudoprogression og pseudorespons.
- Ved sammenligning med tidligere undersøgelser skal undersøgelsessted og -tidspunkt samt evt. ændringer beskrives. Man bør ikke kun se på den seneste MR-skanning; men altid evaluere MR-skanningen i forhold til baseline-skanningen.

Billeddiagnostiske definitioner baseret på RANO-kriterierne:

1. Definition af **målbare læsioner**

- a. Målbare læsioner: Kontrastoplade eller ikke-kontrastoplade (ikke relateret til peritumoralt ødem), velfaggrænsede læsioner, målende mindst 10 mm i to på hinanden vinkelrette diametre og synlige på to eller flere aksiale snit. Måleplanet i 2D skal vælges ud fra planet med den største udbredning af læsionen. Benyttes 3D-volumetri skal diameteren være min. 10 mm i alle tre ortogonale retninger. Mindre læsioner regnes for ikke-målbare.
- b. Tumor omkring cyster og operationskaviteter
 - i. Cystiske læsioner regnes generelt for ikke-målbare, medmindre der er en nodulær, fokal komponent, der måler $\geq 10 \text{ mm}$.
 - ii. Cyster og operationskaviteter skal ikke måles og ikke indgå i vurderingen af behandlingsrespons.
- c. Multiple læsioner
 - i. Ved multiple læsioner måles som udgangspunkt de to største læsioner (targetlæsioner), og produkterne af de vinkelrette diametre adderes (se RANO 2.0 for detaljer vedr. kontrastoplade og ikke-kontrastoplade læsioner samt for volumetriske data).
 - ii. T2/T2 FLAIR-læsioner
 1. Da der findes både høj- og lavgradsgliomer, der ikke lader op efter kontrast, eventuelt som følge af behandling med f.eks. VEGF-hæmmere, bør solide tumorkomponenter, der er uden kontrastopladning, men som kan afgrænses på T2/T2-FLAIR, også beskrives.

2. Definition af **ikke-målbare læsioner**

- d. Ikke-målbare læsioner er enten læsioner, der kun kan måles i én dimension, læsioner uden veldefinerede grænser eller læsioner med max. perpendikulær diameter under 10 mm. T2/FLAIR læsioner defineres altid som en ikke målbar læsion.

Responskriterierne for henholdsvis kontrastoplade tumorer, ikke-kontrastoplade tumorer og tumorer med både kontrastoplade og ikke-kontrastoplade komponenter fremgår af Tabel 1-3 i RANO 2.0-artiklen.(12) En gennemgang af RANO 2.0-kriterierne med neuroradiologisk fokus findes som review (296)

For IDH-muterede wild-type glioblastomer måles kontrastoplade læsioner.

For IDH-muterede, ikke-kontrastoplade gliomer og for ikke-kontrastoplade glioblastomer (sjældne) måles T2/T2 FLAIR-læsioner, som ikke er relateret til peritumoralt ødem.

For tumorer med både kontrastoplade og ikke-kontrastoplade komponenter, kan begge typer læsioner måles.

Ved tvetydige MR-fund, mistanke om pseudoprogression eller diskrepans mellem MR-fund og klinisk status kan MR-skanning gentages efter min. 4 uger (f.eks. efter 4-8 uger) for at be- eller afbekræfte eventuel progression. Dette gælder især for kontrastoplade tumorer ≤ 12 uger efter stråleterapi, hvor risikoen for pseudoprogression er størst.

[LINK til tabel 1-4 i RANO 2.0 responskriterie artikel](#)

Bilag 5 – Performance status (ECOG)**Score Gradering (Ref.:(297, 298))**

- | | |
|---|--|
| 0 | Fuldt aktiv, i stand til at udføre samme aktiviteter som før sygdommen uden begrænsninger. (~ Karnofsky score 90-100 %) |
| 1 | Begrænset ved fysisk anstrengende aktivitet, men oppegående og i stand til at udføre arbejde af let eller stillesiddende art, f.eks. lettere husarbejde, kontorarbejde. (~ Karnofsky score 70-80 %) |
| 2 | Oppegående og i stand til at klare sin personlige pleje, men ikke i stand til at udføre arbejdsaktiviteter. Oppe mere end 50 % af sine vågne timer. (~ Karnofsky score 50-60 %) |
| 3 | Kun i stand til at klare begrænset personlig pleje, må holde sengen eller sidde i en stol mere end 50 % af sine vågne timer. (~ Karnofsky score 30-40 %) |
| 4 | Fuldstændig invalideret. Kan ikke klare nogen personlig pleje. Må konstant holde sengen eller sidde i en stol. (~ Karnofsky score 10-20 %) |
| 5 | Død. (Karnofsky score 0 %) |

Bilag 6 – Patologi diagnoser og WHO gradering

| Histologisk diagnose | ICD-O[#] | SNOMED | CNS WHO grad | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | M-kode | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Gliomer, glioneuronale tumorer og neuronale tumorer | | | | | | | | |
| Adult type diffuse gliomer | | | | | | | | |
| Astrocytom IDH-muteret, grad 2 | 9400/3 | 94003 + ÆYYYH2 | | • | | | | |
| Astrocytom IDH-muteret, grad 3 | 9401/3 | 94003 + ÆYYYH3 | | | • | | | |
| Astrocytom IDH-muteret, grad 4 | 9445/3 | 94003 + ÆYYYH4 | | | | • | | |
| Oligodendrogiom, IDH muteret og 1p/19q-codel, grad 2 | 9450/3 | 94503 + ÆYYYH2 | | • | | | | |
| Oligodendrogiom, IDH muteret og 1p/19q-codel, grad 3 | 9451/3 | 94503 + ÆYYYH3 | | | • | | | |
| Glioblastom, IDH-vildtype | 9440/3 | 94403 | | | | • | | |
| Pædiatrisk-type diffuse lavgrads gliomer | | | | | | | | |
| Diffust astrocytom, MYB- eller MYBL1- ændret† | 9421/1 | 942A1 | • | | | | | |
| Angiocentrisk gliom | 9431/1 | 94311 | • | | | | | |
| Polymorf lavgrads neuroepitelial tumor hos unget† | 9413/0 | 941A0 | • | | | | | |
| Diffust lavgrads-gliom, MAPK-vej ændret† | 9421/1 | 942B1 | NA | | | | | |
| Pædiatrisk-type diffuse højgrads gliomer | | | | | | | | |
| Diffust midtlinegliom, H3 K27-ændret† | 9385/3 | 93853 | | | | • | | |
| Diffust hemisfærisk gliom, H3 G34-muteret† | 9385/3 | 938C3 | | | | • | | |
| Diffust pædiatrisk type højgrads gliom, H3-vt og IDH-vt† | 9385/3 | 938D3 | | | | • | | |
| Infantil type hemisfærisk gliom† | 9385/3 | 938E3 | NA | | | | | |
| Velafgrænsede astrocytære gliomer | | | | | | | | |
| Pilocytisk astrocytoma | 9421/1 | 94211 | • | | | | | |
| Højgrads astrocytom med piloide træk | 9421/3* | 942A3 | NA | | | | | |
| Pleomorft xanthoastrocytom | 9424/3 | 94243 | | • | • | | | |
| Subependymalt kæmpecelle astrocytoma | 9384/1 | 93841 | • | | | | | |
| Kordoidt gliom | 9444/1 | 94441 | | • | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|-------|----|---|---|--|
| Astroblastom MN1-ændrett† | 9430/3 | 94303 | NA | | | |
| Glioneuronale og neuronale tumorer | | | | | | |
| Gangliogliom | 9505/1 | 95051 | • | | | |
| Gangliocytom | 9492/0 | 94920 | • | | | |
| Desmoplastisk infantilt gangliogliom | 9412/1 | 95050 | • | | | |
| Desmoplastisk infantilt astrocytom | 9412/1 | 95050 | • | | | |
| Dysembyoplastisk neuroepitelial tumor | 9413/0 | 94130 | • | | | |
| Diffus glioneuronal tumor med oligodendrogiom-lignende træk og kerneansamlinger (DGONC) | NA | 950E1 | NA | | | |
| Papillær glioneuronal tumor | 9509/1 | 950D1 | • | | | |
| Rosetdannede glioneuronal tumor | 9509/1 | 950C1 | • | | | |
| Myxoid glioneuronal tumor† | 9509/1 | 950F1 | • | | | |
| Diffus leptomeningeal glioneuronal tumor | 9509/3* | 950A1 | NA | | | |
| Multinodulær og vakuoliserende neuronal tumor | 9509/0* | 95090 | • | | | |
| Dysplastisk cerebellart gangliocytom | 9493/0* | 94930 | • | | | |
| Centralt neurocytom | 9506/1 | 95061 | | • | | |
| Ekstraventrikulært neurocytom | 9506/1 | 950G1 | | • | | |
| Cerebellart liponeurocytom | 9506/1 | 950H1 | | • | | |
| Ependymomer | | | | | | |
| Supratentorielt ependymom NOS† | 9391/3 | 93913 | | | | |
| Supratentorielt ependymom, ZFTA fusions positiv† | 9396/3 | 93963 | | • | • | |
| Supratentorielt ependymom, YAP1 fusions positiv† | 9396/3 | 939B3 | | • | • | |
| Fossa posterior ependymom NOS† | 9391/3 | 939C3 | | | | |
| Fossa posterior ependymom, gruppe A† | 9396/3 | 939D3 | | • | • | |
| Fossa posterior ependymom gruppe B† | 9396/3 | 939E3 | | • | • | |
| Spinalt ependymom NOS† | 9391/3 | 939F3 | | | | |
| Spinalt ependymom, MYCN amplificeret† | 9396/3 | 939G3 | NA | | | |
| Myxopapillært ependymom | 9394/1 | 93941 | | • | | |
| Subependymom | 9383/1 | 93831 | • | | | |

*Nye ICD-O-3.2 koder.

†Ændring i terminologi af en tidligerer kode

Vær opmærksom på at de danske SNOMED M-koder kan afvige fra ICD-O

Bilag 7 Mulige radiologiske konklusioner ved postoperativ registrering i DNOR

Ved afgivelse af radiologisk konklusion på den tidligt postoperative MR-skanning (<48 timer efter operationen) hos patienter opereret for malignt gliom, skal én af følgende tre termer anvendes:

1) Ingen kontrastopladende resttumor

Der må gerne være en ensartet gracil opladning i kavitetens rand, som antages at være operationsfølger.

2) Ikke-målbar resttumor

Denne term skal anvendes, hvis der er fokal kontrastopladende restvæv, hvor én af de to diametre er <10 mm; dvs. 8x6mm, 10x6mm osv. Man skal måle fokale processer og undgå at medinddrage resektionskavitet og restcyster. Hvis der er flere helt adskilte processer, skal de måles hver for sig. Hvis alle er under 10 mm eller hvis der er en smal opladningsrand i hele resektionskavitetens rand, hører de også til i denne kategori. Dette er for at prøve at følge RANO-gruppens anbefaling, hvor læsioner under denne størrelse angives som "ikke-målbare", idet usikkerheden ved måling af læsioner i denne størrelse må anses at være behæftet med en stor både tolknings og måleusikkerhed. En læsion på 8x12 mm skal således beskrives, men registreres som ikke-målbar. Hvis der er flere ikke-konfluerende læsioner der alle måler <10x10 mm, er der således fortsat ingen målbar resttumor, selvom det samlede tumorvolumen kan være stort.

3) Målbar resttumor

I denne kategori angives alle patienter, hvor der er en kontrastopladende resttumor på $\geq 10\text{mm} \times \geq 10\text{mm}$, som er synlig på 2 eller flere snit som er højst 5 mm uden interslice gap.

Kirurgen indfører den anvendte term i skema til registret. Dette frøtager operatøren fra selv at skulle angive en kategori og registreringen vil dermed blive mere objektiv.

8. Om denne kliniske retningslinje

Denne kliniske retningslinje er udarbejdet i et samarbejde mellem Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Indsatsen med retningslinjer er forstærket i forbindelse med Kræftplan IV og har til formål at understøtte en evidensbaseret kræftindsats af høj og ensartet kvalitet i Danmark. Det faglige indhold er udformet og godkendt af den for sygdommen relevante DMCG. Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet har foretaget en administrativ godkendelse af indholdet. Yderligere information om kliniske retningslinjer på kræftområdet kan findes på:
www.dmcg.dk/kliniske-retningslinjer

Retningslinjen er målrettet klinisk arbejdende sundhedsprofessionelle i det danske sundhedsvæsen og indeholder systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges som beslutningsstøtte af fagpersoner og patienter, når de skal træffe beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer.

De kliniske retningslinjer på kræftområdet har karakter af faglig rådgivning. Retningslinjerne er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.

Retningslinjen indeholder, ud over de centrale anbefalinger (kapitel 1 – quick guide), en beskrivelse af grundlaget for anbefalingerne – herunder den tilgrundliggende evidens (kapitel 3), referencer (kapitel 4) og anvendte metoder (kapitel 5).

Anbefalinger mærket A baserer sig på stærkeste evidens og anbefalinger mærket D baserer sig på svageste evidens. Yderligere information om styrke- og evidensvurderingen, der er udarbejdet efter "[Oxford Centre for Evidence-Based Medicine Levels of Evidence and Grades of Recommendations](#)", findes her:

Generelle oplysninger om bl.a. patientpopulationen (kapitel 2) og retningslinjens tilblivelse (kapitel 5) er også beskrevet i retningslinjen. Se indholdsfortegnelsen for sidehenvisning til de ønskede kapitler.

Retningslinjeskabelonen er udarbejdet på baggrund af internationale kvalitetskrav til udvikling af kliniske retningslinjer som beskrevet af både [AGREE II](#), [GRADE](#) og [RIGHT](#).

For information om Sundhedsstyrelsens kræftpakker – beskrivelse af hele standardpatientforløbet med angivelse af krav til tidspunkter og indhold – se for det relevante sygdomsområde: <https://www.sst.dk/>

Denne retningslinje er udarbejdet med økonomisk støtte fra Sundhedsstyrelsen (Kræftplan IV) og RKKP.